

Ўзбекистон Республикасининг

Қизил Китоби ①

КРАСНАЯ КНИГА Республики Узбекистан

The Red Data Book of the Republic of Uzbekistan

ЎСИМЛИКЛАР

Растения

Plants

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI FAHRLAR AKADEMIIASI
ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI EKOLOGII VA ATROF-MUHITNI
MUDHOFAZA QILISH DAVLAT QO'MITASI

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASINING ҚИЗИЛ КИТОБИ

2 жилдли

1 ЖИЛД

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

В 2-х томах

ТОМ I

THE RED DATA BOOK

OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

In 2 volumes

VOLUME I

TOSHKENT - 2019

БК 42(57) 32
УДК 502.172:582(575.1) 32

Биология фанлари доктори,
профессор
Фурқат Хасановнинг
умумий таҳрири остида

32

Ўзбекистон Республикасининг
Қизил китоби, I жилда ўсимликлар.
Ф.Х. Хасановнинг умумий таҳрири
остида. Т: "Chirog ENK" экологик-
назарий компанияси. - 356 б. - Тит.
в. ўзбек, рус ва инглиз тилларида.

Ўзбекистон Республикасининг Қизил
китоби I жилдада ўсимликлар оламининг
кўпайиб кетиши хавфи остида тур-
ган турлари туғрисидаги маълумотлар
жамланган бўлиб, унда ҳар бир турнинг
юксак таъсифи, тарқалиши, ўсиш шаро-
ити, соғи, қўлайлиги, ареалининг ўзгариш
сەбаблари, маданийлаштирилиши ва муҳо-
фаза чоралари кўрсатилган.

Китоб экология ва атроф-муҳитга
муҳофаза қилиш органлари ходимла-
ри, ботаниклар, ўсимлик дунёси билан
юзинувчилар ҳамда кенг китобхоналар ома-
масига мўлжалланган.

БК 42(57) 32
УДК 502.172:582(575.1) 32

Таҳрирчилар:

Т.А. Мадумаров,

биология фанлари доктори, профессор

А.Х. Ёнгов,

биология фанлари доктори, профессор

ТАҲРИР ХАЙЪАТИ:

Б.Т. Қўчқоров,

Ўзбекистон Республикаси Экология ва
атроф-муҳитга муҳофаза қилиш давлат
қўмитаси раиси

Ф.Х. Хасанов,

биология фанлари доктори, профессор

К.Ш. Тоқибоев,

Ўзбекистон Фанлар академиясининг
академиги, биология фанлари доктори,
профессор

Х.П. Пратов,

биология фанлари доктори, профессор

И.В. Белолизов,

биология фанлари доктори, профессор

Х.Ф. Шомуродов,

биология фанлари доктори

Н.Ю. Бешко,

биология фанлари номзодини

С.Г. Мухторалиев,

"Chirog ENK" экологик-назарий компанияси
раҳбари

Под общей редакцией доктора
биологических наук, профессора
Фурката Хасанова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Б.Т. Қўчқоров,

председатель Государственного комитета
Республики Узбекистан по Экологии и охране
окружающей среды

Ф.Х. Хасанов,

доктор биологических наук, профессор

К.Ш. Тоқибоев,

академик АН РУ, доктор биологических
наук, профессор

Х.П. Пратов,

доктор биологических наук, профессор

И.В. Белолизов,

доктор биологических наук, профессор

Х.Ф. Шомуродов,

доктор биологических наук

Н.Ю. Бешко,

кандидат биологических наук

С.Г. Мухторалиев,

руководитель экологической издательской
компании "Chirog ENK"

КИРИШ

Атроф-муҳитни, ўсимликлар олами-ни муҳофаза қилиш инсоният учун жуда катта ҳаётий аҳамиятга эга. Инсоният табиатдан фойдаланар экан, унинг асрлар давомида шаклланган табиий манзарасини ўзгартирмоқда, унга салбий таъсир кўрсатмоқда. Саноат тармоқлари ва қишлоқ хўжалигининг ривожланиб бориши, табиий майдонларнинг кенг миқёсда ўзлаштирилиши экологик мувозанат бузилишига олиб келмоқда. Натижада ўсимликларнинг камайиб кетиш хавфи туғилмоқда. Бу эса ўсимликлар дунёси генофондининг қисқаришига сабаб бўлмоқда. Ҳар қандай турнинг йўқолиши бошқа ноҳуш оқибатларга олиб келиши аниқ. Таъкидлаш жоизки, ёввойи ўсимликлар қишлоқ хўжалигида экиладиган маданий навларни яратишда бирламчи асос сифатида муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ҳозирда 4 400 га яқин олий ёввойи ўсимлик ва 2 000 дан зиёд замбуруғ турлари мавжуд. Улар орасида жиддий муҳофазага муҳтож кўплаб камёб эндемик ва реликт турлар ҳам бор. Бундай турларнинг сони 300 дан ортиқ бўлиб, улар Ўзбекистон флорасининг 10–12 фоизини ташкил этади.

Республика кўриқхоналарида муҳофаза қилинаётган ўсимликларнинг умумий ҳолати нисбатан яхши бўлишига қарамай, кўплаб ёввойи турларнинг табиий захиралари кескин камайиб кетмоқда. Дунёга донғи кетган лола ва саллагуллар, қимматбаҳо ўсимлик – етмак, доривор ўсимлик – бозулбанг кабилар кейинги йилларда кескин камайиб кетди. Бир қанча турлар йўқолиб кетиш ҳолатига келиб қолди.

Аҳолининг табиатга нотўғри муносабати ҳам ўсимликларнинг камайиб кетишига сабаб бўлмоқда. Айниқса, шаҳар ва қишлоқлар атрофида қизил лола, саллагул, ширач ва шунга ўхшаш нафис гулли ўсимликлар жуда камайиб кетган.

Табиатга, ўсимликлар дунёсига нисбатан бепасанд муносабатда бўлишга чек қўйиш, табиат бойликларини муҳофаза қилиш ва кўпайтириш ҳаммамизнинг асосий бурчимиздир.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач, атроф муҳитни, ҳайвонот ва ўсимликлар дунёсини муҳофаза қилишга алоҳида эътибор қаратилди.

1992 йил 9 декабрда "Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида"ги, 2004 йил 3 декабрда "Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар тўғрисида"ги қонунлар, 2016 йил 21 сентябрда "Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида", 2018 йил 16 апрелда эса "Ўрмон ҳақида"ги қонунлар янги таҳрирда қабул қилинди.

Бу қонунлар барча ўсимлик турларини сақлаб қолиш, уларни асраб-авайлаш ва муҳофаза қилишда муҳим ҳужжат ҳисобланади.

Ўзбекистонда Қизил китоб илк бор 1979 йилда таъсис этилган. Мазкур Қизил китобга наботот оламининг камёб, йўқолиб кетиш хавфи остидаги турлари ҳақида маълумотлар киритилган. Бундан кўзланган мақсад, жамоатчилик ва давлат идоралари эътиборини табиат муҳофазаси масалаларига жалб этишдан ва турлар генофондини сақлаб қолишга кўмаклашишдан иборат эди.

Қизил китобнинг 1984 йилги нашрига Ўзбекистон флорасининг йўқолиб кетиш хавфи остида қолган 163 та тури киритилган. Бу турларнинг тақдири билан республика мутахассислари, олимлари муттасил шуғулланиб келмоқда. Ўтган йиллар мобайнида олиб борилган кузатишлар айрим ўсимлик турларининг сони ва майдони анча кенгайганлигини кўрсатмоқда. Масалан, анзур ва Суворов пиёзлари олдинги ҳолатига келмаган бўлса-да, маълум даражада кўпайди. Энг камёб ўсимликлардан саналган Минквиц тезиуми турларининг сони 7 тадан 17 тагача ортди. Қурама тизмасида камёб ўсимликлардан ҳисобланган Коро-

вин ширачи ўсимлигининг мавжудлиги аниқланди. Айни вақтда айрим ўсимлик турларининг сони кескин қисқариб кетган. Омонқора ўсимлиги, Писком пиёзи, Маргарита мармараги кабилар шулар жумласидандир.

Кейинги йилларда олиб борилган изланишлар ўлкамиз флорасига мансуб яна 138 турдаги ўсимликни Қизил китобга киритиш лозимлигини кўрсатмоқда. 1998 йил маълумотларига кўра, Ўзбекистон Республикасининг Қизил китобига киритилган ўсимлик турларининг сони 301 тани ташкил этган бўлса, янги нашрдан 49 оилага мансуб 314 турдаги ўсимлик ўрин олди.

Қизил китобга киритилган ўсимлик турларига Табиатни муҳофаза қилиш халқаро иттифоқининг томонидан ишлаб чиқилган таснифга биноан камёблик даражасига кўра 4 та мақом (статус) берилди.

0. Йўқолган ёки йўқолиб кетганлиги эҳтимолдан йироқ эмас. Бир неча йиллар давомида табиатда учратилмаган, лекин йиғиб олиш қийин бўлган айрим жойлардагина ёки маданий шароитда сақлаб қолиш эҳтимоли мавжуд бўлган турлар. IUCN Red List нинг тахминан EX (Extinct – Йўқолган) ва EW (Extinct in the wild – Ёввойи табиатда йўқолган) тоифаларига мувофиқ келади.

1. Йўқолиб кетиш арафасида турган. Йўқолиб кетиш хавфи остида қолган, сақлаб қолиниши учун махсус муҳофазани талаб этадиган турлар. IUCN Red List нинг тахминан CR (Critically Endangered – Бутунлай йўқолиб кетиш арафасида турган) и EN (Endangered – йўқолиб бораётган) тоифаларига тўғри келади.

2. Камёб. Маълум кичик майдонлардагина ўзига хос шароитларда сақлаб қолинган, аммо тез йўқолиб кетиши мумкин бўлган ва жиддий назоратни талаб этувчи турлар. IUCN Red List нинг тахминан EN и VU (Vulnerable – Заиф) тоифаларига мувофиқ келади.

3. Сон жиҳатдан камайиб бораётган. Сони ва тарқалган майдонлари маълум

вақт ичида табиий сабабларга кўра ёки инсон омили таъсири остида камайиб кетаётган турлар. IUCN Red List нинг тахминан VU и NT (Near Threatened, Йўқолиб кетиш хавфи яқин) тоифаларига тўғри келади. Айни вақтда, бундай ўсимликларни ҳар томонлама назоратга олиш талаб этилади.

Ўсимликларнинг мақоми турғун эмас, балки ўзгарувчандир, яъни, вақт ўтиши билан муайян ўсимлик бутунлай йўқолиши ёки кўпайиб, муҳофаза қилиш даражасидан чиқиб кетиши мумкин.

Қизил китобда ҳар бир турнинг ўзбекча, русча, латинча номлари ва уларнинг қайси оила ҳамда туркумга мансублиги кўрсатилган. Шунингдек, турларнинг қисқача тавсифи (ҳаётий шакли, бўйи, шох-шаббаси, барги, гули, меваси ва фенологияси), тарқалиши ва чизма харидада учрайдиган жойлари келтирилган. Табиий шароитда ўстириш усуллари ҳам тўхталиб ўтилган. Баъзи ўринларда муайян турни тажриба майдонларида ёки саноат асосида етиштириш имкониятлари баён этилган. Муҳофаза чоралари масаласига алоҳида эътибор қаратилган. Турларга тавсиф берилар экан, соҳага доир адабиётлар ва гербарий маълумотларидан, шунингдек, кўп йиллик кузатишлар натижаларидан ҳам фойдаланилди.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиси Ботаника институти (аввалги Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти) илмий ходимларининг кейинги йиллар ичида вилоятлар бўйича олиб борган илмий-тадқиқот ишларининг самараси ўлароқ, Қизил китобнинг аввалги (2009) нашридаги маълумотлар янгиланди, яъни, Қизил китобнинг янги нашрига айрим ўзгартиришлар киритилди. Жумладан, Ўзбекистонда кам учраши, тарқалиш ҳудудлари, яъни ареаллари, асосан бошқа мамлакатлар (Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва бошқалар)га тўғри келганлиги сабабли, ботқоқ тошёрари, кечки ллойдия, Мартиус қиличўти, Олтой троллиуси,

юмалоқбаргли парпи, Тожикистон ет-маги ва бошқа бир қанча турлар Қизил китобдан чиқариб ташланди. Улуғбек скабиозаси, Ольга сорбарияси, Олой наталиелласи ҳам қизил китобдаги турлар рўйхатидан чиқарилди, сабаби, ҳозирги кундаги маълумотларга кўра, уларнинг ареаллари Ўзбекистон ҳудудига тегишли эмаслиги аниқланди.

Бундан ташқари, сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотлар Келлер астрагали, Олатоғ заъфарони, Ольга сохта клаусияси, Северцов муғултови, Липская чандири сингари турларнинг кенг тарқалганини, ортиқ уларнинг йўқолиб кетиш хавфи йўқлигини кўрсатди. Шунга асосланган ҳолда, мазкур турлар Қизил китобдан чиқарилди. Мақоми 0 га тенглаштирилган, яъни йўқолиб кетган деб ҳисобланувчи турлар сони 19 тадан 15 тага қисқарди. Шунингдек, 12 та ноёб ва эндемик тур ҳам Қизил китобга киритилди, улар орасида сўнгги бир неча йилда аниқланган ва ҳали фанга номаълум бўлганлари ҳам бор. Қизил китобнинг аввалги нашри билан янги нашрини таққослайдиган бўлсак, эндиликда 157 та турнинг мақоми ўзгарди. Шунингдек, аввалги нашр чоп этилганидан бери номенклатурага киритилган кўп сонли ўзгаришлар туфайли, шу жумладан, ДНК-таҳлиллаш усулидан кенг фойдаланилиши муносабати билан узоқ вақт давомида махсус адабиётларда

қўлланилиб келинган кўплаб таксонлар (турлар, туркумлар, оилалар)нинг илмий номлари ҳам ўзгарди.

Қизил китобнинг мазкур янги нашри мутахассислар, давлат идоралари ҳамда жамоат ташкилотлари олдига қўриқхоналар ва буюртмахоналарни кенгайтириш, ёввойи ўсимликлар сотишни тақиқлаш, хомашё учун йиғиладиган ўсимликларни териш учун лицензиялар жорий этиш каби бир қанча долзарб масалаларни қўяди.

Ўсимликлар дунёсини муҳофаза қилиш бу жараёнда кенг жамоатчилик иштирок этган тақдирдагина ижобий самара беради. Барча яқдиллик билан ҳаракат қилсагина, наботот оламининг бебаҳо бойликларини сақлаб қолишга, уларни асраб-авайлаб, муносиб равишда келгуси авлодларга қолдиришга эриша оламиз.



ВВЕДЕНИЕ

Проблема охраны окружающей среды, растительного мира имеет огромное, жизненно важное значение для всего человечества. Пользуясь природными ресурсами, человек отрицательно влияет на формирующиеся веками природные ландшафты. Развитие промышленности и сельского хозяйства, широкое освоение природных территорий приводит к нарушениям экологического равновесия, в результате которых постепенно возрастает опасность оскудения видового состава флоры и утраты генофонда растений.

Исчезновение любого вида влечет за собой необратимые последствия, так как дикорастущие растения являются исходным материалом для создания ценных сортов многих сельскохозяйственных культур.

На территории Узбекистана насчитывается около 4 400 видов дикорастущих высших растений и более 2 000 видов грибов. Среди них более 300 редких, эндемичных и реликтовых видов (10–12 % флоры), для охраны которых необходимы эффективные меры. И хотя состояние флоры, охраняемой в заповедниках, относительно благополучно, природные запасы многих дикорастущих видов резко сократились. Так, вследствие усиленной промышленной заготовки уменьшились ареалы тюльпанов и пионов, мыльного корня, зайцегуба опьяняющего. Значительное число видов находится на грани исчезновения.

Большой ущерб дикорастущей флоре наносит бесконтрольный сбор редких лекарственных и пищевых растений (особенно луковичных, клубнелуковичных и корневищных, выкапываемых вместе с подземными органами), принимающий все более угрожающие масштабы.

Потребительское отношение к живой природе, в том числе к растительному миру – недопустимо. Сохранять и приумножать природные богатства страны – обязанность всех граждан.

Обретение Республикой Узбекистан политической и экономической независимости дало принципиально новый импульс в деле охраны окружающей среды, растительного и животного мира. 9 декабря 1992 года был принят Закон "Об охране природы". 3 декабря 2004 года – Закон "Об охраняемых природных территориях", 21 сентября 2016 года – новая редакция Закона "Об охране и использовании растительного мира", 16 апреля 2018 года – новая редакция Закона "О лесе", которые являются документами государственной важности, способствующими сохранению растительного мира страны во всем его многообразии.

В 1979 году была учреждена Красная книга Узбекистана, где собраны основные сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах флоры. Задача Красной книги – привлечь внимание

общественности и государственных органов к проблемам охраны живой природы, помочь сохранить генофонд.

В издание Красной книги 1984 года были включены 163 находящихся под угрозой исчезновения вида растений, судьба которых находилась и находится в центре внимания ученых и специалистов республики. В последние годы многое изменилось. Установлено, например, что площадь и численность некоторых видов растений увеличилась (лук стебельчатый, лук Суворова и др.). А количество очень редкого вида тезнума Минквица возросло с 7 до 17. Впервые на Кураминском хребте обнаружена популяция редчайшего вида – ширача Коровина. В то же время численность унгернии Виктора, лука пскемского, шалфея Маргариты и др. резко сократилась.

На основании исследований последних лет сделан вывод о необходимости дополнения списка "краснокнижников" ещё 138 редкими таксонами. Таким образом, в изданную в 1998 году Красную книгу независимого Узбекистана был включен 301 вид растений. А в новое издание занесены 314 видов растений, относящиеся к 49 семействам.

В соответствии с рекомендациями Международного союза охраны природы (МСОП), виды растений, включенных в Красную книгу Узбекистана, распределены по 4-м категориям (статусам):

0. Исчезнувшие или вероятно исчезнувшие. Виды, не встреченные на протяжении нескольких лет, но, возможно, уцелевшие в некоторых труднодоступных местах или в культуре. Примерно соответствует категориям EX (Extinct, Исчезнувшие) и EW (Extinct in the wild, Исчезнувшие в дикой природе) Красного списка МСОП (IUCN Red List).

1. Находящиеся под угрозой исчезновения. Виды с количеством, близким к критическому уровню, и близкие к исчезновению. Примерно соответствует категории CR (Critically Endangered, Находящиеся на грани полного исчезновения) IUCN Red List.

2. Редкие. Виды, не находящиеся под непосредственной угрозой исчезновения, но встречающиеся в таком небольшом количестве или в таких ограниченных по площади и специфических местах обитания, что могут быстро исчезнуть. Примерно соответствует категории EN (Endangered) IUCN Red List. Требуется тщательное наблюдение.

3. Сокращающиеся в численности. Виды, численность и ареал которых уменьшается в течение определенного времени по естественным причинам, из-за вмешательства человека

или в результате того и другого. Примерно соответствует категориям VU (Vulnerable, Уязвимые) и NT (Near Threatened, Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому) IUCN Red List. Необходима регулярная оценка их состояния.

По многим причинам статус вида может измениться как в одну, так и в другую сторону: растение может исчезнуть или, напротив, может быть исключено из категории охраняемых в связи с увеличением численности.

В настоящем издании принят алфавитный порядок расположения семейств, а также родов и видов внутри них. Названия многих таксонов (видов, родов, семейств), длительное время употреблявшиеся в специальной литературе, согласно последним исследованиям, заменены на новые. Каждый вид снабжен узбекским, русским и латинским названиями с указанием семейства. Дается краткое описание вида (жизненная форма, высота, габитус, листья, цветок, плод, фенология), распространение. Перечисляются места обитания, на схематической карте точками нанесены их местонахождения. Отмечаются способы размножения в естественных условиях. В некоторых случаях говорится о возможности культивирования вида на опытных участках или в промышленном масштабе. Описываются принятые и необходимые меры охраны. В видовых очерках использованы гербарные и литературные материалы, опросные данные и результаты многолетних полевых исследований отдельных авторов.

В результате научно-исследовательских работ по областям республики, проведенных учеными Института ботаники (бывший ИГРЖМ) АН РУз, из Красной книги были исключены камнеломка болотная, ллойдия поздняя, меч-трава Мартюса, купальница алтайская, аконит круглолистный и аллохруза таджикистанская. Эти виды редко встречаются в Узбекистане, так как их ареалы в основном расположены в других странах (Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и др.). Были исключены из Красной книги скабиоза Улугбека, рябинник Ольги и наталиелла алайская, так как по современным данным, ареал этих видов не заходит на территорию Узбекистана. Кроме того, исследования последних лет показали, что такие виды, как астрагал Келлера, шафран алатавский, ложноклаусия Ольги, моголтавия Северцова, липския замечательная, распространены достаточно широко и не находятся под угрозой исчезновения. На этом основании данные растения были исключены из Красной книги. Число считающихся исчезающими видов со статусом 0 уменьшилось с 19 до 15. Еще

12 редких и эндемичных видов были включены в Красную книгу, в том числе несколько новых для науки видов, которые были обнаружены в последние несколько лет. По сравнению с предыдущим изданием, у 157 видов изменился статус. Также были изменены научные названия многих таксонов (видов, родов, семейств), длительное время употреблявшиеся в специальной литературе, в связи с большим количеством номенклатурных изменений, произошедших с момента выхода предыдущего издания и связанных, в том числе, с широким использованием методов ДНК-анализа.

Новое издание Красной книги поднимает перед специалистами-ботаниками, представителями административных органов, а также общественными организациями вопросы охраны редких видов, создания заповедников и заказников, усиления контроля за заготовкой дикорастущих декоративных и сырьевых растений.

Только при участии всех граждан республики можно достичь желаемых результатов в деле охраны природы, её растительного мира. Только таким образом можно сохранить живую природу для грядущих поколений.



АЙИҚТОВОНДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ЛЮТИКОВЫЕ – RANUNCULACEAE

1. КНОРРИНГ ИСФАРАГИ

Живокость Кнорринга / *Delphinium knorringianum* B. Fedtsch.



Мақоми 2. Олой тизмасидаги кичик майдонда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 35–45 см га етадиган ўқ илдизли, кўп йиллик ўт. Барглари, асосан, пастки пастки қисмида жойлашган. Баргбанди узун, пастки қисми биров кенгайган, япроғи юмалоқ-буйраксимон, 5 та панжасимон бўлакка ажралган, бўлаклари тескари тухумсимон, улар ҳам, ўз навбатида, биров қирқилган. Пояси камшоҳ, 5–7 гулли. Гулкоси оч бинафша рангли, кенг эллипс-тухумсимон, пихлари ингичка, узунлиги 2,5 см, учи иккига ажралган. Июнь ойида гуллаб, июль ойида мева тугади.

Тарқалиши. Ферғона вилояти: Шахмардон дарёси ҳавзаси, шунингдек, Қирғизистонда ҳам учрайди (Ўш вилояти).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмидаги ёнбағирларда ва қояларда ўсади.

Сони. Табиатда икка-якка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади. Умумий сони аниқланмаган.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсимлиkning умумий сонини аниқлаш, табиатда ва ботаника боғларида биоэкологик ҳусусиятларини ўрганиш тавсия этилади.

Манбалар. [281, 389, 453, 461].

К.Т. Тойжанов

Статус 2. Редкий узкий эндемик Алайского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 35–45 см, со стержневым корнем. Листья на длинных, при основании расширенных черешках, сосредоточены в нижней части стебля, с округло-почковидной пластинкой, пальчато-рассечённой на 5 обратно-яйцевидных долей, которые, в свою очередь, неглубоко надрезаны. Стебель маловетвистый, с 5–7 цветками. Листочки околоцветника светло-фиолетовые, широко-эллиптически-яйцевидные, с тонким шпорцем длиной до 2,5 см, на конце обычно раздвоенные. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ферганская область: бассейн реки Шахмардан, а также за пределами Узбекистана: Кыргызстан (Ошская область).

Места обитания. Склоны и скалы в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Общая численность не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведений нет.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Рекомендуется уточнить общую численность растений, изучать в природе и в ботанических садах его биоэкологические свойства.

Источники. [281, 389, 453, 461].

К.Т. Тойжанов

Rare endemic species of the Alay mountain range. It is spread at the Shakhimardan valley (Ferghana region). Inhabits slopes or rocks in the lower and middle belts of mountains. Solitary specimens or small groups can be found. Total number is unknown. Measures of protection: not protected.



2. ОҚ ПАРПИ

Аконит таласский / *Aconitum talassicum* Popov

Мақоми 3. Тянь-Шань ва Помир-Олой тизма-сидаги сон жихатдан қисқариб бораётган, ареали бўлинган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1,5 м га етадиган, кўп йиллик, туғунак илдизпояли ўт. Илдизпо-си туғунакларнинг ёнма-ён қўшилишидан ҳосил бўлган. Поялари оддий, тик ўсувчи. Поянинг юқори қисмидаги барглари бандсиз, қолганлари бандли, япроғи асосигача йирик тишли бўлакларга аж-ралган. Ёрқин кўк рангли гуллари поянинг юқори қисмида йирик шокила ҳосил қилади. Июнь-июл-да гуллаб, меваси июль-август ойларида етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Фарғона, Жиззах, Қаш-қадарё вилоятлари: Писком, Чотқол, Қурама, Фарғона, Туркистон, Зарафшон, Ҳисор тизмала-рида тарқалган. Тожикистонда, Қозоғистон ва Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва юқори қисмларидаги нам ерларда ва ёнбағирлардаги булоқларнинг атрофларида ўсади. Баъзан булоқ бўйларида кичик бутазорлар ҳосил қилади.

Сони. Бутун ареали бўйлаб бир-биридан анча узоқ жойлашган унча катта бўлмаган тўпар ҳосил қилади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаб-лари. Халқ табиобатида доривор ўсимлик сифати-да ишлатилади.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофиза чоралари. Чотқол, Зомин ва Ҳисор қўриқхоналарида, Уғам-Чотқол ва Зомин миллий табиат боғларида ўстирилади.

Манбалар. [214, 215].

К.Т. Тойжанов

Статус 3. Эндемик Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая с сокращающейся численностью и разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее клубне-корневищное травянистое расте-ние высотой до 1,5 м. Корневище представлено цепочкой сросших-ся клубней. Стебель прямой, про-

стой. Листья черешковые (кроме самых верхних), почти до основания рассечённые на крупнозубча-тые доли. Цветки – в верхушечной кисти, крупные, светло-синие. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. В Ташкентской, Ферган-ской, Джизакской, Кашкадарьинской областях: Пскемский, Чаткальский, Кураминский, Ферганс-кий, Туркестанский, Зеравшанский, Гиссарский хребты. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан.

Места обитания. Влажные места у родников, на склонах и в долинах среднего и верхнего поясов гор. Иногда у родников образует небольшие зарос-ли.

Численность. По всему ареалу встречается в виде отдельных, иногда значительно удалённых друг от друга небольших популяций.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. В народной медицине употребляется как лекар-ственное средство.

Культивирование. Выращивается в Бота-ническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Чат-кальского, Зааминского и Гиссарского заповедни-ков, Угам-Чаткальского и Зааминского националь-ных парков.

Источники. [214, 215].

К.Т. Тойжанов

Endemic species with reducing area at the western Tien-Shan and Pamir-Alay. It is spread at the Pskem, Chatkal, Ferghana, Turkestan, Zerafshan, Hissar Ranges (Tashkent, Ferghana, Jizzakh, Kashkadarya regions). Inhabits wet places near springs, on the slopes and in valleys of the middle and upper belts of mountains. Sometimes, forms brushwoods near springs. Sometimes, separate small populations are met all over the area. Limiting factors: used in national medicine. Measures of protection: protected in the Chatkal, Zaamin and Hissar state nature reserves, the Ugam-Chatkal and Zaamin National Parks.



3. БОЙСУН ПУФАНАГИ

Ветреница байсунская / *Anemone baissunensis* Juz.

Мақоми 3. Кўхитанг ва Хисор тизмаларида ўсувчи камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Чўзиқ тугунакли кўп йиллик ўт. Илдизолди барглари бандли, уч карра бўлинган, бўлаклари юмалоқ ёки ўткир тишли. Ён бўлаклари бандсиз ёки қисқа бандли, ўрта қисмидаги банди 1,5 см узунликка эга. Ўрама барглари 2-3 тани ташкил этади, юқори қисми уч карра бўлинган. Гулбанди 1-4 тагача туклар билан қопланган. Гулларининг диаметри 1-2, 3-4 см, сариқ рангли. Чангдон ва чангчи иплари сариқ, уруғчиси эса қора. Уруғи 0,3-0,35 см узунликда. Тумшукчасининг узунлиги 0,2 см, сертук. Март-апрель ойларида гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмасида – Шалқонсой атрофида; Хисор тизмасида – Бойсун, Шўрчи, Денов атрофларида ўсади. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғ ёнбағирларидаги сариқ ва майда тупроқларда ҳамда тоғ этакларидаги ола тупроқларда ўсади.

Сони. Табиатда кам учрайди. Одатда, кичик-кичик тўпчалар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан, айрим ҳолларда вегетатив йул билан ҳам қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари йиғиб, тугунаклари қазиб олинади. Чорва моллари томонидан пайҳон қилинади.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1965 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Табиатда сақланиб қолган тупларини назорат остига олиш лозим. Сурхон давлат кўрикхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [98, 99, 129, 354].

К.Т. Тойжанов

Статус 3. Редкий эндемик Гиссарского хребта и Кугитанга.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с продолговатыми клубнями. Прикорневые листья на черешках, трижды рассечённые на сегменты с закруглёнными или заострёнными зубцами. Боковые сегменты сидячие или на коротких черешках, средний на черешке длиной до 1,5 см. Листочки обёртки (2-3) в верхней части трижды рассечённые. Цветоносы (1-4) покрыты волосками. Цветки диаметром 1-2, 3-4 см, жёлтые. Пыльники и тычиночные нити жёлтые, пестики чёрные. Семянки до 0,3-0,35 см, с загнутым носиком, длиной до 0,2 см, шерстисто-волосистые. Цветёт в марте-апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Сурхандарьинская область: Кугитангский хребет – окрестности Шалкансая; Гиссарский хребет – окрестности Байсуна, Шурчи, Денау. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Лёссовидные и мелкоземистые склоны, выходы пестроцветных пород в предгорьях.

Численность. Встречается редко, небольшими группами.

Размножение. Семенное, редко – вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов и клубней, выпасывание скотом.

Культивирование. С 1965 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим контроль за популяциями. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [98, 99, 129, 354].

К.Т. Тойжанов

Rare endemic species of the Hissar and Kughitang mountain ranges. It is spread at the Kughitang ridge; the Shalkansay, the Hissar range; nearby Baysun, Shurchi, Denau (Surkhondarya region). Inhabits loess-like and gypseous slopes of the foothills and lower mountain belt. The quantity is unknown. Limiting factors: flowers and tubers collection, trampling down by cattle. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.



4. БУХОРО ПУФАНАГИ

Петреница бухарская / *Anemone bucharica* Regel

Мақоми 3. Ўзбекистонда кам учрайдиган, Жанубий Помир-Олойда ўсадиган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Тугунаги юмалоқ ёки узунчоқ қўринишдаги қўп йиллик ўт. Илдизолди барглари бандли, оч ишил, юмалоқ-юраксимон, уч карра бўлинган, сийрак тукли. Япроғининг ён булаклари бандсиз, ўрта қисмидагилари эса қисқа бандли. Урама барглари 3 та, уч карра бўлинган. Гулпоялар 1-3 та. Гуллари йирик, диаметри 3-4 см, тик турувчи, очик, ликопчасимон. Гулкосаи қизил, ички томони ялтироқ, ташки томони ётиқ тукли. Уруғи қалин тукли. Апрель-июнь ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмасида – Шалқонсой атрофи, Бойсунтау ва Боботоғ тизмаларида тарқалган (Тожикистонда ҳам учрайди).

Ўсиш шароити. Тоғ ёнбағирларидаги сарғиш тусли ва майда заррали тупроқларда ҳамда тоғ этакларидаги ола тупроқларда ўсади.

Сони. Табиатда кам тарқалган, тўп-тўп ҳолда учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гул ва тугунакларининг маҳаллий аҳоли томонидан йиғиб олинishi ва чорва моллари боқилиши натижасида камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. 1962 йилдан буён ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Табиатда мавжуд популяциялари қатъий назорат остига олинishi лозим. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [98, 99, 129, 354].

К.Т. Тойжанов

Статус 3. Эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с клубнями от округлой до про-

долговатой формы. Прикорневые листья на черешках ярко-зелёные, округло-сердцевидные, трижды рассечённые, рассеянно-волосистые. Боковые сегменты почти сидячие, средний – на коротком черешке. Листочки обёртки (3) трижды рассечённые. Цветоносы в количестве 1-3. Тычинки и пестики многочисленные. Цветки крупные, до 3-4 см в диаметре, прямостоячие, открытые, блюдцевидные. Листочки около цветника красные, внутри блестящие, снаружи прижато-волосистые. Семена густоволосистые. Цветёт и плодоносит в апреле-июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг – окрестности Шалканская, хребты Байсунтау и Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Лёссовидные и мелкоземистые склоны, выходы пестроцветных пород в предгорьях.

Численность. Встречается редко, небольшими группами.

Размножение. Семенное, редко – вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов и клубней местным населением, выпас скота.

Культивирование. С 1962 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [98, 99, 129, 354].

К.Т. Тойжанов

Endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Kughitang, Baysuntau and Babatag ranges (Surkhondarya region). Inhabits loess-like and fine earth slopes, on gypseous rocks. Rarely, small groups can be found. Limiting factors: collection of flowers and tubers by population, cattle overpasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.



5. ТУКСИЗ СУГУРЎТ

Горицвет голочашечный / *Adonanthë leiosepala* (Butkov) Chrték et Slaviková

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Тянь-Шанда тарқалган ареали бўлинган, камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–20 см, попуksимон илдизли, кўп йиллик ўт. Илдизпоя бўғзидан чиққан қўнғир барглари қисқа, бир нечта поялар ўсиб чиқади. Новдалари сершоҳ, сербарг. Барглари патсимон бўлинган, юпка, майда. Гуллари йирик, якка-якка, тўқ сариқ рангли. Меваси юпка илмоксимон учли, хиёл қайрилган. Май ойида гуллаб, меваси июль–август ойларида етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизмасида – Паркент, Заркент қишлоқлари атрофларида, Суқоқсой, Бошқизилсой ва Келинчаксойда; Курама тизмасида – Қамчиқ довоида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги тошли, шўғалли, майда жинс тупроқларда ва қояларда ўсади.

Сони. Бу тур тарқалган ерлар 3,5–4 минг гектарни ташкил қилади. Умумий сони 30–40 минг туп атрофида.

Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Униб чиқиш қобиляти 1–2 фозни ташкил этади. Етилган уруғлари 2–3 йилдан сўнг униб чиқади. Рақобатга чидамсиз. Қўриқхона шароитида якка ҳолда ўсган катта ёшдаги туплари аниқланган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол давлат биосфера қўриқхонаси ҳамда и Угам-Чотқол биосфера резерватида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [84–87, 130, 247].

К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Редкий эндемик юго-западного Тянь-Шаня с разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее кисте корневое травянистое растение высотой 15–20 см. От шейки корневища отходит несколько стеблей, покрытых бурыми, редуцированными листьями. Стебли ветвящиеся, густооблиственные. Листья перисто-рассечённые, тонкие. Цветки крупные, одиночные, ярко-жёлтые. Плоды с тонким крючк вато-изогнутым носиком. Цветёт в мае, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет; в окрестностях посёлков Паркент, Заркент, Сукок, а также в Башкызылсая, Келинчексая; Кураминский хребет: перевал Камчик.

Места обитания. Щебнистые, каменистые и мелкоземистые склоны, выходы скал субальпийского пояса.

Численность. Известные участки ареала охватывают 3,5–4 тыс га. Общая численность: 30–40 тыс. экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Очень низкая всхожесть (1–2 %). Семена всходят после 2–3-летнего периода покоя. Низкая конкурентоспособность. На заповедной территории вид представлен одиночными, старовозрастными экземплярами.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском государственном биосферном заповеднике и Угам-Чаткальском биосферном резервате.

Источники. [84–87, 130, 247].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the south-western Tien-Shan with reducing area. It is spread at the Chatkal range: the surroundings of Parkent, Zarkent, Sukok and also in Bashkizylsay, Kelincheksay; the Kurama range; the Kamchik pass (Tashkent region). Inhabits stony and fine earth slopes, rocks of the alpine belt. Known area plots occupy 3.5–4 thousand ha. Total number: 30–40 thousand specimens. Limiting factors: very low germination (1–2%). Seeds spring up after 2–3 years of dormancy. Low competition capacity. In the territory of state reserve the species are represented by single, old specimens. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve and the Ugam-Chatkal biosphere reserve.



АНОРДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ГРАНАТОВЫЕ - PUNICACEAE

6. ЁВВОЙИ АНОР

Гранат обыкновенный / *Punica granatum* L.

Мақоми 3. Ўзбекистонда табиий ҳолда жуда кам сақланиб қолган, ареали бўлинган реликт тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 2 м га етадиган бута. Барги чуқик, тескари тухумсимон, узунлиги 6-8 см, эни 7-15 мм, чармсимон, қисқа шохларда тўп-тўп, узун шохларда аса қарама-қарши ўрнатишган. Гули калта новдаларда жойлашган. Косачаси қайишсимон мустаҳкам, тожбарги оч қизил рангда. Меваси юмалоқ, йирик. Май-августда гуллаб, сентябрь-октябрь ойларида мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тоғининг жануби-ғарбий қисмида Тупаланг, Сангардак дарёлари ҳавзаларида тарқалган. Тожикистон, Туркменистон, Кавказorti, Туркия, Шимолий Эрон, Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмида-деңгиз сатҳидан 1 000-1 600 м баландликдаги салқин ва нам дараларда ўсади.

Сони. Кўпинча яқка ҳолда, баъзан бошқа дарахт ва буталар билан биргаликда ўсади. Айрим жойларда соф анорзорларни ташкил этади. Тупларининг умумий сони аниқланмаган.

Қўлзайиши. Уруғидан ва илдиз бачқисидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Анорзорларнинг бузиб юборилиши ва мевалари пала-партиш йиғиб олинishi туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Анор одамлар томонидан 4 000 йилдан буён етиштириб келинади.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Мабалар. [156-159, 274].

И.В. Белолипов

Статус 3. Очень редкий, исчезающий в Узбекистане реликтовый вид с разорванным ареалом.

Краткое описание. Кустарник высотой до 2 м. Листья продолговато-обратнояйцевидные, кожистые, длиной 6-8 см, шириной 7-15 мм, на укороченных побегах сидят пучками, на удлиненных - супротивно. Цветки на укороченных побегах. Чашечка кожистая. Лепестки ярко-красные. Плод шаровидный, крупный. Цветёт в мае-августе, плодоносит в сентябре-октябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: юго-западные отроги Гиссарского хребта - бассейны рек Тупаланг, Сангардак. За пределами Узбекистана - Таджикистан, Туркменистан, Закавказье, Турция, Северный Иран, Афганистан.

Места обитания. Увлажнённые и защищённые места в небольших ущельях и расщелинах гор на высоте 1 000-1 600 м.

Численность. Встречается редко, одиночными кустами или небольшими зарослями вместе с другими древесными и кустарниковыми породами, очень редко - небольшими чистыми зарослями. Точные учётu не проводились.



Размножение. Вегетативное (отпрысками) и семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение территории и нерегулируемый сбор плодов местным населением.

Культивирование. Культура граната обыкновенного известна более 4 000 лет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [156-159, 274].

И.В. Белолипов

Very rare endangered in Uzbekistan relict species with reducing area. It is spread at the south-western outskirts of the Hissar range: the Tupalang and Sangardak valleys (Surkhondarya region). Inhabits wet and protected places in small gorges and clefts of mountains at the altitude of 1 000-1 600 m. Rarely, solitary specimens or small groups with other trees and shrubs, very seldom, small pure brushwoods. Total number was not calculated. Limiting factors: the economic development of the territory and irregular harvest by local population. Measures of protection: not protected. Some populations are protected in forestries.



БИГНОНИЯДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО БИГНОНИЕВЫЕ – BIGNONIACEAE

7. ОЛЬГА ИНКАРВИЛЛЕЯСИ Инкарвиллея Ольги / *Encarvillea olgae* Regel



Мақоми 3. Помир-Олойдаги жуда камёб, йўқолиб кетиш арафасидаги реликт тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўтсимон ўсимлик, бўйи 1,5 м га етади. Пояси унча кўп эмас, тик ўсади. Барглари оддий, узунлиги 6–10 см, патсимон қирқилган. Гуллари ўсимликнинг учидаги рўваксимон тўпгулларда ўрнашган. Косачаси туксиз, узунлиги 3–4 см, кенг учбурчак тишчали. Гултожи воронкасимон, йирик, беш бўлмали, пушти-тўқ қизил рангли, баъзан оқ, узунлиги 4 см, ташқи томони туксиз, ички томони сийрак тукли. Чангчиларининг иллари туксиз, чангдон икки қанотчали, сийрак тукли. Уруғдон узун, туксиз устунчали. Меваси кўп уруғли, чузиқроқ, пусти қалин, узунлиги 5–10 см, эни 1 см келадиган сал қайрилган ёйсимон қўсақча. Уруғи 1 см гача узунликда, ярим пардасимон, оқ қанотчали. Июнь–август ойларида гуллаб, август–сентябрда мева тугади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Помир-Олой (Олой тизмаси)нинг Сўх ва Шохимардон дарёлари ҳавзасида тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Қирғизистон ва Тожикистонда ҳам тарқалган.

Ўсиш шароити. Адир ва тоғларда 1 500–2 500 м баландликдаги майда чағир тошли, тошли ёнбағирларда шагалли дарё ўзанида ўсади.

Сони. Кичик гуруҳлар ҳосил қилиб ўсади. Популяцияларининг умумий сони аниқланмаган.

Қўлайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Антропоген омиллар таъсирида ва чорва моллари боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1961 йилдан буён муваффақиятли ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [25, 156–159, 210].

И.В. Белолипов

Статус 3. Очень редкий, находящийся под угрозой исчезновения реликтовый вид Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 1,5 м. Стебли немногочисленные, прямостоячие. Листья простые, длиной 6–10 см, перисто рассеченные. Цветы в верхушечном, метельчатом соцветии. Чашечка голая, длиной 3–4 мм, с широко треугольными зубцами. Венчик воронковидный, крупный, пятилопастной, розово-пурпуровый, редко белый, до 4 см длины. Тычинки с голыми нитями и рассеянно опушенными двукрылыми пыльниками. Завязь с длинным голым столбиком. Плод – многосемянная удлиненная кожистая, слегка согнутая коробочка, длиной 5–10 см и шириной 1 см. Семена длиной до 1 см, с полупрозрачными белыми крыльями. Цветет в июне–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Ферганская область: Памиро-Алай (хребет Алайский – бассейны рек Сокх и Шохимардон). За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Таджикистан.

Места обитания. На галечниках и конусах выноса, щебнистых мелкоземистых, каменистых склонах предгорий и гор, на высоте 1 500–2 500 м.

Численность. Встречается небольшими группами. Общая численность популяций не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Антропогенное воздействие и выпас скота.

Культивирование. Успешно выращивается с 1961 г. в Ботаническом саду АН РУз. В культуре устойчив.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [25, 156–159, 210].

И.В. Белолипов

Very rare endangered relict endemic species of the Pamir-Alay. It is spread at the Pamir-Alay (the Alay range: the Sokh and Shakhimardan valleys). Inhabits pebbles, gravelly and stony slopes in foothills and middle mountain zone (1 500–2 500 m.s.l.) Growing in micro-populations. Total number is unknown. Limiting factors: antropogenic factors and overgrazing. Measures of protection: not protected.



БҲРЧОҚДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО МОТЫЛЬКОВЫЕ (БОБОВЫЕ) – FABACEAE (LEGUMINOSAE)

8. БИНАФША ГУЛЛИ АРҒУВОН

Бағрянник Гриффита / *Cercis griffithii* Boiss.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шань ва Помир-Олой тизмаларида ўсадиган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 3–4 м келадиган, кенг шох-шаббали дарахт. Бир йиллик новдаларининг пўстлоғи қўнғир-қизил рангли. Барглари юмалоқ, буйраксимон, туб қисми кенг ўйилган, устки томони яшил, пастки томони қўқимтир рангда. Гуллари калта-калта шокилаларга тўпланган. Тоғбарги қирмизи-бинафша рангли. Дуккагининг узунлиги 6–8 см, эни 1 см. Май ойида гуллаб, июнда мева беради. Манзарали дарахт.

Тарқалиши. Тошкент ва Сурхондарё вилоятлари: Ғарбий Тянь-Шань – Уғам, Курама тизмалари; Помир-Олой – Ҳисор тизмасида ва Боботоғда ўсади. Тожикистон ва Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмларидаги тошли, тошли-шағалли ва майда заррали тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди. Баъзан кичик аргувонзорлар ҳосил қилади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Қурилиш материаллари ва ўтин учун кесиб олинishi туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [89, 156–159, 297].

Р.И. Қозоқбоев

Статус 2. Редкий вид в западном Тянь-Шане и Памиро-Алае.

Краткое описание. Дерево высотой 3–4 м, сильно ветвистое, образует широкую крону. Годичные побеги с красно-бурой корой. Листья округлые, почковидные, при основании широко-выемчатые, верхняя поверхность листа зелёная, нижняя – синевато-сизая. Цветки собраны в укороченные кисти. Венчик пурпурно-фиолетовый. Бобы длиной 6–8 см, шириной до 1 см. Цветёт в мае, плодоносит в июне. Декоративен.

Распространение. В Ташкентской и Сурхандарьинской областях: Западный Тянь-Шань – Угамский, Кураминский хребты; Памиро-Алай – Гиссарский хребет, Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Мелкоземистые, каменисто-щебнистые южные склоны в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается одиночными деревьями, реже образует небольшие рощицы.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Заготавливается населением на топливо и древесину.

Культивирование. Культивируется.

Меры охраны. Не разработаны.

Источники. [89, 156–159, 297].

Р.И. Казакбаев

Rare endemic of the western Tien-Shan and southern Pamir-Alay. It is spread at the western Tien-Shan: the Ugam, the Kurama ranges; the Pamir-Alay: the Hissar range, the Babatag (Tashkent and Surkhandarya regions). Inhabits fine earth, stony-southern slopes in the lower belt of mountains. Single specimens, rarely forms small groves. Limiting factors: using as firing and wood. Measures of protection: not protected.



9. АБОЛИН АСТРАГАЛИ

Астрагал Аболина / *Astragalus abolinii* Popov

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шанда кичик майдонда тарқалган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўт. Қисқа танасидан осилиб турувчи ингичка, кўплаб бурама поялар ўсиб чиққан. Барги мураккаб, 5–6 см узунликда, баргчалари 4–6 жуфт, чўзиқроқ юмалоқ шаклда, узунлиги 7–14 мм, эни 5–8 мм. Гуллари ёйиқ, момик гулпопутида 3–9 тадан жойлашган. Косачаси (гуллаган даврда) бироз каттайд, кейинчалик тухумсимон-қабарик шаклга киради. Дуккаги 8–12 мм узунликда, оқиш, хурпайган, қалин тукли. Июнда гуллаб, июлда мева беради.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол, Уғам, Писком ҳамда Қоржонтов тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1 000–1 200 м баландликдаги қуёш нури тик тушмайдиган қоятошларнинг ёриқларида ва дараларининг салиқин ёнбағирларида ўсади.

Сони. Чотқол тизмасида бир-биридан ажралган ҳолда кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади. Оқбулоқ атрофларида 10 га жойда борлиги аниқланган. Писком дарёси ҳавзасида 150–250 атрофидаги тўплардан иборат 20 дан ортиқ популяциялари мавжуд.

Кўпайиши. Фақат уруғидан кўпаяди. Оқбулоқ атрофларида панароқ ёнбағирларда ёш ниҳоллари учрайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Янги униб чиққан майсалари ва ёш ниҳолларининг камлиги ўсимлиكنинг секинлик билан кўпайишидан далолат беради. У ўзига хос шароитда ўсишни талаб қилади ва турлараро рақобатга дош бера олмайди.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофиза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида ва Уғам-Чотқол миллий табиат боғида муҳофиза қилинади.

Манбалар. [343, 345].

Ғ.М. Шерматов

Статус 2. Редкий узкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с укороченным стеблем, от которого отходят многочисленные извилистые свисающие тонкие стебли. Листья длиной 5–6 см, листочки 4–6-парные, округло-овальные, закругленные, длиной 7–14 мм, шириной 5–8 мм. Цветки собраны в 3–9-цветковые рыхлые кисти. Чашечка при цветках

слегка вздутая, позже яйцевидно-вздувающаяся. Бобы длиной 8–12 мм, оттопыренно-бело-шерстисто-мохнатые. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский, Угамский, Пскемский хребты и Каржантау.

Места обитания. Трещины отвесных скал на высоте 1 000–1 200 м, преимущественно северные, тенные склоны ущелий.

Численность. Встречается разрозненно, образует небольшие популяции на Чаткальском хребте. В районе Акбулака отмечен в 10 пунктах. В бассейне реки Пскем имеется более 20 популяций, численность по 150–250 растений.

Размножение. Только семенное. В районе Акбулака на защищённых склонах встречаются молодые всходы.

Причины изменения численности и ареала. Малочисленность ювенильных растений и всходов, свидетельствующая о слабой воспроизводительности; приуроченность к характерным местообитаниям и низкая конкурентоспособность.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском биосферном государственном заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [343, 345].

Ғ.М. Шерматов

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal, the Ugam, the Pskem, the Karzhantau ranges (Tashkent region). Inhabits cracks of sheer rocks at the altitude of 1 000–1 200 m above sea level, mainly, the northern shady slopes of gorges. Can be met separately. Forms small populations at the Chatkal Range. In Akbulak, is observed in 10 points. At the Ugam, in the basin of river Pskem, the Karzhantau, 150–250 plants can be observed. Limiting factors: scarcity of juvenile plants and seedlings, i. e. weak ability for reproduction; specialized habitat requirements and low competition capacity. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve and the Ugam-Chatkal national park.



10. БАРАНОВ АСТРАГАЛИ

Астрагал Баранова / *Astragalus baranovii* Popov

Мақоми 1. Чотқол тизмасидаги эндемик тур.
Қисқача тавсифи. Бўйи 4–10 см келадиган дейрли поясиз, ер бағирлаб ўсадиган қўп йиллик ўт. Асосий поясининг ер остида жойлашган ёғоч қисмидан бир йиллик, ингичка, 2 см узунликдаги ётиқ оқ туклар билан қопланган поялар ўсиб чиқади. Барги 2,5–6 см узунликда, баргчалари 4–6 жуфт, тухумсимон ёки юмалоқ-тухумсимон 4–6 мм узунликда, тўмтоқроқ, ҳар икки томони ётиқ оқ туклар билан қопланган. Гулпопуғи қисқа, соябонсимон, ғовак ва момик, 1,5–2 см узунликдаги 4–5 та гули бор. Тожбарги оч пушти рангли. Дуккаги чўзиқ-наштарсимон, узунлиги 10–11 мм, эни 3 мм, бироз ҳурпайган оқ тукли, икки уяли. Июлда гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизмасида: Катта Чимён тоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ минтақасининг юқори қисмида, оҳақтошли қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Фақат икки жойда ўсиши аниқланган.

Қўпайиши. Одатда, уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Дам олиш масканларининг қурилиши ва чанги учиш учун трассалар барпо этилиши ўсимлик сонига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [156–159, 343].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Эндемик Чаткальского хребта.

Краткое описание. Многолетнее высотой 4–10 см приземистое растение с подземным деревянистым длинноветвистым стволиком, почти бесстебельное или с тонкими, прижато-белопушистыми годичными стеблями длиной до 2 см. Листья длиной 2,5–6 см, листочки 4–6-парные, яйцевидные или округло-яйцевидные, длиной 4–6 мм, закругленно-тупые, с обеих сторон седовато-прижато-волосистые. Кисти – укороченные, зонтиковидные, рыхлые, 4–5-цветковые, длиной 1,5–2 см. Венчик бледно-розовый. Бобы ланцетно-продолговатые, длиной 10–11 мм, шириной 3 мм, полуттопыренно-беломохнатые, двугнездые. Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет: Большой Чимган.

Места обитания. Расщелины известняковых скал в субальпийском поясе гор.

Численность. Отмечен только в двух пунктах.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. В связи с созданием зон отдыха и лыжной трассы численность вида резко сократилась.



Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [156–159, 343].

К.Ш. Тожибаев

Endemic species of the Chatkal range. It is spread at the Chatkal range: the Greater Chimgan (Tashkent region). Inhabits clefts of calcareous rocks in the subalpine belt of mountains. In 2 localities can be observed. Limiting factors: reducing due to creation of the resorts and ski-tracks. Measures of protection: not protected.



11. БИНАФШАРАНГ АСТРАГАЛ

Астрагал центральный / *Astragalus centralis* E. Shield.**Мақоми 2.** Қизилқумдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 5–10 см орасидаги оқ туклар билан қопланган бутача. Пояси кумушранг, бироз тарвақайлаган, қалин, ипаксимон тукли. Баргининг узунлиги 2–5 см, баргчалари 3–5 жуфт, эллипсимон, ўткир учли, узунлиги 8–14 мм, ҳар икки томони қалин кумушранг-ипаксимон туклар билан қопланган. Тўпгули юмалоқ ёки тухумсимон, узунлиги 2–3,5 см, зич жойлашган, қўпгулли. Косачасининг узунлиги 8–10 мм, қалин ва майда, кенг ёйилган, юмшоқ тукли. Гултожи бинафша ранг. Дуккаги майда, бандсиз, юмалоқ-чўзиқроқ шаклда, қирралари ўткир, пўсти қалин, бир учли. Май ойида гуллаб, май-июнь ойларида мева беради.

Тарқалиши. Бухоро ва Навоий вилоятлари: Қизилқумда (Кулджуктоғ, Оқтоғ, Оқтошли ва Оёқғужумди атрофларида) тарқалган.

Ўсиш шароити. Қошларнинг ёриқларида, оҳақтошли ва тошли, тош-шағалли, баъзан майда тупроқли-шағалли қолдиқ тоғларнинг ёнбағирларида ўсади.

Сони. 1 200 га иккин тундан иборат бешта популяцияси аниқланган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Қизилқум чул станцияси коллекция майдонида қўпайтиришга қаратилган уринишлар натижа бермаган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Кулджуктоғни муҳофаза этиладиган ҳудудлар қаторига киритиш тавсия этилган.

Манбалар. [266, 267, 3350, 351].

К.Ш. Тожибаев, Ш.У. Сарибзева

Статус 2. Редкий эндемик останцов Кызылкума.

Краткое описание. Кустарничек, опушенный белыми волосками, высотой 5–10 см. Стебли серебристые, густо полуоттопыренно-шелковистые. Листья длиной 2–5 см, листочки 3–5-парные, эллиптические, острые, длиной 8–14 мм, с обеих сторон

густо покрытые серебристо-шелковистыми волосками. Соцветия шаровидные или яйцевидные, длиной 2–3,5 см, плотные, многоцветковые. Чашечка длиной 8–10 мм, мохнатая от густых и довольно мягких коротких оттопыренных волосков. Венчик фиолетовый. Бобы сидичие, мелкие, овальные, на спинке и брюшке килеватые, кожистые, одногнездные. Цветёт в мае, плодоносит в мае-июне.

Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: Кызылкумы (горы Кулджуктау, Актау, Актасты, окрестности Аяк-гузумды).

Места обитания. Трещины скал, известняковые и каменные, каменисто-щебнистые, изредка мелкоземисто-щебнистые склоны останцев гор.

Численность. Отмечено около 1 200 растений в 5 популяциях.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Попытки введения в культуру на территории Кызылкумской пустынной станции АН РУз не увенчались успехом.

Меры охраны. Рекомендовано создание охраняемой территории в горах Кулджуктау.

Источники. [266, 267, 350, 351].

К.Ш. Тожибаев, Ш.У. Сарибзева

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum; the Kuldjuktai mountains, the Aktau, the Aktasty, the Ayak-guzhumdy (Bukhara and Navoi regions). Inhabits cracks of rocks, calcareous and stony, gravelly, fine earth slopes of the relict low mountains. There are 5 populations with about 1 200 plants can be found. Limiting factors: unknown. Measures of protection: the Kuldzhuktau recommended as a protected area.



12. БОРИС АСТРАГАЛИ

Астрагал Бориса / *Astragalus borissianus* Gontsch.

Мақоми 1. Олой тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30 см, деярли пойсиз ёки жуда қисқа пояли, барг қолдиқлари билан ўралган кўп йиллик ўсимлик. Барги 10–23 см узунликда, баргчалари 10–13 жуфт, чўзиқ, эллипс шаклида ёки ўткир наштагисимон, узунлиги 7–15 мм, қаттиқ, япроқчаларининг ҳар икки томони ёғиқ оқ тукли. Гул-попуқлари қисилган, қисқа, 6–8 гулли. Дуккаги бандсиз, чўзиқ-тухумсимон, 14–15 мм узунликда, қаттиқ, хурпайган оқ туклар билан қопланган, икки уяли. Июнда гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой тизмасининг Шоҳимардон дарёси ҳавзасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Арчазорларда, тошли тоғ ёнбағирларида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус чора-тадбирлар ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [2, 156–159],

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 1. Редкий эндемик Алайского хребта.

Краткое описание. Многолетнее, почти бесстебельное растение, высотой 30 см, с короткими, сильно укороченными стеблями, одетыми старыми черешками листьев. Листья длиной 10–23 см, листочки 10–13-парные, продолговато-эллиптические или ланцетные, острые, длиной 7–15 мм, жёсткие, с обеих сторон прижато-беловолосистые. Кисти скатые, короткие, 6–8-цветковые. Бобы сидячие, продолговато-яйцевидные, длиной 14–15 мм, жестко-оттопыренно-белоохватые, двугнездые. Цветёт в июне, плодоносит в августе.

Распространение. Ферганская область; Алайский хребет; бассейн реки Шахимардан.

Места обитания. Каменистые склоны среди арчовников.

Численность. Встречается одиночными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Следений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [2, 156–159].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species of the Alay range. It is spread at the Alay range: the Shakhimardan river basin (Fergana region). Inhabits stony slopes, among the juniper stands. Single specimens can be found. Measures of protection: not protected.



13. БУТКОВ АСТРАГАЛИ

Астрагал Буткова / *Astragalus butkovii* Popov

Мақоми 1. Ҳисор тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 4–6 см келадиган қўп йиллик ўт. Пойлари оқ, қиррали жўякларга эга бўлиб, ётиқ, ғадир-будур, момик оқ туклар билан қопланган. Баргининг узунлиги 7–8 см, баргчалари 3 жуфт, тескари чузиқ-тухумсимон ёки эллипс шаклида, узунлиги 7–15 мм, эни 4–7 мм, ҳар икки томони момик туклар билан қопланган. Гулполуги говаксимон, 5–8 гулли, узунлиги 4–5 см. Тож-барги сарғиш. Дуккаги қисқа бандли (0,75 мм), чузиқ наштартсимон, узунлиги 9–19 мм, эни 2,5–3 мм. Май–июнда гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмаси Қашқадарё ҳавзасида – Тошқўрғон қишлоғи атрофида учрайди.

шистые. Листья длиной 7–8 см, листочки 3-парные, продолговато-обратнояйцевидные или эллиптические, длиной 7–15 мм, шириной 4–7 мм, с обеих сторон пушистые. Кисти рыхлые, длиной 4–5 см, 5–8-цветковые. Венчик желтоватый. Бобы на короткой (0,75 мм) ножке, продолговато-ланцетные, длиной 9–19 мм, шириной 2,5–3 мм. Цветёт и плодоносит в мае-июне.

Распространение. Кашкадарьинская область: Гиссарский хребет – бассейн реки Кашкадарья, окрестности селения Ташкурған.

Места обитания. Краснопесчаники в зрелом.

Численность. Встречается очень редко, единичными особями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [156–159, 343].
Ф.О. Хасанов



Ўсиш шароити. Арчазорлардаги қум-тошларда ўсади.

Сони. Табиатда ниҳоятда кам тарқалган. Онда-сонда яқка тупларини учратиш мумкин.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [156–159, 343].

Ф.Ў. Хасанов

Статус 1. Редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. Стебли высотой 4–6 см, белые, угловато-бороздчатые, прижато-шероховато-пу-

Rare endemic species of the Hissar range. It is spread at the Hissar range: the Kashkadarya river basin, nearby the Tashkurgan village (Kashkadarya region). Inhabits sandstones among juniper stands. Very rare, isolated specimens can be found. Measures of protection: protected in the Hissar state nature reserve.



14. БУХОРО АСТРАГАЛИ

Астрагал бухарский / *Astragalus bucharicus* Regel

Мақоми 2. Жануби-ғарбий Помир-Олойд тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–25 см, деярли пойсиз ёки жуда қисқа поyli (2–3 см), кўп йиллик ўт. Барглари оддий ёки мураккаб, учта баргчадан ташкил топган, барг банди узун, ярим ётиқ туклар билан қопланган. Баргчалари кенг эллипс ёки кенг тухумсимон, баъзан юмалоқ. Гулпоysis 15 см узунликда, попуклари момик ва ғовак. Гули яшил-сарғиш рангли. Дуккаги чўзиқ-юмалоқ шаклда. Апрельда гуллаб, меваси май ойида пишади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг ва Ҳисор тизмаларида (Ҳужагургур-Ота, Чўлбайир, Ғозимойлик, Оқбошгор.), Хондиза дарёси ҳавзасида ҳамда Боботоғнинг Чағам қишлоғи яқинида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Ола-була, лойқа ва гипсли тупроқларда, қизил қумтошларда ўсади.

Сони. Яқин ҳолда, 3–4 тупи биргаликда ёки кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқ маълумотлар йўқ. Лекин гипсли жинслардан ташкил топган ўзига хос тупроқ шароитида ўсишга мослашганлиги учун ареали кенгаймаслиги мумкин.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайд.

Манбалар. [156–159, 342].

Ғ.М. Шерматов

Статус 2. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алай.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение, почти бесстебельное или с коротким (2–3 см) стеблем, высотой до 20–25 см. Листья тройчатые или простые, на длинных черешках, полуприжато-опушенные. Листочки широко эллиптические, широкояйцевидные, реже округленные. Кисти рыхлые, цветоносы длиной 15 см. Цветки зеленовато-желтые. Бобы продолговато-овальные. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Сурхандарьинская область: Кугитангский и Гиссарский хребты (горы Ходжа-Гур-Гур-Ата, Чутьбайир, Газимайлик, Акбаштау), бассейн реки Хандиза; Бабатаг (близ кишлаков Чагам и Ходжакульсун), За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Пестроцветные гипсоносные глины и красные песчаники.

Численность. Встречается одиночно, изолированными группами по 3–4 растения или небольшими популяциями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к гипсоносным пестроцветным условиям препятствует расширению ареала.

Культивирование. Выращивалось в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [156–159, 342].

Ғ.М. Шерматов

Rare, endemic species of the Kughitang range.

It is spread at the Kughitang and Hissar ridges (the Khodja-Gur-Gur-Ata, the Chulbair, the Gazimaylik, the Akbashtau mts.), the Babatag ridge (near village Chagham) (Surkhandarya region). Inhabits stony slopes of the middle belt of mountains, among the juniper sparse growth. Small populations form isolated single groups of 3–4 plants among the juniper stands. Limiting factors: stenotopic species with a restricted habitat. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.



15. ВИЛЛИС АСТРАГАЛИ

Астрагал Виллиса / *Astragalus willisii* Popov

Мақоми 2. Қўхитангда кам тарқалган, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи қисқа (4–10 см), пояси йўгон, сершоҳ, қўп йиллик ўт. Поясининг пастки қисмини ўтган йилдан қолган барг бандлари ўраб туради. Барги 18 см узунликда, баргчалари эллипссимон ёки чўзиқ наштарсимон, 8–18 жуфт, 4–10 мм узунликда. Ўткир учли, икки томони майин ипаксимон, қалин тукли. Гул поясининг узунлиги баргига тенг. Гуллари бинафша ранг. Дуккаки чўзиқ, узунлиги 8 мм, икки ёнидан сиқилган. Май ойида гуллаб, меваси июнда пишади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Қўхитанг тизмасидаги Қизил олма қишлоғининг шимолида ва Каттақурчуқ тевақларида учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги шаг'алли-тошли ёнбағирларда ва сийрак арчазорларда ўсади.

Сони. Асосан, яқка ҳолда, баъзан арчазорлар орасида кичик-кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Қўлайлиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик ўсиб турган ерларда чоря молларининг ҳаддан ташқари жўп боқилиши туфайли ўсиш майдонлари қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [73,171].

Ф.У. Ҳасанов



Статус 2. Редкий эндемик хребта Қўхитанг.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с коротким (4–10 см), толстым, ветвистым стеблем, густо покрытым остатками черешков листьев прошлых лет. Листья длиной до 18 см. Листочки 8–18-парные, эллиптические или ланцетно-продолговатые, длиной 4–10 мм, остроконечные, с обеих сторон мягко-шелковисто-мохнатые. Цветоносы по длине равны листьям. Цветки фиолетовые. Боб продолговатый, длиной 8 мм, с боков сжатый. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Қўхитангский хребет – севернее кишлаков Кызыл-Алма и Катта-Курчук.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны среднего пояса гор, среди арчового редколесья.

Численность. Встречается единичными экземплярами, образует небольшие заросли среди арчоников.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [73,171].

Ф.О. Ҳасанов



Rare, endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang: nearby the Kyzyl-Alma and Katta-Kurchuk villages (Surkhandarya region). Inhabits stony slopes of the middle belt of mountains, among the sparse juniper stands. Small populations form isolated single groups among the juniper stands. Limiting factors: grazing. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.

16. ЁНФОКСИМОН АСТРАГАЛ

Астрагал ореховый / *Astragalus nucleosus* Popov

Мақоми 1. Гарбий Тянь-Шанда кам тарқалган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–12 см узунликдаги, пойсиз, кўп йиллик ўт. Барги 5–14 см узунликда. Баргчалари 11–15 жуфт, наштасимон ёки эллипс-наштасимон, учи ўткир, қалин туклар билан қопланган. Гулпоясининг узунлиги 5–8 см. Гули йирик, узунлиги 25–30 мм. Дуккаги бандсиз, 4 см узунликда, чўзиқ тухумсимон, қалин, майин, ярим ётиқ тукли. Апрель–май ойларида гуллаб, май–июнда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Курама ва Чотқол тизмаларида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1 600 м гача баландликдаги шағал-тошли очиқ (яланг) тоғ ёнбағирларида ўсади.

Сони. Кўпинча якка-якка ҳолда, баъзан эса кичик майдонларда тўп-тўп бўлиб учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг муттасил боқилиши

туфайли ўсимлик майдонлари қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус чора-тадбирлар ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [156–159, 318].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 1. Узкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой 10–12 см. Листья длиной 5–14 см. Листочки 11–15-парные, ланцетные или эллиптически-ланцетные, острые, войлочно-мохнатые. Цветоносы длиной 5–8 см. Цветки крупные, длиной 25–30 мм. Бобы сидячие, длиной до 4 см, яйцевидно-продолговатые, густо-мягко-полуприжато-мохнатые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Ташкентская область: хребты Кураминский и Чаткальский. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Открытые каменистые, каменисто-щебнистые склоны предгорий и среднего пояса гор до высоты 1 600 м.

Численность. Встречается небольшими группами, чаще всего одиночно.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [156–159, 318].

Ф.О. Ҳасанов

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Kurama, the Chatkal ranges (Tashkent region). Inhabits stony and gravelly slopes of foothills and middle belt of mountains up to 1 600 m. Small groups, frequently, isolated specimens can be found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



17. ЗАРҲАЛ АСТРАГАЛ

Астрагал позолоченный / *Astragalus auratus* Gontsch.

Мақоми 2. Олой ҳамда Туркистон тизмаларида ўсадиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15 см га етадиган деярли понсиз кўп йиллик ўт. Пастки барглари оддий, якка, юқоридагилари эса икки жуфтли, баргчалари тескари тухумсимон, ҳар икки томони ётиқ тукли. Гулпоиси баргига деярли тенг, 6-8 гулли, гуллари оч қизил. Июлда гуллаб, уруғ беради.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой тизмасининг денгиз сатҳидан 1 600-1 800 м баландликдаги Шохимардон, Қўли Қуббон, Ёрдон қишлоқлари атрофида, Увлардисойда ҳамда Сўх, Пешкаут дарёларининг ҳавзаларида тарқалган. Тожикистонда ва Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тошли қуруқ қиликларда, ола тупроқли ёнбағирларда, тошлоқларда ва сурилмаларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди, баъзан кичик-кичик тўғлар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг қўлаб боқилиши туфайли ўсимлик майдонлари кескин қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [156-159, 343].

Ғ.М. Шерматов

Статус 2. Редкий эндемик Алайского и Туркестанского хребтов.

Краткое описание. Почти бесстебельное многолетнее травянистое растение высотой до 15 см. Нижние листья простые, одиночные, верхние – двупарные, обратнояйцевидные, с обеих сторон

прижато-волосистые. Цветоносы почти равны листьям, 6-8-цветковые, цветки ярко-желтые. Цветёт и плодоносит в июле.

Распространение. Ферганская область: Алайский хребет (окрестности кишлаков Шохимардан, Кули-Куббон, Иордан, урочище Увлардисай, бассейна реки Сох, долина реки Пешкаут на высоте 1 600-1 800 м). За пределами Узбекистана: Таджикистан, Кыргызстан.

Места обитания. Сухие каменистые склоны, пестроцветные толщи, галечники, реже осыпи.

Численность. Встречается одиночно или небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [156-159, 343].

Ғ.М. Шерматов

Rare, endemic species of the Alay and Turkestan ranges. It is spread at the Alay range: nearby the villages Shakhimardan, Kuli-Kubbon and Jordan, the valleys Uvlardisay, Sokh and Peshkaut at the altitude of 1600-1800 m (Ferghana region). Inhabits dry stony slopes, pebbles, rarely scree. The quantity is unknown. Limiting factors: grazing. Measures of protection: not protected.



18. ИККИ РАНГЛИ АСТРАГАЛ

Астрагал двухцветковый / *Astragalus dianthoides* Boriss.

Мақоми 2. Олой тизмасида тарқалган камеб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 3–4 см келадиган, ётиқ қалин туклар билан қопланган, деярли пойсиз, қўи йиллик ўт. Барги 1–2 см узунликда, барг банди ингичка, узунлиги 2–5 мм, баргчалари 4–5



жуфт, чузиқ, узунлиги 2–7 мм, эни 1 мм, иккала томони қалин тукли. Гулпопуғи 2–3 гулли. Косачаси найсимон, узунлиги 12–16 мм. Тожбарги сарик, баъзан қизғиш рангда. Дуккагининг узунлиги 20–25 мм, эни 3 мм, учига ва тубига қараб торайган, тумшукчаси қисқа, қўндаланг томирли, майда ётиқ тукли, икки томонидан қисилган. Апрель ойида гуллаб, апрель-май ойларида уруғ беради.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой тизмасининг Чимён, Шохимардон, Садқоқ, Водит, Оқбиллол, Қадамжой ва Сўх қишлоқлари атрофларида тарқалган. Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шаронти. Тоғ этакларидаги жарликларда, шағалли бўз тупроқлар ва конгломерат тоғ жинсларида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [65, 156–159].

Ш.К. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик Алайского хребта.

Краткое описание. Многолетнее, почти бесстебельное растение высотой 3–4 см, густо-прижато-опушенное. Листья длиной 1–2 см с тонкими черешками длиной до 2–5 мм. Листочки 4–5-парные, продолговатые, длиной 2–7 мм, шириной около 1 мм, с обеих сторон густоволосистые. Кис-

ти с 2–3 цветками. Чашечка трубчатая, длиной 12–16 мм. Венчик желтый, иногда краснеющий. Бобы длиной 20–25 мм, шириной 3 мм, суженные к основанию и верхушке, с очень коротким носиком, поперечно-жилковитые, сжатые с боков, мелко-прижато-волосистые. Цветёт в апреле, плодоносит в апреле–мае.

Распространение. Ферганская область: Алайский хребет – окрестности поселков Чимён, Шохимардан, Садкак, Қадамжай, Вуадиль, Акпилиль и Сох. За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Щебнистые сероземы, конгломераты и сланцы, овраги в предгорьях.

Численность. Встречается редко единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [65, 156–159].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the Alay range. It is spread at the Alay range; nearby the villages Chimion, Shakhimardan, Sadkak, Kadamzhai, Akpilai, Vuadil, Sokh (Fergana region). Inhabits grey soils, conglomerates and shales, ravines in foothills. Rare, isolated specimens can be found. Measures of protection: not protected.



19. КНОРРИНГ АСТРАГАЛИ

Астрагал Кнорринга / *Astragalus knorrningianus* Boriss.

Мақоми 2. Шимоли-ғарбий Помир-Олойд Ҷазира-да камбаб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Буйи 5–7 см узунликдаги кул-ранг-яшил, ётиқ тукли, деярли поясиз кўп йиллик ўт. Барги 2–5 см, банди эса 5–15 мм узунликда. Барг-чалари 7–9 жуфт, тасмасимон ёки узун тигсимон, узунлиги 5–11 мм, эни 0,5–1,5 мм. Ўткир учли, паст-ки томони қалин ётиқ тукли. Гулпояси 2–5 см узун-ликда. Гуллари 2–3 та, оч сариқ, 32–37 мм узунлик-да. Косачаси 17–20 мм узунликда. Дуккаги 7 см гача узунликда, эни эса 4 мм, калта тумшукчали, ётиқ оқ ва қора туклар билан қопланган. Март–апрель ой-ларида гуллаб, меваси апрель–май ойлари етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Наво-ий вилоятлари: Нурота, Молгузар ва Туркистон тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидан то тоғнинг ўрта қисмигача қўзилган емирилган туб тоғ жинс-ларида, шағалли-тошли ёйбағирларда ўсади.

Сони. Кам учрайди, яқка-яқка ҳолда, баъзан кич-кич тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаб-лари. Чорва молларининг боқилиши туфайли қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота ва Зомин давлат қўриқхоналарида муҳофаза этилади.

Манбалар. [65, 156–159].

Ф.Ў. Ҳасанов



Статус 2. Редкий эндемик Северо-западного Памиро-Алая.

Краткое описание.

Многолетнее почти бес-стебельное травяни-стое растение высотой 5–7 см, серо-зелёное, прижато-опушенное. Листья длиной 2–5 см, черешки длиной 5–15 мм. Листочки 7–9-пар-ные, линейные или линейно-ланцетные, длиной 5–11 мм, шири-ной 0,5–1,5 мм, острые, снизу густо-прижато-

волосистые. Цветоносы длиной 2–5 см. Цветки в количестве 2–3, светло-желтые. Флаг длиной 32–37 мм, чашечка длиной 17–20 мм. Бобы линейные, прижато бело- и черно-волосистые, длиной до 7 см, шириной 4 мм, с коротким носиком. Цветёт в мар-те–апреле, плодоносит в апреле–мае.

Распространение. В Джизакской, Самарканд-ской и Навоийской областях: Нуратинские горы, хребты Мальгузарский и Туркестанский.

Места обитания. Каменисто-щебнистые скло-ны, разрушенные коренные породы от предгорий до среднего пояса гор.

Численность. Встречается редко, спорадиче-ски, единичными экземплярами или небольшими группами по несколько растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нуратинского и Зааминского государственных заповедников.

Источники. [65, 156–159].

Ф.О. Ҳасанов

Rare, endemic species of the north-western Pamir-Alay. It is spread at the Nuratau mountains, the Malguzar and Turkestan ranges (Jizzakh, Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony slopes, destroyed bedrocks in the foothills, lower and middle belt of mountains. Single specimens or small populations occur sporadically. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: protected in the Nuratau and Zaamin state nature reserves.



20. КОМАРОВ АСТРАГАЛИ

Астрагал Комарова / *Astragalus komarovii* Lipsky

Мақоми 2. Ҳисор тизмасининг ғарбий тармоқларида тарқалган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м га етадиган пўстлоғи қўнғир рангли бута. Баргчалари 6–9 жуфт, чузиқ ва чузиқ-думалоқ шаклда, учи бироз ўткир, устки томони деярли туксиз, пастки томони сийрак тукли. Гулпопуғи тингиз, тухумсимон, узунлиги 5 см атрофида. Дуккағи бандсиз, чузиқ ёки тасмасимон, узунлиги 12–18 мм, эни 4 мм, майда-майда, ўткир учли, қалин ва қора прим ётиқ ҳамда узун ва сийрак оқ туклар билан қопланган. Июнь-июлда гуллаб, июль-августда мева беради.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмасининг Гилан, Қўл ва Шут қишлоқлари теваараларида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Майда жинс тупроқли ёнбағирларда тоғларнинг ўрта қисмидаги наъма-так ва арчазорларда ўсади.

Сони. Яқка-яқка ҳолда тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [109, 159].

А.С. Эсанкулов



Статус 2. Редкий вид западных отрогов Гиссарского хребта.

Краткое описание. Кустарник высотой до 1 м с коричнево-бурой корой. Листочки 6–9-парные, овальные или продолговато-овальные и несущие остроконечия на верхушке, сверху почти голые, снизу рассеивно-волосистые. Кисти плотные, яйцевидные, длиной около 5 см. Бобы сидячие, продолговатые или линейные, длиной 12–18 мм, шириной 4 мм, острые, густополуприжато-мелко-черново-волосистые и, кроме того, с редкими более длинными белыми волосками. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Кашкадарьинская область: Гиссарский хребет – окрестности кишлаков Гилан, Куль и Шут. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны, арчовники и розарии в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [109, 159].

А.С. Эсанкулов

Rare endemic species of the Hissar range. It is spread at the Hissar range: nearby the villages Ghilan, Kul and Shut (Kashkadarya region). Inhabits fine earth slopes, juniper stands and rosaries in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection; protected in the Hissar state reserve.



21. МАССАГЕТОВ АСТРАГАЛИ

Astragalus Massagetovii / *Astragalus massagetovii* B. Fedtsch.

Мақоми 1. Ғарбий Помир-Олойдә учрайди-ган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–30 см оралиғида, диаметри 80 см гача етадиган тиканли, сершоҳ, зич ёстиқчалар ҳосил қилувчи бутача. Барғи 4–9 см узунлиқда, қалин тукли, барғ банди қисқа. Барғчалари 8–13 жуфт, эллипс шаклида ёки тескари тухумсимон, узунлиғи 10–15 мм, ўткир учли, икки томони ипаксимон қалин туклар билан қопланган. Косачаси 9–11 мм узунлиқда, найсимон, оқ-қора қалин туклари бор. Гултоғи сарик, туксиз. Дункагининг узунлиғи 17–27 мм, эни 7–11 мм, икки учли, кўп уруғли. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Бойсун тоғи ва Ҳисор тоғ тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмидаги тошли-шағалли ва гипсли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кам учрайди.

Қўнайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [71, 252].

О.Т. Тургинов

Статус 1. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Сильноветвистый колючий кустарничек высотой 15–30 см, образующий довольно плотные подушки до 80 см в диаметре. Листья густо-волосистые, длиной 4–9 см, с короткими черешками. Листочки 8–13-парные, эллиптические, обратояйцевидные, длиной 10–15 мм, остроконечные на верхушке, с обеих сторон густо-шелковисто-волосистые. Чашечка трубчатая, длиной 9–11 мм, бело- и черно-густо-волосистая. Венчик жёлтый, голый. Бобы длиной 17–27 мм, шириной 7–11 мм, двугнёздные, многосеменные. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: горы Байсунтау (около перевала Бельауты), Гиссарский хребет.

Места обитания. Каменно-щебнистые склоны и выходы гипсированных пород в верхнем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [71, 252].

О.Т. Тургинов

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range and Baysun mountains (Surkhandarya region).

Inhabits stony slopes and gypseous rocks in the upper part of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection; not protected.



22. МИХАИЛ АСТРАГАЛИ

Астрагали Михаил / *Astragalus michaelis* Boriss.

Мақоми 2. Гарбий Тянь-Шанда тарқалган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–40 см бўлган ярим бута. Пояси йўғон, сершоҳ, тўқ кулранг. Гулпояси зич, рўваксимон, Барги 5,5–11 см узунликда, барг банди жуда қисқа, баргчалари 10–13 жуфт, узунчоқ тасмасимон ёки чузиқ, узунлиги 5–8 мм, эни 1–1,5 мм, икки томони сийрак тукли. Гулпояги чузиқроқ-говаксимон, 5–8 гулдан иборат. Тожбарги оч пушти рангли, узунлиги 15–17 мм. Дуюкаги 17–22 мм



узунликда, қорамтир, узун тумшукчали. Уруғининг узунлиги 4 мм, эни 1,8 мм, сарғиш-қўнғир рангли. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Уғом ва Писком тизмаларида учрайди.

Ўсиш шароити. Қояларда, тошли-шағалли ва майда заррали тупроқлардан иборат ёнбағирларда ҳамда дарё қирғоқлари бўйлаб тоғнинг юқори қисмигача чузилган жойларда ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойлари Уғом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида жойлашган.

Манбалар. [26, 66].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Растение высотой 10–26 см. Бесстебельное или почти бесстебельное многолетнее травянистое растение. Листья длиной до 20 см, непарноперистые, с 14–18 парами листочков, беловолосистые, листочки длиной 1–2 см, шириной 0,4–1,2 см, линейные, продолговато- или широко-эллиптические, с клиновидным основанием, наверху округлые или заостренные, сверху голые, снизу оттопыренно-беловолосистые. Кисть длиной 4–10 см, продолговатая, рыхловатая, 5–9-цветковая. Чашечка длиной 1,3–1,7 см, узкотрубчатая, прижато-черно- и оттопыренно-беловолосистая. Бобы длиной 2,2–2,5 см, шириной 5–8 мм, продолговато-ланцетные, коротко- и длинно-белоопушенные, 10-семянные, почти двугнездные. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Ташкентская область: Западный Тянь-Шань (Угамский и Пскемский хребты).

Места обитания. Скалы, каменистые, щебнисто-мелкоземистые склоны, берега рек в среднем и верхнем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [26, 66].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the western Tien-Shan; the Ugam and Pskem ranges (Tashkent region). Inhabits rocks, stony, fine earth slopes, river banks in the middle and upper mountain belt. The quantity is rare. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



23. НУРОТА АСТРАГАЛИ

Астрагал нуратинский / *Astragalus nuratensis* Popov

Мақоми 1. Нурота тоғларининг камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Серпояли қўп йиллик ўт. Пояси анча йўғон, узунлиги 8–15 см, сийрак, хурпайган тукли, улар кейинчалик тўкилиб кетади. Барги, асосан, поининг юқори қисмида жойлашган. Баргчалари 4–6 жуфт, юқори қисми тўмтоқрок, деярли тескари юраксимон, узунлиги 1–2 см. Гулпопуғи сийрак, 5–10 гулли. Гултожи оч сариқ рангли. Дуккагининг узунлиги 10–20 мм, ўтқир учли (тумшукчали), сийрак, узун, хурпайган тукли, икки ули. Уруғи қулоқсимон, сиқилган, узунлиги 5 мм, сирғи силлиқ, тўқ жигарранг. Июнь ойида гуллаб, меваси шолда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота тоғларининг Оқтоғ тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмидаги тошли ёнбағирларда, қояларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [77, 136].

Ф.Ў Ҳасанов

Статус 1. Редкий эндемик Нуратинских гор.

Краткое описание. Многолетнее, многостебельное травянистое растение. Стебли довольно толстые, длиной 8–15 см, скудно-оттопыренно-волосистые, позже почти голые. Листья расположены, главным образом, на верхушке стеблей, листочки 4–6-парные, на верхушке притупленные, почти обратносердцевидные, длиной 1–2 см. Кисти рыхлые, 5–10 цветковые. Венчик бледно-желтый. Бобы длиной 10–20 мм, с остроконечием (носиком), двугнездные, рыхло-оттопыренно-длинно-волосистые. Семена длиной 5 мм, уховидные, сжатые, гладкие, черно-коричневые. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Самаркандской и Навоийской областях: Нуратинские горы (хребет Актау).

Места обитания. Каменные склоны и скалы в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [77, 136].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species of the Nuratau mountains. It is spread at the Nuratau mountains: the Aktau range (Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony slopes and rocks in the lower and middle mountain belts. Single specimens and small isolated populations occur very rarely and sporadically. Measures of protection: not protected.



24. ПАТСИМОН АСТРАГАЛ

Астрагал перистый / *Astragalus plumatus* Boriss.

Мақоми 3. Помир-Олойнинг ғарбий тармоқлари ва Жануби-ғарбий Қизилқумнинг камёб эндемик тури.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60 см гача етадиган, шохлари тарвақайлаган, тўғри ва йўғон, оқ тукли, узунлиги 4–8 см, қалин тиканлар билан қопланган бута. Баргчалари 5–6 жуфт, чўзиқроқ-тухумсимон, ёйилган майин тукли. Гуллари барг қўлтигида 8–10 тадан жойлашган, эни 3 см келадиган юмалоқ шаклли энч тўпгул ҳосил қилади. Дуккагининг узунлиги 5 мм, тухумсимон, оқ момик тукли. Уруғи буйраксимон, сирти силлиқ. Апрель-май ойларида гуллаб, меваси май-июнда етилади.

Тарқалиши. Навоий, Вухоро вилоятлари: Қизилқумда – Конимех шаҳри атрофида; Помир-Олойда – Зирабулоқ-Зиёвуддин тоғларида ва Нурота тоғларида (Қоратоғ тизмаси) тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ ёнбағирларида, эдирларда, юзга чиқиб қолган қумтошли тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ёки унча катта бўлмаган тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [26, 28, 29].

Н.Ю. Бешко

Статус 3. Редкий эндемик западных отрогов Памиро-Алая и Юго-западного Кызылкума.

Краткое описание. Кустарник высотой до 60 см, ветви густо покрыты торчащими толстоватыми, прямыми бело-пушистыми колючками длиной 4–8 см. Листочки в количестве 5–6 пар, овальнойцевидные, оттопыренно-мягкоопушенные. Цветки в пазухах листьев до 8–10, скучены в округлые многоцветковые соцветия шириной около 3 см. Боб длиной около 5 мм, яйцевидный, белоохватый. Семена почковидные, гладкие. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Навоийской, Бухарской областях; Кызылкум – окрестности города Канимех; Памиро-Алай – Зирабулак-Зиёвуддинские горы; Нуратинские горы (хребет Каратау).

Места обитания. Склоны гор, предгорья, выходы песчаников.

Численность. Встречается единичными экземплярами или небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Следений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [26, 28, 29].

Н.Ю. Бешко

Rare endemic species of the western branches of the Pamir-Alay and the south-western Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Kokchatau hill nearby Kanimekh town; the Pamir-Alay: the Zirabulak-Ziaetdin mountains; the Nuratau range (Samarkand and Bukhara regions). Inhabits mountain slopes, foothills, sandstones. Isolated specimens or small groups can be found. Measures of protection: not protected.



25. ПАХМОКТУКЛИ АСТРАГАЛ

Астрагал ложноланцетниковый / *Astragalus pseudanthylloides* Gontsch.

Мақоми 2. Ҳисор тизмасининг ғарбида тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–25 см, поъсиз қўп йиллик ўт. Барглари 6–12 см узунликда, барг банди яхши тараққий этмаган. Баргчалари 10–16 жуфт, эллипссимон, баъзан тескари тухумсимон, ўткир учли, қаттиқ, устки томони томирли, кулранг, пастки томони оқ тукли ёки ипаксимон тукли, узунлиги 4–12 мм. Гулпоълари барглари-нинг узунлигига тенг ёки улардан биров узунроқ, қисқа, оқиш момик тукли. Гулпоъи момик ва ғовак, узунлиги 10–17 см, 18–25 гулли. Гултожи оқ ёки нимпушти. Уруғдони қалин ётиқ оқ туклар билан қопланган. Май ойида гуллаб, июлда мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг ғарбий тармоқларида (Бойсун, Кетмончолти ва Чўлбайир тоғларида) тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва пастки қисмларида тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 1984 йилдан 2001 йилгача фақатгина 30 туп топилган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [71, 171].

О.Т. Тургинов

Статус 2. Редкий эндемик Западного Гиссара.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение, высотой 15–25 см. Листья длиной 6–12 см, с почти невыраженными черешками. Листочки 10–16-парные, эллиптические, реже обратно-яйцевидные, коротко-остроконечные, жёсткие, сверху жилковатые, сероватые, снизу беловолосистые или шелковистоволосистые, длиной 4–12 мм. Цветоносы по длине равны листьям или длиннее их, коротко-бело-мохнатые. Кисти рыхлые, длиной 10–17 см, 18–25-цветковые. Венчик белый, чуть розоватый. Завязь густо-прижатого-беловолосистая. Цветёт в мае, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: западные отроги Гиссарского хребта (горы Байсунтау, Кетмень-Чапты и Чулбайир).

Места обитания. Каменисто-щебнистые и глинистые склоны в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. С 1984 по 2001 год найдено всего 30 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [71, 171].

О.Т. Тургинов

Rare endemic species of the western branches of the Hissar range. It is spread at the western branches of the Hissar range: the Baysuntau and Chulbair mountains (Surkhandarya region). Inhabits stony and clayey slopes in the lower and middle mountain belts. In 1984–2001, only 30 plants were found. Measures of protection: not protected.



26. ПИСКОМ АСТРАГАЛИ

Астрагал пскемский / *Astragalus pskemensis* Popov

Мақоми 2. Ғарбий Тинь-Шанга ҳос камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Ер ости пояси жуда қисқа бўлган ярим бута. Ўсимлик шохчалари бир йиллик, ингичка, қисқа, 5 см гача узунликда, ётиқ тукли. Баргининг узунлиги 5–8 см, ётиқ ва йўғон оқ тукли. Баргчалари 5–8 жуфт, чизиқли, баъзан чизиқлари тасмасимон шаклга киради, узунлиги 7–12 мм, учи тўмтоқ, ёки салгина ўйилган, икки томони ётиқ оқ туклар билан қопланган. Гулпопуғи зич жойлашган бир нечта бошчалардан иборат. 5–10 гулли, узунлиги 2–2,5 см. Гултожи оқиш. Дуккаги чуқик, бандсиз, ўткир учли, узунлиги 12–20 мм, эни 3–4 мм, ётиқ қора ва оқ туклар билан қопланган, икки уяли. Июль ойида гуллаб, меваси август, сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Писком дарёси ҳавзаси – Тепарсой ва Испайсойларнинг юқори қисмида учрайди.

Ўсиш шароити. Шағалли ва тошли тоғ ёнбағирларида ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уругидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус чоралар ишлаб чиқилмаган. Ўсиш жойлари Уғам-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида жойлашган.

Манбалар. [67, 69, 106, 109].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик Западного Тинь-Шаня.

Краткое описание. Полукустарник с толстым сильноукороченным подземным стволком. Годичные веточки тонкие, короткие, длиной до 5 см, прижато-пушистые. Листья длиной 5–8 см, прижато-белопушистые; листочки 5–8-парные, линейные, реже линейно-продолговатые, длиной 7–12 мм, тупые или слегка выемчатые, с обеих сторон прижато-беловолосистые. Кисти плотноголовчатые, 5–10-цветковые, длиной 2–2,5 см. Венчик беловатый. Вобы продолговатые, сидячие, острые, длиной 12–20 мм, шириной 3–4 мм, прижато-бело- и чернопушистые, двугнездые. Цветёт в июле, плодоносит с августа до сентября.

Распространение. Ташкентская область: бассейн реки Пскем, верховья Тепарсая и Испайсая.

Места обитания. Щебнистые и каменистые склоны гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Места произрастания находится на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [67, 69, 106, 109].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Pskem valley, the heights of the Teparsay and Ispaysay (Tashkent region). Inhabits skeleton and stony slopes of mountains. The quantity is rare. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



27. ПУФАК АСТРАГАЛ

Астрагал тешкопузырчатый / *Astragalus leptophysus* Vved.

Мақоми 2. Ғарбий Помир-Олойда кичик майдонларда тарқалган реликт, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик поясиз ўт. Ингичка новдалари фақат тупроқ остида ривожланади. Тоқ баргли бандида 15–35 жуфт япроғи бор, узунлиги 10–20 см, бандининг узунлиги 3–7 см, ҳурпайган оқ туклар билан қопланган. Баргчалари чўзиқ-тухумсимон, баъзан япроқчалари бир-бирига тегиб туради, узунлиги 10–17 мм, эни 6–9 мм. Гулпояси ҳурпайган оқ тукли. Косачаси узун найсимон, узунлиги 2,5 см, эни 3–4 мм. Гуллари йирик, узунлиги 3 см гача оқ, кейинроқ тўқ қизил туста киради. Дуккаги юмалоқ-тухумсимон, узунлиги 4 см гача етади, эни 3 см. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Жиззах вилоятлари: Туркистон тизмаси ва Нурота тоғларида тарқалган. Тожикистонда (Фатмовут кишлоғи атрофларида) ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Ҳар хил ўтлар, шувоклар ва арчазорлар орасида ҳамда тошли-шағалли ёнбағирларда ва сурилмаларда ўсади.

Сони. Жуда кам. Якка-якка ҳолда, шунингдек 10–20 та ўсимликдан иборат кичик тўплар, ҳолида учрайди. Тарқалиш майдони 5 000 гектарга яқин.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши ўсимликларга салбий таъсир кўрсатмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат қўриқхонасида муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [55, 252, 289].

Н.Ю. Бешко

Статус 2. Редкий реликтовый эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Бесстебельное многолетнее травянистое растение. Развиваются только тонкие побеги под землей. Листья непарноперистые в количестве 15–35 пар, длиной 10–20 см, черешки длиной 3–7 см, оттопыренно-беловолосистые. Листочки продолговато-яйцевидные, иногда налегающие краями друг на друга, длиной 10–17 мм, шириной 6–9 мм. Цветоносы оттопыренно-беловолосистые.



Чашечка длиннотрубчатая, длиной 2,5 см, шириной 3–4 мм. Цветки крупные, длиной до 3 см, белые, в конце цветения темно-красные. Бобы шаровидно-яйцевидные, длиной до 4 см, шириной 3 см. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Самаркандской и Джизакской областях: Туркестанский хребет и Нуратинские горы. За пределами Узбекистана: Таджикистан (окрестности кишлака Фатмовут).

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны и осыпи, среди разнотравно-полевой растительности и арчовников.

Численность. Встречается редко, спорадически, единичными экземплярами или небольшими группами до 10–20 растений. Общая площадь распространения популяций около 5 000 га.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [55, 252, 289].

Н.Ю. Бешко

Rare relict endemic, species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Turkestan range and the Nuratau mountains (Samarkand and Jizzakh regions). Inhabits stony slopes and mounds, among wormwood and other herb species and junipers. Single specimens and small populations (up to 10–20 plants) occur sporadically. Distribution area is about 5000 hectares. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state nature reserve.



28. СОХТА ЧЎЛ АСТРАГАЛИ

Астрагал ложноэремофита / *Astragalus pseudoeremophyta* Popov

Мақоми 2. Жанубий Помир-Олойдаги камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–30 см оралиғидаги поясиз ёки пояси 7 см га етадиган кўп йиллик ўт. Барги 15–30 см узунликда. Баргчалари 8–14 жуфт, юмалоқ, узунлиги 13–20 мм, юмалоқ, тўмтоқ ёки сал ўйилган, устки томони туксиз, пастки томони қалин тукли, четлари киприксимон қалин тукли. Гулпояси баргидан анча қисқа, гулпопуғи 6–10–15 гулдан иборат, узунлиги 7–10 см, қалин тукли. Косачаси узун найсимон, 18–22 мм узунликда, қалин тукли, косачасининг барглари изиғтарсимон тишчалар билан қопланган. Дуккаги тухумсимон чўзиқроқ шаклда, банди 3–7 мм узунликда, пастга қараб осилган, қалин тукли, деярли икки уяли. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Жанубий Помир-Олойда – Боботоғ тизмаси ва Тожикистоннинг жанубидаги пасткам тоғларда тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этаклари ва пастки қисмларидаги қумликларда, бўз ва соз тупроқларда, қизил қумли тошларда, гипсли жинсларда ўсади.

Сони. Кам учрайди. Чағам қишлоғи атрофларида 50 тупи топилган.



Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус чоралар ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [31, 135].

А.С. Эсанкулов

Статус 2. Редкий вид Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение с короткими (не более 7 см) стеблями, высотой 15–30 см. Листья длиной 15–30 см. Листочки 8–14-парные, почти окру-

жённые, длиной 13–20 мм, округло-тупые или едва выемчатые, сверху голые, снизу густопушистые, по краю густо-пушисто-реснитчатые. Цветоносы намного короче листьев, рыхлые, 6–10–15-цветковые кисти длиной 7–10 см, густо-волосистые. Чашечка длиннотрубчатая, длиной 18–22 мм, густо-мохнатая, с ланцетными зубцами. Вобы овальные, на ножке длиной 3–7 мм, поникающие, бархатисто-пушистые, почти двугнездные. Цветёт в марте–апреле, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Южный Памиро-Алай, хребет Бабатаг. За пределами Узбекистана: низкогорья южного Таджикистана.

Места обитания. Пески, лёссы, выходы красных песчаников, глин, гипсоносные обнажения в предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко. Зарегистрировано 50 растений рядом с кишлаком Чагам.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [31, 135].

А.С. Эсанкулов

Rare species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the southern Pamir-Alay, the Babatag range (Surkhandarya region). Inhabits sands, loess, red sandstones, clay, gypseous outcrops in foothills and lower belt of mountains. Very rarely, single specimens and small populations occur sporadically. 50 plants were found nearby the Chagam village. Limiting factors: unknown. Measures of protection: not protected.



29. СУР АСТРАГАЛ

Астрагал сплошь серебристый / *Astragalus holargyreus* Bunge

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Қизилкум қолдиқ тоғларида ўсадиган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см келадиган пойсиз қўп йиллик ўт. Барги мураккаб, баргчалари 3–5 жуфт, ўткир учли, узунлиги 15 мм гача, икки томони ётиқ оқ тукли. Бир нечта тўпгулдан иборат. Тожбарги қизил. Дуккаги тухумсимон, майда. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Қизилкумдаги Букантоғ қолдиқ тоғларда, Чингелди қудуғи атрофларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Қолдиқ тоғларда 1 000 га яқин туплари аниқланган.

Қўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг қўлаб боқилиши натижасида камайган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Камайиб кетиш сабабларини чуқурроқ ўрганиш лозим.

Манбалар. [32, 159].

Г.А. Серекеева

Статус 1. Редкий узкий эндемик останцов Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой до 25 см. Листья сложные, листочки 3–5-парные, острые, длиной до 15 мм, с обеих сторон прижатобеловолосистые. Соцветия головчатые. Венчик красный. Боб яйцевидный, мелкий. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Навоийская область: Кызылкум – останцовые горы Букантау, окрестности колодца Чингельды.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны.

Численность. Около 1 000 растений.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [32, 159].

Г.А. Серекеева

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum; the Bukantau remnant range, near Chingeldi well (Navoi region). Inhabits stony-gravelly slopes. 1 000 plants can be found. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: not protected.



30. ТУК КОСАЧАЛИ АСТРАГАЛ

Астрагал волосистокашечный / *Astragalus lasiocalyx* Gontsch.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шандаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 8–15 см га етadиган кўп йиллик ўт. Ер остида жойлашган қисми ёғочсимон қисқа поядан иборат. Бир йиллик поялари жуда қисқа, узунлиги 0,3–1 см, тигиз жойлашган ётиқ оқ туклар билан қопланган. Барглариининг узунлиги 4–7 см, ётиқ оқ тукли, баргчалари 1–2 жуфт, тухумсимон, ҳар икки томони сийрак ётиқ туклар билан қопланган. Гул-попуги нозик, момик, кўп гулли, узунлиги 3–6 см. Тожбарги қизғиш-сарик тусли. Дуккагининг банди 4 мм узунликда, кам уруғли, туксиз. Май ойида гуллаб, меваси июлда пишади.

Тарқалиши. Тошкент вилоятининг Пскем, Угом, Майдонтол ва Чотқол тизмаларида тарқалган. Қозғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги шағалли-майда тупроқли, тошли ёнбағирлар ва сурилмаларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Номазълум.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Угом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудидаги популяциялари муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [75, 343].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 8–15 см, с укороченным подземным деревянистым стволиком. Годичные стебли длиной 0,3–1 см, густо-прижато-белопушистые. Листья длиной 4–7 см, прижато-беловолосистые, листочки 1–2-парные, яйцевидные, с обеих сторон рассеянно-прижато-волосистые. Кисти рыхловатые, длиной 3–6 см, многоцветковые. Венчик красновато-желтоватый. Бобы на ножке длиной около 4 мм, малосеменные, голые. Цветёт в мае, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: хребты Пскемский, Угамский, Майдантальский и Чаткальский. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Щебнисто-мелкоземистые, каменистые склоны, осыпи и галечники в среднем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [75, 343].

К.Ш. Тожибаев



Rare, endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Pskem, the Ugam, the Maidantal and Chatkal ranges (Tashkent region). Inhabits fine earth, stony and pebble slopes and debris in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



31. ТЎПАЛАНГ АСТРАГАЛИ

Астрагал туपालанский / *Astragalus tupalangi* Goetsch.

Мақоми 1. Помир-Олойдә ўсадиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 35 см атрофида, пояси, ер ости пояси йўғон, қисқа шохли қўп йиллик ўт. Баргининг узунлиги 20–30 см, баргчалари 12–13 жуфт, тухумсимон, 20–27 мм узунликда, устки томони туксиз, фақат пастки томонидаги томирлари сийрак, дағал туклар билан қопланган, четлари дағал, киприксимон тукли. Гулпопуғи момик ва ғовак, қўп гулли, узунлиги 6–7 см. Гулбандининг узунлиги 2–3 мм. Косачаси найсимон, узунлиги 20 мм, туксиз, фақатгина косача баргларининг четлари дағал киприксимон тукли. Гултожи оч сариқ рангли. Дуккаги деярли бандсиз,



чўзиқ-тухумсимон, узунлиги 11–12 мм, эни 7 мм. Май ойида гуллаб, меваси июнь ойида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси; Тўпаланг дарёси ҳавзасида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки ва ўрта қисмидаги тошлоқ ва юзага чиқиб қолган харсанг тошларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши.

Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари.

Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [109, 133].

Ф.Ў Ҳасанов

Статус 1. Редкий эндемик Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой около 35 см, с толстым коротким подземным стволком. Листья длиной 20–30 см, листочки 12–13-парные, яйцевидные, длиной 20–27 мм, сверху голые, снизу с редкими жесткими волосками по жилкам, по краю редко жесткореснитчатые. Кисти рыхлые, длиной 6–7 см, многоцветковые. Цветоножки длиной 2–3 мм. Чашечка трубчатая, длиной 20 мм, голая, лишь на зубцах жесткореснитчатая. Венчик ярко-желтый. Бобы почти сидячие, продолговато-овальные, длиной 11–12 мм, шириной около 7 мм. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область; Гиссарский хребет, бассейн реки Тупаланг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Каменистые склоны, галечники и гранитные скалы в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается единично.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [109, 133].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species of the Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range, the Tupalang river basin (Surkhandarya region). Inhabits granites, stony slopes and pebbles in the lower and middle mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



32. ЮЛИНГАН АСТРАГАЛ

Астрагал оборванный / *Astragalus rhacodes* Bunge

Мақоми 2. Олой тизмасида ўсадиغان камёб ўсимлик.

Кисқача тавсифи. Пастки қисми ёғочсимон ярим бутача. Баргининг узунлиги 7–12 см, барг бандининг узунлиги эса 15–17 см, оқ туклар билан қопланган. Гулпоясининг узунлиги баргига тенг, баъзан эса ундан сал узунроқ. Гулпопуғи момиқ ва ғовак, 10–25 гулли. Косчаси мевалаган пайғида шишади. Гули сариқ. Дуккағи ярим думалоқ ёки чўзиқ ярим тухумсимон шаклда. Май–июнь ойида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой тизмасида (Шоҳимардон, Садқоқ, Қизилтоғ қишлоқлари атрофларида) тарқалган. Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1200–1600 м баландликдаги тоғ ёнбағирларида қизил қумтошларда, майда жинсли ва шағалли тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ёки бир нечта туп ўсимликдан ташкил топган кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Янги ерларнинг ўзлаштирилиши ва қўплаб чорва молларининг боқилиши унинг қўпайишига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқылмаган. Табиатда камайиб кетиш сабабларини аниқлаш учун унинг биологиясини ва экологиясини ўрганиш лозим.

Манбалар. [156–159, 342].

Ғ.М. Шерматов

Статус 2. Редкий вид Алайского хребта.

Краткое описание. Полукустарничек в нижней части древеснеющий. Листья длиной 7–12 см, черешки длиной 15–17 см, беловолосистые. Цветоносы равны листьям, иногда длиннее их. Кисти рыхлые, 10–25-цветковые. Чашечка при плодах вздувается. Цветки желтые. Бобы полуовальные или продолговато-полуовальные. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Ферганская область: Алайский хребет – окрестности кишлаков Шахмардан, Садкак и Кизилтаг. За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Краснопесчанники, каменистые и мелкоземисто-щебнистые склоны на высоте 1200–1600 м.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение территорий, выпас скота.

Культивирование. Выращивалось в условиях Ботанического сада АН РУз.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Необходимо изучение биоэкологических свойств в природе.

Источники. [156–159, 342].

Ғ.М. Шерматов

Rare endemic species of the Alay range. It is spread at the Alay range: nearby the villages Shakhimardan, Sadkak and Kiziltag (Fergana region). Inhabits red sands, stony and fine earth slopes at the altitude of 1200–1600 m. The quantity is unknown. Limiting factors: overgrazing and habitat destruction. Measures of protection: not protected.



33. ЮМАЛОҚ ТЎНГУЛЛИ АСТРАГАЛ

Астрагал почти шахимарданский / *Astragalus subochachimardanus* Popov

Мақоми 2. Кўхитанг тизмасидаги ўта камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15 см гача етадиган пойсиз, йирик чим ҳосил қилувчи кўп йиллик ўт. Барги мураккаб, 5–7 жуфт баргчали. Гулпоиси баргидан бироз узун. Тўнгулли шарсимон. Косачаси гуллаган пайтида найсимон бўлиб, меваси етилиши билан кенгайиб боради ва шар шаклига киради. Дуккаклари майда, оқ тукли. Июлда гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмасининг жанубидаги адирларда тарқалган (Туркменистонда ҳам учрайди).

Ўсиш шароити. Жанубий ёнбағирларда – харсангтошлар орасида ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди. Аниқланган тупларининг сони атиги 1 000 тага тўғри келади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу ҳақда маълумотлар йўқ, аммо шу атрофда яшайдиган аҳолининг чорва моллари ўсимлик ўсган майдонларни пайҳон қилиб кетади.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [32, 159].

Ф.Ў Ҳасанов

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [32, 159].

Ф.О. Хасанов

Very rare endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang range (Surkhandarya region). Inhabits the southern slopes, conglomerate deposits. About 1 000 plants were registered. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



Статус 2. Узколокальный редкий эндемик Кугитанга.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой до 15 см, образующее крупные дерновины. Листья сложные, листочки 5–7-парные. Цветоносы немного длиннее листьев. Соцветие шаровидное. Чашечка вначале трубчатая, при плодах шаровидно-пузырчатая. Бобы мелкие, беловолосистые. Цветёт и плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Южные склоны, конгломератовые отложения.

Численность. Встречается очень редко. Зафиксированная численность не превышает 1 000 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.



34. ҚИЗИЛТОМИР АСТРАГАЛ

Астрагал красножилковый / *Astragalus rubrivenosus* Gontsch.

Мақоми 2. Гарбий Тянь-Шанда жуда кичик майдоиларда сақланиб қолган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Ёйи 3–4 см келадиган, ер бағирлаб ўсувчи қўп йиллик, деярли поясиз ўт. Баргининг узунлиги 10–12 см, баргчалари, асосан, эллипс шаклида, ўткир учли, устки томони сийрак, пастки томони ётиқ тукли. Гулпояси 12–15 см узунликда, мустақкам, баргидан узун. Косачаси шишган, тўрсимон томирли. Дуккагининг узунлиги 13–14 мм, эни 0,5 см. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизмасидаги Оқсоқотасой, Бошқизилсой, Эртошсой ҳамда Серкалисойларда тарқалган.

Ўсиш шароити. Деңгиз сатҳидан 1 800–2 000 м баландликдаги тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди. Аниқланган популяцияларидаги тупларининг сони 3,5–4 мингтани ташкил этади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсимлик популяциясининг катта қисми Чотқол давлат биосфера қўриқхонасида, Угам-Чотқол биосфера резерватида ва Угам-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [32, 159, 293].

А.С. Эсанкулов

Статус 2. Очень редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее, почти бесстебельное приземистое травянистое растение высотой 3–4 см. Листья длиной 10–12 см. Листочки эллиптические, острые, сверху с рыхлыми, снизу с прижатыми волосками. Цветоносы крепкие, длиннее листьев (12–15 см). Чашечка вздутая, сетчато-неровная. Бобы длиной 13–14 мм, шириной 5 мм. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет (Аксакатасай, Башкызылсай, Эрташсай и Серкелисай).

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны на высоте 1 800–2 000 м.

Численность. Встречается очень редко. В известных популяциях общая численность достигает 3,5–4 тысяч экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Большая часть популяций охраняется на территории Чаткальского государственного биосферного заповедника, Угам-Чаткальского биосферного резервата и Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [32, 159, 293].

А.С. Эсанкулов

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range: the Aksak-Atasay, the Bashkyzylsay, the Ertashsay and Serkelisay (Tashkent region). Inhabits stony slopes at the altitude of 1 800–2 000 m. 3,5–4 thousand specimens within 6 populations can be found. Measures of protection: main populations are protected in the Chatkal state biosphere reserve, Ugam-Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.



35. ҚИЗИЛ ТУПРОҚ АСТРАГАЛИ

Астрагал красокоземный / *Astragalus terrae-rubrae* Butkov

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойд тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60 см келадиган, поиси тик мустаҳкам, 6–7 мм йўғонликдаги қўп йиллик ўт. Баргининг узунлиги 20 см, баргчалари 2 жуфт, учбурчак-тухумсимон, узунлиги 6–8 см, эни 4–6 см, ҳар икки томонида томirlари бўртиб туради. Гули сариқ, Дуккаги тухумсимон ёки чўзиқ-тухумсимон, пуфаксимон шишган, узунлиги 8 мм, тўғри тумшукчали. Май ойида гуллаб, июнда мева беради.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасида – Ҳўжагургур-Ота, Қизилсув, Оксув дарёларининг ҳавзаларида ҳамда Қўхитанг тизмасида – Кампиртепа ва Тангидевол бўлимида тарқалган. Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1400–1500 м баландликдаги ер юзасига чиқиб қолган туб жинсли тупроқларда ва турли хилдаги тупроқларда ҳамда тошли тик ёнбағирларда ўсади.

Сони. Қўхитанг тизмасида 200 тупи эниқланган. Ҳисор тизмасидаги сони аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Сони ва уларнинг ўзгариши ҳақида аниқ маълумотлар йўқ. У фақат махсус тупроқ жинсларида ўсишга мослашганлиги учун тарқалиши чегараланган.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида 1979 йилдан буён ўстириб келинади.

Муҳофаза чоралари. Сурхон ва Ҳисор давлат қўриқхоналарида муҳофаза этилади.

Манбалар. [159, 172, 310].

О.Т. Тургинов

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с крепким стеблем высотой до 60 см. Стебель прямостоячий, толщиной 6–7 мм. Листья длиной до 20 см, листочки двухпарные, треугольнояйцевидные, длиной 6–8 см, шириной 4–6 см, с выступающими сверху и снизу жилками. Цветки жёлтые. Бобы яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, длиной 8 мм, вздутые, с прямым носиком. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет



– Ходжагургур-Ата, бассейны рек Аксу, Кызылсу, Катта-Уру-Дарья; хребет Кугитанг – Кампыртепа, Танги-Дувал. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Пестроцветные толщи и выходы коренных пород, крутые каменистые склоны на высоте 1 400–1 500 м.

Численность. Около 200 растений в Кугитанге. Численность на Гиссарском хребте неизвестна.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз с 1979 года.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском и Гиссарском государственных заповедниках.

Источники. [159, 172, 310].

О.Т. Тургинов

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Khoja-Gur-Gur-Ata, the Aksu, the Kyzylsu, the Katta-Uru-Darya river basins; the Kughitang mountains (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits gypseous and native rocks, steep stony slopes at the altitude of 1 400–1 500 m.s.l. 200 plants were counted at the Kughitang. At the Hissar range the magnitude of populations is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan and Hissar state reserves.



36. ҚИЗГИШ АСТРАГАЛ

Астрагал красноватый / *Astragalus rubellus* Gontsch.

Мақоми 1. Фарғона водийсидаги ниҳоятда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 35 см гача етадиган оқ момик тукли, пойсиз, кўп йиллик ўт. Барги 30–35 см узунликда, хурпайган қалин тукли, баргчалари 14–18 жуфт, юмалоқ-тухумсимон. Гулпоиси 15 см узунликда, қисқа хурпайган қалин тукли. Гулпоиғи 11–18 см, 8–15 та қизил гуллардан таркиб топган. Дуккағи шишган, тухумсимон, узунлиги 2 см, қайишсимон, сирти бўртиқ чокли. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Фарғона водийсининг Ёзёвон чўлида, Қўқон шаҳри атрофидаги бўз ерларда ва Қорақалпоқ қишлоғи теварагида ўсади.

Ўсиш шароити. Қум уюмлари орасида, шўрланган қумларда кўпроқ ўсади.

Сони. Жуда кам учрайдиган тур. У фақат ўзлаштирилмай қолган қум уюмлари орасидагина сақланиб қолган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Қишлоқ хўжалиғи учун ўзлаштирилган майдонлар ҳисобига ареалида ўзгаришлар юзага келиб, сони кескин камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [31, 135].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 1. Чрезвычайно редкий эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой до 35 см. Стебли беломохнатые. Листья длиной до 30–35 см, оттопыренно-мохнатые, листочки 14–18-парные, округлояйцевидные. Цветоносы длиной 15 см, коротко-оттопыренно-опушенные. Кисти длиной 11–18 см, состоят из 8–15 цветков. Цветки красные. Бобы длиной до 2 см, вздутые, яйцевидные, кожистые, с выступающими швами. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Ферганская долина: Ферганская область – близ города Коканд, в окрестностях кишлака Кара-Калпак и в песках Языявана.

Места обитания. Межбарханные понижения. Предпочитает слабозасоленные пески.

Численность. Чрезвычайно редкий вид, сохранился только на ограниченной площади неосвоенных песчаных массивов.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение земель под сельхозкультуры.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [31, 135].

Ф.О. Хасанов

Extremely rare, endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the Ferghana valley, nearby Kokand, the village Kara-Kalpak and the Yazyavan sands (Ferghana region). Inhabits sandy hills and slightly saline sands. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of sandy area. Measures of protection: not protected.



37. ҚЎРҒОШИН АСТРАГАЛИ

Астрагал свищовый / *Astragalus plumbeus* (Nevskii) Gontsch.

Мақоми 2. Қўхитанг тизмасидаги эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–23 см оралигидаги поясиз қўп йиллик ўт. Баргининг узунлиги 5–8 см, баргчалари 4–5 жуфт, эллипсимон ёки чўзиқ эллипсимон, қаттиқ, ўткир учли, узунлиги 10–14 мм, ҳар икки томони қалин ётиқ туклар билан қопланган. Гулпояси баргидан 2 марта узун, қаттиқ, деярли тўрт қиррали, ётиқ тукли. Бошчаси 15–25 гулли, юмалоқ ёки тухумсимон, 3–4 см узунликда, зич жойлашган, гуллари деярли бандсиз. Гултожи сариқ, Тугунчаси бандсиз, ётиқ оқ тукли. Июнь–июлда гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Қўхитанг тизмасида учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларидаги оҳак тошли ва майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 2001 йилда 2 000 туп ўсимлик қайд этилган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг тартибсиз боқилиши ўсимликларнинг қўпайишига салбий таъсир этмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [32, 159, 310].

Ф.Ў. Ҳасанов

Причины изменения численности и ареала. Бессистемный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Охраняется на территории Сурханского государственного заповедника.

Источники. [32, 159, 310].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang range (Surkhandarya region). Inhabits lime-stones and slopes in the low and middle mountainous zone. 2 000 plants were revealed in 2001. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



Статус 2. Редкий эндемик Кугитанга.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой 20–23 см. Листья длиной 5–8 см, листочки 4–5-парные, эллиптические или продолговато-эллиптические, жесткие, острые, длиной 10–14 мм, с обеих сторон густо-прижато-пушистые. Цветоносы вдвое длиннее листьев, крепкие, почти четырехгранные, прижато-пушистые. Головки шаровидные или яйцевидные, длиной 3–4 см, плотные, 15–25-цветковые, с почти сидячими цветками. Венчик желтый. Завязь сидячая, прижато-беловолосистая. Цветёт и плодоносит в июне–июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг.

Места обитания. Известняки и мелкоземистые склоны в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. В 2001 году зарегистрировано 2 000 растений.

Размножение. Семенное.

38. ОДИЛОВ АСТРАГАЛИ

Астрагал Адьялова / *Astragalus adylovii* F. O. Khass., Ergashev et Kadyrov

Мақоми 1. Қизилқумнинг қолдиқ тоғларидаги реликт, камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўтсимон ўсимлик, бўйи 20–30 см. Пояси 5–10 см. Барглари 8–12 см узунликда, япроқчалари 4–6 жуфт, ингичка чўзиқроқ шаклда, учи ўткир, пастки томони оқиш, чалкаш тукли, устки томони деярли туксиз. Гулбанди 10–20 см узунликда, оқиш, қалин тукли. Гулпопуғи момик, икки тарафлама жойлашган 10–15 тача гулдан иборат. Косачаси найсимон, оқ ва қора тукли, узунлиги 10–12 см, тишчалари 2–3 мм узунликда. Байроқчаси сариқ, узунлиги 20–23 мм, қайиқчасидан узунроқ. Қанотчаси (эшкаги) байроқчасидан қисқа. Дуккаги осилиб туради, узунлиги 12–15 мм, оқиш қалин тукли, банди 2–3 мм узунликда. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Навоий ва Бухоро вилоятлари: Қулжуктоғнинг шарқий қисмида тарқалган.

Ўсиш шароити. Шимолий юмшоқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. 20 туп ўсимликдан иборат 2 та популяцияси мавжуд.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ншлаб чиқилмаган.

Манбалар. [313].

Ф.О. Хасанов

Статус 1. Реликтовый эндемичный вид останцов Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее растение высотой 20–30 см. Стебель длиной 5–10 см, листья длиной 8–12 см, 4–6 парные, листочки узко-овальные острые, снизу оттопырено бело-волосистые, сверху почти голые. Цветоносы длиной 10–20 см, густо бело-волосистые. Кисти рыхлые, двусторонние, 10–15-цветковые. Чашечка трубчатая, бело- и черно-волосистая, длиной 10–12 мм, зубцы длиной 2–3 мм. Флаг желтый, длиной 20–23 мм, крылья короче флага и длиннее лодочки. Воб повислый, длиной 12–15 мм, густо-беловолосистый на ножке длиной 2–3 мм. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Навоийской и Бухарской областях: горы Кульджуктау (восточная часть).

Места обитания. Северные мягкие склоны.

Численность. Известно 2 популяции (около 20 растений).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не разработаны.

Источники. [313].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the eastern part of the Kuldzhuktau range (Navoi and Bukhara regions). Inhabits the northern grassy slopes. 2 populations with 20 plants were found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



39. АЛЕКСЕЙ АСТРАГАЛИ

Астрагал Алексея / *Astragalus alexeji* Gontsch.

Мақоми 0. Жануби-ғарбий Ҳисор тизмасининг эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Поясиз, қўп йиллик ўт, баландлиги 20 см. Барглариининг узунлиги 18–30 см, баргчалари 16–20 жуфт, юмалоқ, четлари ўйилган, пахмоқ тукли. Гулбанди 4–5 см узунликда, гул-попугининг узунлиги 4–5 см, 3–5 гулдан иборат. Косачаси найчасимон, узунлиги 12–13 мм, пахмоқ тукли. Байроқчаси сарик, кейинроқ қизил тусга киради, узунлиги 25 мм, қанотчаси (эшкаги) 23 мм узунликда, қайиқчаси 21 мм узунликда. Дукчаги текис, сал пастга қараб эгилган, банди 4–5 мм узунликда, наштагисимон, узунлиги 17–20 мм, эни 5–6 мм, тумшукчаси 2–3 мм узунликда, пўсти қалин, пахмоқ тукли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти; Келиф-Шерободдаги қатор тепаликларда (Тошқоқ дарасида) тарқалган.

Ўсиш шароити. Кулранг бўз тупроқларда ўсади.

Сони. Гербарий материаллари йўқ, ҳатто намунавий нусхаси ҳам йўқолган. Уни топиш учун олиб борилган тадқиқотлар натижа бермаган. Бу тур бутунлай йўқолиб кетган бўлиши мумкин.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмаган.

Манбалар. [32, 159, 310].

А.С. Эсанкулов

Статус 0. Эндемик пестроцветных толщ Юго-западного Гиссара.

Краткое описание. Бесстебельный многолетник высотой 20 см. Листья длиной 18–30 см, листочки 16–20-парные, округлые, мелко-выемчатые, бархатисто-мохнатые. Цветоносы длиной 4–5 см, кисти длиной 4–5 см, с расставленными 3–5 цветками. Чашечка трубчатая, длиной 12–13 мм, бархатисто-мохнатая.

Флаг желтый, позже краснеющий, длиной 25 мм, крылья длиной 23 мм, лодочка длиной 21 мм. Бобы горизонтально отклоненные, поникающие, на ножке длиной 4–5 мм, ланцетные, длиной 17–20 мм и шириной 5–6 мм, с носиком длиной 2–3 мм, твердокожистые, бархатисто-мохнатые. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: эндемик Келиф-Шерабадской гряды (урочище Ташкак).

Места обитания. Серые глины.

Численность. Нет ни одного гербарного образца и даже типовой экземпляр утерян. Многочисленные попытки найти вид не увенчались успехом. Вид, по-видимому, исчез.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охранялось.

Источники. [32, 159, 310].

А.С. Эсанкулов

Rare endemic species of the south-western spurs of the Hissar Range. It is spread at the Kelif-Sherabad low mountainous range (Surkhandarya region). Inhabits gray clays. There are no one specimen in herbaria (type specimen is also lost). Probably disappeared. Limiting factors: unknown. Measures of protection: not protected.



40. БЕЛОЛИПОВ АСТРАГАЛИ

Астрагал Белолипова / Astragalus belolipovi Kamelin ex F. O. Khass. et N. Sulejm.

Мақоми 1. Шимолдй Помир-Олойдаги камёб тур.

Қисқача тавсифи. Понсиз ўтсимон ўсимлик, бўйи 30–40 см. Барглари тикансиз, узунлиги 20–30 см, 15–20 жуфт оқ тукли баргчалари ён-атрофига ёйилиб тушган. Гулбанди гулдан узун. Гулпопуклари момик, 15–20 та гулдан иборат; узунлиги 10–15 см. Косачасининг пастки қисми қўқ, дастлаб изйсимон бўлиб, кейинроқ пуфаксимонга айланади, оқ тукли, узунлиги 12–15 мм, тишчаларининг узунлиги 2–4 мм. Байроқчаси яшилсимон-тўқ қизил рангли, узунлиги 25–30 мм,



учи думалоқ айлана шаклида ўйилган, қанотчаси 25–30 мм узунлигда, қайиқчасидан сал узун. Дукчаги номзъдум.

Тарқалиши. Фақат Туркистон тизмасидаги Кулсой дарасида ўсиши аниқланган (Жиззах вилояти, Зомин қўриқхонаси).

Ўсиш шаронти. Тоғларнинг марказий қисмидаги арчазорларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. И. В. Белолипов томонидан ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Зомин давлат қўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [312].

Н.О. Сулаймонов

Статус 1. Редкий эндемик Северного Памиро-Алая.

Краткое описание. Бесстебельное растение высотой 30–40 см. Листья неколючие, длиной 20–30 см, листочки 15–20 парные, оттопыренные, бело-волосистые. Цветоносы длиннее листьев. Кисти рыхлые 15–20-цветковые, длиной 10–15 см. Чашечка внизу синеватая, вначале трубчатая, позже вздувающаяся, бело-волосистая, длиной 12–15 мм, зубцы длиной 2–4 мм. Флаг зелено-ватопурпуровый, длиной 25–30 мм, с округлой пластинкой, на верхушке выемчатый, крылья длиной 25–30 мм, чуть длиннее лодочки. Боб неизвестен. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Джизакская область: Туркестанский хребет (Зазминский государственный заповедник). Известно одно местонахождение вида в урочище Кульсай.

Места обитания. Средний пояс гор, в арчовнике.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Вид культивировался проф. И. В. Белолиповым в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Зааминском государственном заповеднике.

Источники. [312].

Н.О. Сулейманов

Rare endemic species of the northern Pamir-Alay. It is spread at the Turkistan range: the Zaamin state nature reserve, the valley Kulsay (Jizzakh region). Inhabits within juniper forests in the middle mountain belt. The quantity is unknown. Limiting factors: unknown. Measures of protection: protected in the Zaamin state nature reserve.



41. ЖАНУБИЙ ФАРҒОНА АСТРАГАЛИ

Астрагал ҷуноферганский / *Astragalus austroferganicus* Kamelin et R. M. Vinogr.

Мақоми 0. Фарғона водийсидаги ниҳоятда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Қўп йиллик ўт; бўйи 10–20 см. Пояси ингичка, оқ тукли. Барги 1–2–3 жуфт баргчали, узунлиги 1–2–6 см, япроқчалари юмалоқ. Косачаси 12–18 см узунликда, оқ ва қора тукчалари тарқоқ. Байроқчаси сариқ, узунлиги 20 мм, қанотчаси 17–18 мм узунликда, қайиқчасининг узунлиги 18–20 мм. Дўккаги 20–50 мм узунликда, бандининг узунлиги 2–3 мм, тўғри, оқ тукли, тумшукчасининг узунлиги 8–10 мм. Май ойида гуллаб, меvasи июнда етилади.

Тарқалиши. Фарғона водийси: Фарғона вилояти (Янгиарик)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Шўрхок тупроқларда ўсади.

Сони. 1928 йили бир мартагина А. Йoffe томонидан йиғилган. Бу тур йўқолиб кетган бўлиши мумкин.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайган.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик тарқалган жойларда ҳўжалик ишлари юритилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмаган.

Манбалар. [65, 159].

Ф.Ў Ҳасанов

Статус 0. Редчайший эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Многолетник высотой 10–20 см. Стебли тонкие беловолосистые. Листья 1–2–3-парные, длиной 1–2–6 см, листочки округлые. Чашечка длиной 12–18 мм, бело- и черно-рассеино-волосистая. Флаг желтый, длиной 20 мм, крылья длиной 17–18 мм, лодочка длиной 18–20 мм. Бобы длиной 20–50 мм, на ножке длиной 2–3 мм, прямые с носиком длиной 8–10 мм, беловолосистые. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Ферганская долина: Ферганская область (Янгиарык).

Места обитания. Соленосные глины.

Численность. Собран один раз А. Йoffe в 1928 году. Вид, по-видимому, исчез.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственная деятельность.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охранялось.

Источники. [65, 159].

Ф.О. Ҳасанов

Rare endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the foothills, nearby Ferghana city (Ferghana region). Inhabits salty clays. The plants were collected by A. Joffe in 1928. Probably disappeared. Limiting factors: habitat destruction. Measures of protection: not protected.



42. ҚИЗИЛ ХҲРОЗ АСТРАГАЛИ

Астрагал кызыл-хураский / *Astragalus rubri-galli* Popov

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойд тарқалган камёб реликт эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўтсимон ўсимлик, бўйи 10–20 см. Барглари 5–7 жуфт узунлиги 5–7 см, туқлари қаттиқроқ. Гулбанди қисқа, узунлиги 3–4 см. Косачаси найсимон, узунлиги 15–17 мм, оқ ва қора тукли. Байроқчаси 25 мм узунликда, учи ўйилган, қанотчаси 25 мм узунликда, қайиқчаси 22 мм узунликда. Дуккаги бандсиз, кенг чизиклари бор, узунлиги 25–30 мм, ёйсимон букилган, оқ, қаттиқ тукли, икки уяли.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Шербод тепаликларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Қизил кумтошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 2001 йили 12 туп ўсимлик борлиги аниқланган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши, турнинг реликтлиги ва ола тусли тупроқларнинг қисқариб кетаётганлиги натижасида қисқарган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [3, 310].

Н.Т. Очилова

Статус 1. Реликтовый эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее растение высотой 10–20 см. Листья 5–7-парные, длиной 5–7 см, жестковато-пушистые. Цветоносы короткие, кисти длиной 3–4 см. Чашечка трубчатая, длиной 15–17 мм, бело- и черно-волосистая. Флаг длиной 25 мм, на верхушке выемчатый, крылья длиной



23 мм, лодочка длиной 22 мм. Бобы сидячие, широколинейные, длиной 25–30 мм, дуговидно изогнутые, бело-жестковолосистые, двугнездные. Цветет в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Сурхандарьинская область: Келиф-Шерабадская гряда.

Места обитания. Краснопесчанниковые склоны.

Численность. В 2001 году было зарегистрировано 12 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота, реликтовость вида и сокращение пестроцветов.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [3, 310].

Н.Т. Очилова

Rare relict endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Kelif-Sherabad low mountainous range (Surkhandarya region). Inhabits red gypsaceous slopes. In 2001, 12 plants were found. Limiting factors: pasturing, relict characters and decreasing of gypsaceous areas. Measures of protection: not protected.



43. ШУЪЛАЛИ ЗИРАКЎТ

Эспарцет таверниеролистный / *Onobrychis tavernierifolia* Stocks ex Boiss.

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Қизилқумда жуда оз миқдорда сақланиб қолган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 3–7 см келадиган, ер бағирлаб ўсувчи, денрли поясиз, туклар билан қопланган бир йиллик ўт. Барги, асосан, битта, йирик, тескари-тухумсимон ёки 1–2 жуфт ёнбаргчали, устки томони калта ётиқ, пастки томони хурпайган оқ тукли, банди 5 см узунликда. Гулпоясининг узунлиги 2–3,5 см. Гулпопути момик, 3–7 гулли. Косачасининг узунлиги 3–3,5 мм. Дуккаги гадир-будур каткачали, узунлиги ва эни 1 см атрофида. Май ойида гуллайди, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро вилояти: Қизилқумдаги қолдиқ тоғли жойларда (Кулжуктоғ этакларида жойлашган Чурук, Оёқгужумли кудуқлари атрофида) тарқалган. Эронда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғлардаги шағалли-тошли ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Бир-бирдан узокда якка-якка холда, баъзан эса 2–3 туп бўлиб ўсади. 2009 йили 94 туп ўсимлик қайд этилган.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди. Уруги қаттиқ қорик ичида жойлашган. Шунинг учун ёгин қўп бўлган йиллари яхши униб чиқади.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг қўплаб боқилиши натижасида ўсимлиكنинг сони камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. 1962–1964 йилларда ЎзР ФА Қизилқум чул станциясида экиб ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [138, 153].

Х.Ф. Шомуродов

Статус 1. Очень редкий и малочисленный вид в Юго-западном Кызылкуме.

Краткое описание. Однолетнее приземистое, высотой 3–7 см, почти бесстебельное, опушенное растение. Листья с верхней стороны покрыты короткими прижатыми, а снизу длинными торчащими белыми волосками, расположены на длинных (до 5 см) черешках, оканчивающихся крупной долькой-листочком обратнойцевидной формы. Цветоносы длиной 2–3,5 см. Кисти рыхловатые,

3–7-цветковые. Чашечка длиной 3–3,5 см. Бобы морщинисто-ячеистые, длиной и шириной около 1 см. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Бухарская область: останцовые низкогорья Кызылкума – Кулджуктау, близ колодцев Аяк-Гужумды и Чурук. За пределами Узбекистана: Иран.

Места обитания. Каменистые и каменисто-щебнистые склоны останцовых гор.

Численность. Встречается сильно удаленными друг от друга единичными экземплярами, реже по 2–3. В 2009 году найдены 94 растения.

Размножение. Семенное. Семена покрыты твердой оболочкой, поэтому в годы с обильными осадками отмечается интенсивное прорастание.

Причины изменения численности и ареала. Нарушение среды обитания в результате чрезмерного выпаса скота.

Культивирование. В 1962–1964 гг. были выращены в коллекционном питомнике на Кызылкумской пустынной станции АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [138, 153].

Х.Ф. Шомуродов

Very rare species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Kuldzhuktau, near Ayak-Guzhumdy and Churuk (Bukhara region). Inhabits stony and gypseous slopes. There are three small populations can be found. Limiting factors: degradation of habitat as a result of overgrazing. Measures of protection: not protected.



44. БУРЧОҚСИМОН КАЛИСПЕПЛА

Калиспепла эгакантовая / *Callispepla aegacanthoides* Vved.

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойда йўқолиб кетиш арафасида турган реликт эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–40 см, йиллик поялари тикансимон, ётиқ оқш туклар билан қопланган ёстиқсимон ярим бута. Барглари уч бўлакли, ёнбаргсиз, пастдагиси бандли, юқоридагилари деярли бандсиз. Гули сариқ, Дуккаги нишли-чизикли, ўткир учли, қалин, ётиқ тукли. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Бойсун тоғидаги Мачайдарё ҳавзасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги юзаси очилиб қолган ола тусли тупроқларда, нураган тошли ёнбағирларда ва сийрак арчазорларда ўсади.

Сони. Ўсимлик ўсган майдонлар учта жойда борлиги аниқланган. 2009 йилдаги изланишлар ўсимлик популяциясининг Дарбанд қишлоғидан 8–10 км юқоридаги тоғли ҳудудларда сақланиб қолганлигини кўрсатди. Ўсимлиkning мазкур популяциясида туплар сони 500 та атрофида.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тўлиқ ўрганилмаган. Антропоген омиллар таъсирида тарқалиш майдонлари қисқариб бораётганлиги кузатишмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1982 йили табиатдан олиб келиб ўтказилган инки туп ўсимлик қуриб қолган, 2009 йилда Ботаника боғига ўсимлиkning туплари қайта экилган. Аммо бу уриниш ҳам натижа бермаган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.
Манбалар. [56, 169, 294].

И.В. Белодипов

Статус 1. Редчайший эндемичный вид реликтового монотипного рода Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Подушковидный полукустарник высотой 20–40 см. Все растение седоватое от прижатых волосков. Годичные стебли с почти колючими ветвями. Листья без прилистников, тройчатые, нижние на черешках, верхние почти сидячие. Цветки жёлтые. Боб линейно-ланцетный, острый, густо-прижато-волосистый. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Бассейн реки Мачайдарья в Байсунских горах.

Места обитания. Каменистые эродированные склоны и обнажения пестроцветов, разреженные арчовники среднего пояса гор.

Численность. Отмечен в трех

пунктах. Исследования 2009 года выявили одну популяцию 8–10 км выше кишлака Дарбанд, с численностью не более 500 экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Изучено недостаточно. Под влиянием антропогенных факторов наблюдается сокращение площадей популяции.

Культивирование. Попытка интродукции 2-х взрослых растений в Ботаническом саду АН РУз в 1982 году оказалась неудачной. В 2009 году приступили к повторным попыткам вырастить растение в Ботаническом саду.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [56, 169, 294].

И.В. Белодипов

Unique relict endemic species and monotypical genus of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Baysun mountains (Surkhandarya region). Inhabits stony eroded slopes and outcrops of gypsaceous rocks, sparse juniper stands in the middle belt of mountains. In 2009, 1 large population (about 500 plants) was revealed. Limiting factors: insufficiently known. Distribution area of population decreasing under the influence of anthropogenic factors. Measures of protection: not protected.



45. ҚОРАПОЯ МОЙҚОРАҒОН

Майқараган сетчатый / *Calophaca reticulata* Sumnev.

Мақоми 1. Ғарбий Помир-Олой тизмаларидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Унча баланд бўлмаган сершоҳ бута. Барглари қумушранг, ҳар икки томони ётиқ қалин туклар билан қопланган, баргчалари 4–5 жуфт, чузқроқ. Ёнбаргчаларининг асоси учбурчаксимон. Тўпгуллари бошчасимон, тигиз. Дуккагининг узунлиги 35–40 мм. Июнда гуллаб, меvasи июль–август ойларида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг Бойсун тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги шағалли ёнбағирларда ва арчазорлар орасида ўсади.

Сони. Табиатда онда-сонда учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг қўлаб боқилиши ва ўсимликдан ўтин сифатида фойдаланилиши натижасида сони камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.



Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [273, 310].

О.Т. Тургинов



Статус 1. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Невысокий сильноветвистый кустарник. Листья серебристо-белые, с обеих сторон густо покрыты прижатыми волосками, с 4–5 парами продолговатых листочков. Прилистники при основании треугольные. Соцветие головчатое, скученное. Плод – боб длиной до 35–40 мм. Цветёт в июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет (Байсунские горы).

Места обитания. Щебнистые склоны в среднем поясе гор, среди арчовников.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота, заготовка на топливо.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [273, 310].

О.Т. Тургинов

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range; the Baysun mountains (Surkhandarya region). Inhabits slopes in the juniper zone. The quantity is unknown. Limiting factors: overgrazing and cutting as fuel wood. Measures of protection: not protected.



46. ЙИРИК НУХАТ

Нут большой / *Cicer grande* (Forow) Korotkova

Мақоми 1. Гарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Баландлиги 20–45 см. Пояси салгини буралган, безчали туклар билан қопланган қўп йиллик ўт. Баргининг узунлиги 4–7 см, барг бандининг учи оддий ёки 3–5 та гажаги бор. Баргчалари 4–7 жуфт, чўзиқроқ-эллипс шаклида, узунлиги 10–25 мм, эни 6–12 мм, ҳар икки томони калта, безчали туклар билан қопланган, гулпоясининг узунлиги 2,5–3,5 см, гулбанди 4–6 мм узунлиқда. Косачасининг узунлиги 10 мм, тугунчаси туклар билан қопланган. Май ойида гуллаб, июнь ойида мевалайди.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд, Навоий ва Сурхондарё вилоятлари: Помир-Олойда, Нурота, Оқтов ва Қўхитанг тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмларидаги тошли ва майда заррали тупроқлардан иборат ёнбағирларда ўсади. Нурота қўриқхонаси ҳудудидаги учта тоғ дарасида тарқалганлиги аниқланди. Умумий сони бир нечта юз ўсимликдан иборат, популяцияси 5–6 гектарга яқин майдонда тарқалган.

Сони. Яқка-яқка ҳолда учрайди, баъзан унча катта бўлмаган тўплар ҳосил қилади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг тартибсиз боқилиши натижасида ўсимлик сони камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота ва Сурхон давлат қўриқхоналарида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [151, 154, 181, 184].

Н.Ю. Бешко

Статус 1. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее растение высотой 20–45 см, стебли слегка извилистые, опушенные железистыми волосками. Листья длиной 4–7 см, черешки заканчиваются простым или 3–5-ветвистым усиком; листочки 4–7-парные, овально-эллиптические, длиной 10–25 мм, шириной 6–12 мм, с обеих сторон коротко-железисто-опушенные. Цветоносы длиной 2,5–3,5 см, цветоножки – 4–6 мм, чашечки длиной 10 мм, завязь покрыта волосками. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Сурхандарьинской областях: Памиро-Алай, хребты Нуратау, Актау и Кугитанг.

Места обитания. Каменисто-мелкоземистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами, реже образует небольшие группы. На территории Нуратинского заповедника отмечен в 3-х урочищах, общая численность составляет несколько сотен растений, занятая популяциями площадь около 5–6 га.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском и Сурханском заповедниках.

Источники. [151, 154, 181, 184].

Н.Ю. Бешко



Rare endemic species of the western branches of Pamir-Alay. It is spread at the Pamir-Alay: the Nuratau, Aktau and Kugitang ranges (Jizzakh, Samarkand, Navoi and Surkhondarya regions). Inhabits stony slopes in the middle mountainous zone. Single specimens and small populations can be found. On the territory of Nuratau nature reserve 3 populations are known (several hundred plants), distribution area is about 5–6 hectares. For Kugitang range, there is no data on populations size. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: protected in the Nuratau and Surkhan state nature reserves.



47. КУДРОЙИ НҲАТ

Нут седой / *Cicer incisum* Korotkova

Мақоми 1. Ғарбий Помир-Олойнинг камёб эндемик тури.

Қисқача тавсифи: Узунлиги 20–30 см келадиган ярим бутача. Бўртма, тўлқинсимон поясининг ранги кўкимтир. Барглари жуфт-патсимон, узунлиги 2,5–4 см. Барглариининг банди ўзагига томон тикансимон туклар билан қопланган бўлади. Япроқчалари 4–6 жуфт, учли понасимон ёки тухумсимон, калта тукчалар билан қопланган. Гулпоёси 10–15 мм узунликдаги туклар билан қопланган, 1,5–2,5 см узунликдаги 1–2 та гулдан иборат. Гулкосаси тукли, 8–10 мм узунликда. Байроқчасининг узунлиги 20 мм, ташқи томони тукли. Қанотчалари 14–15 мм, қайиқчаси 13–14 мм. Дуккаги тукли, 2,5 см узунликда. Июль ойида гуллаб, августда мева тугади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Қизилдарё ҳавзаси (Тошқўрғон қишлоғи).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қояларда ўсади.

Сони. 1996 йилда 20 та ўсимлик қайд қилинган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тарқалиш доираси тор бўлган стенобионт эндемик тур.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқ-хонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [151, 154, 181, 184].

И.И. Мальцев

Статус 1. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Полукустарничек с сизыми, извилистыми, железистыми стеблями высотой 20–30 см. Листья парноперистые, длиной 2,5–4 см, с осью, переходящей в колючку. Листочки 4–6-парные, клиновидные или яйцевидные, коротко опушенные. Цветоносы 1–2 цветковые, длиной 1,5–2,5 см, с осью длиной 10–15 мм. Чашечка опушенная, длиной 8–10 мм. Флаг снаружи опушенный, длиной 20 мм, крылья длиной 14–15 мм, лодочка длиной 13–14 мм. Боб опушенный, длиной 2,5 см. Цветет в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Кашкадарьинская область: бассейн реки Кызылдарья (кишлак Ташкуртан).

Места обитания. Скалы в среднем поясе гор.

Численность. В 1996 году было зарегистрировано 20 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Узколокальный эндемичный стенобионт.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [151, 154, 181, 184].

И.И. Мальцев

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Kyzyl-darya valley, nearby the village Tashkurgan (Kashkadarya region). Inhabits rocks in the middle mountainous zone. Seldom, single or small brushwoods with other woody and shrubby plants can be observed, very seldom, small pure brushwoods can be found. In 1996, only 20 plants were found. Limiting factors: endemic species. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



48. ВВЕДЕНСКИЙ ОКСИТРОПСИ

Остролодочник Введенского / *Oxytropis vvedenskyi* Filim.

Мақоми 3. Ҳисор тизмасида тарқалган эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 5–10 см, ёғочсимон, йўғон ўқ илдизли яримбута. Баргининг узунлиги 1,5–3 см, банди ярим ётиқ, оқ тукли. Баргчалари 5–6 жуфт, тигсимон-чўзиқ, ҳар иккала томони сийрак, ётиқ оқ туклар билан қопланган, узунлиги 3–5 мм, эни 1–1,5 мм. Гулпопуғи 6–8 гулли, ғовақ. Гултожи бинафша рангли. Дуккаги чўзиқ ёки думалоқ-чўзиқ, узунлиги 10–12 мм, эни 0,3–0,4 мм, банди 1,5 мм узунликда, майда, ётиқ қора ва оқ тукли. Июнь–август ойларида гуллаб, меваси август–сентябрь ойларида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг жанубий ёнбағрида, Бойсун тоғларида тарқалган.

Ўсиш шаронти. Тоғларнинг ўрта ва юқори қисмларида майда заррали тупроқлар, тошли ва шөгалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 3. Эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Полукустарник высотой 5–10 см с толстым деревянистым стержнем. Листья длиной 1,5–3 см с полуприжато-белово-

лосистыми черешками. Листочки 5–6(7)-парные, ланцетно-продолговатые, с обеих сторон негусто-прижато-беловолосистые, длиной 3–5 мм, шириной 1–1,5 мм. Кисти 6–8 цветковые, рыхлые. Венчик фиолетовый. Бобы продолговатые или продолговато-овальные, длиной 10–12 мм, шириной 0,3–0,4 мм, на ножке длиной 1,5 мм, покрытые мелко-прижато-бело- и черноволосистые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: южные отроги Гиссарского хребта, Байсунские горы.

Места обитания. Пологие мелкоземистые, скалистые и каменистые склоны в среднем и верхнем поясах гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.О. Хасанов

Endemic species of the Hissar range. It is spread at the southern spurs of the Hissar range (Baysun mountains, Surkhandarya region). Inhabits fine earth, rocky and stony slopes in the middle and upper mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



49. МАЙДА ГУЛЛИ ОКСИТРОПИС

Остролодочник мелкоцветный / *Oxytropis tyttantha* Gontsch.

Мақоми 3. Ҳисор тизмасида тарқалган эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–20 см, поясиз қўп йиллик ўт. Баргнинг узунлиги 8–10 см; баргчалари 15–25 жуфт, тухумсимон чўзиқ, баъзан кенг ёйилган, ўткир учли, узунлиги 5–12 мм ли нишлар билан, баъзан тўмтоқ, дағал оқ туклар билан қопланган. Гулпопуғи калта, зич, тухумсимон ёки юмалоқ, узунлиги 1,5–2 см, эни 1–1,5 см, 10–15 гулли. Косачаси қўнғирроқ ёки наъсимон қўнғирроқ, узунлиги 5 мм, дағал ярим ётиқ тукли. Дуккагининг банди 2 мм атрофида, чўзиқ, узунлиги 10–15 мм, тумшукчаси 2–3 мм узунликда, сал эгилган, бигизсимон. Август–сентябрь ойларида гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасида Қашқадарё, Тупаланг, Сангардак дарёлари ҳавзаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта ва юқори қисмларидаги тошли ва майда тупроқли ёнбағирларда, юзаси очилиб қолган қизил тупроқларда ўсади.

Сони. Яқка-яқка ҳолда тарқалган.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 3. Эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное растение высотой 10–20 см. Листья длиной 8–10 см. Листочки 15–25-парные, яйцевидно-продолговатые или широколанцетные, длиной 5–12 мм, острые, реже туповатые, рыхлые или густо-жестко-шероховато-прижатобеловолосистые. Кисти укороченные, довольно густые, яйцевидные или почти округлые, длиной 1,5–2 см, шириной 1–1,5 см, 10–15-цветковые. Чашечка колокольчатая или трубчато-колокольчатая, длиной 5 мм, полуприжатожестковолосистая. Бобы продолговатые, длиной 10–15 мм, плодоножка длиной около 2 мм, со слегка вниз изогнутым шиловидным носиком длиной 2–3 мм. Цветёт в августе–сентябре, плодоносит в сентябре.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет, бассейны рек Кашкадарья, Тупаланг, Сангардак.

Места обитания. Каменистые и мелкоземистые склоны, реже выходы красных глин в среднем и верхнем поясе гор.

Численность. Встречается одиночными особями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.О. Хасанов

Endemic species of the Hissar range. It is spread at the Hissar range, the Kashkadarya, the Tupalang, the Sangardak river basins (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits stony and fine earth slopes, rarely, red clay in the middle and upper belts of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



50. МАЙДОНТОЛ ОКСИТРОПИСИ

Остролодочник майдантальский / *Oxytropis maidantaleensis* B. Fedtsch.

Мақоми 2. ГАРБИЙ ТИҢЬ-ШАҢДА ЎСУВЧИ КАМЁБ ЭНДЕМИК ЎСИМЛИК.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик, калта ўқ илдизли, деврли пояси, сийрак чим ҳосил қилувчи, оқ пахмоқ тукли ўсимлик. Баргининг узунлиги 2,5–7 см, 5–12 жуфт, баргчалари чуқроқ. Гулдонсининг узунлиги баргига тенг ёки ундан узунроқ. Гулпопуғи бошчасимон, зич жойлашган қизил гуллардан иборат. Дуккаги пуфаксимон, чуқик тухумсимон, узунлиги 15 мм, қаттиқ, тумшукчали, қалин хурпайган тукли. Июль ойларида гуллаб, августда мева беради.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Майдонтол дарёсининг ҳавзасида. Ўзбекистондан ташқарида эса Қозоғистон ва Қирғизистонда тарқалган.

Ўсиш шароити. Тошли-шағалли тоғ ён-бағирларида ўсади.

Сони. Санокли даражада учрайди. Ўзбекистондаги умумий сони 3 000 дан ортмайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Уғам-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудидаги ўсиш жойлари муҳофазага олинган.

Манбалар. [10, 47, 76, 212, 304, 305].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 2. Редкий узколокальный эндемик Запального Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее, короткостержневое, многоглавое травянистое растение, почти бесстебельное, рыхлодерновинное, беломохнатое от опушения. Листья длиной 2,5–7 см, 8–12-парные, с овальными листочками. Цветоносы равны листьям или длиннее их, с густой головчатой кистью красных цветков. Бобы вздутые, удлинённо-яйцевидные, длиной около 15 мм, с прямым твердым носиком, густо-оттопыренно-шерстистые. Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Ташкентская область: бассейн реки Майдантал. За пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны.

Численность. Встречается одиночно. Общая численность в Узбекистане не превышает 3 000 экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [10, 47, 76, 212, 304, 305].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam range: the Maidantal river basin (Tashkent region). Inhabits stony and gravelly. Single specimens can be found. The number is about 3 000 plants in Uzbekistan. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



51. НИМ ПУШТИ РАНГ ОКСИТРОПИС

Остролодочник ложнорозовый / *Oxytropis pseudorosea* Filim.

Мақоми 2. Нурота тоғларида тарқалган эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Вўйи 30–40 см, пояси, ёғочсимон кўп йиллик ўт. Баргининг узунлиги 10–15 см, яшил, ётиқ ипаксимон тукли. Асосий банди ва баргчаларининг банди кумушсимон тукли. Гулпопуғи момик, говак, чўзиқроқ, узунлиги 7–15 см, кўп гулли, гуллари сийрак жойлашган. Косчаси қўнғироқсимон, узунлиги 12–14 мм, оқ тукли. Гултожи пушти-бинафша рангли. Дуккаги чўзиқ, узунлиги 10–15 мм, эни 4–5 мм, тумшукчасининг узунлиги 5–6 мм, қалин оқ туклар билан қопланган, деярли икки уяли. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота ва Оқтоғ тизмаларида тарқалган.



Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки ва ўрта қисмидаги шағалли-тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ва кичик тўпалар ҳолида учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши натижасида ўсимлиكنинг сони камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота қўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [10, 47, 76, 304, 305].

Н.Ю. Бешко

Статус 2. Эндемик Нуратинских гор.

Краткое описание. Бесстебельное растение высотой 30–40 см с деревянистым стержневым корнем. Листья длиной 10–15 см, прижато-шелковисто-опушенные, зеленые; черешки, как и ось, шелковисто-волосистые. Кисти рыхлые, длиной 7–15 см, многоцветковые, с расставленными цветками. Чашечка колокольчатая, длиной 12–14 мм, прижато-бело-опушенная; с шиловидными, равными трубке зубцами. Венчик розово-лиловый, в сухом виде фиолетовый. Бобы продолговатые, длиной 10–15 мм, шириной 4–5 мм, с носиком длиной 5–6 мм, густо-прижато-беловолосистые, почти двугнездные. Цветет в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях: хребты Нуратау и Актау.

Места обитания. Каменно-щебнистые склоны нижнего и среднего пояса гор.

Численность. Встречается редко, единично или небольшими популяциями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Основную угрозу представляет чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Н.Ю. Бешко

Endemic species of the Nuratau mountains. It is spread at the Nuratau and Aktau ranges (Jizzakh, Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony and gravelly of the lower and middle belts of mountains. Single specimens and small populations occur sporadically. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



52. ФЕДЧЕНКО ОКСИТРОПИСИ

Острове́дочник Фе́дченко / *Oxytropis fedtschenkoana* Vassilcz.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шанда кам тарқалган эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик, қисқа ўқ илдизли, поясиз, юмшоқ чимли, қалин туклар билан қопланган ўсимлик. Баргларининг узунлиги 2–3 см, баргчалари 3–8 жуфт, чўзиқроқ думалоқ шаклда. Гулпояси баргидан узун. Дуккаги пўстлоқли, юмалоқ пуфаксимон, узунлиги 15 мм. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол ва Қурама тизмаларининг ғарбий қисмларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг қуруқ шағалли-тошли ёнбағирларида ва майда тошли ярим мустаҳкамлашган сурилмалардан, тоғларнинг юқори минтақасида ўсади.

Сони. Бу турнинг бир-биридан алоҳида жойлашган 6 та популяцияси маълум. Лекин уларнинг сони ва майдони унча катта эмас, яъни, 100 м² майдонга 1–2 тупи тўғри келади, умумий сони тахминан 4,5–5 минг атрофида.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Рақобатга чидамсиз. Мунтазам равишда чорва моллари боқиладиган ерларда ўсади. Ёввойи ҳайвонлар ҳам истеъмол қилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. ва Уғам-Чотқол биосфера резерватида ўсади.

Манбалар. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 2. Редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее, бесстебельное, мелкодерновинное, короткостержневое растение, седое от густого опушения. Листья длиной 2–3 см, 3–8-парные, с овальными листочками. Цветоносы длиннее листьев. Бобы кожистые, шаровидно-вздутые, длиной до 15 мм. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: западные оконечности Чаткальского и Кураминского хребтов.

Места обитания. Сухие крупнощебнистые склоны и мелкощебнистые полустакрепленные осыпи в верхнем поясе гор.

Численность. Отмечен в 6 удаленных друг от друга популяциях. Каждая из них невелика по площади и немногочисленна по составу. Растения неравномерно удалены друг от друга, единичны, в среднем по 1–2 на 100 м². Общая численность ориентировочно оценивается в 4,5–5 тысяч экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Низкая конкурентоспособность. Произрастает в зоне интенсивного летнего выпаса, поедается дикими и домашними животными.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Произрастает на территории и Угам-Чаткальского биосферного резервата.

Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.О. Ҳасанов

Rare endemic species of the Western Tien-Shan. It is spread at the western outskirts of the Chatkal and Kurama ranges (Tashkent region). Inhabits dry dry gravelly slopes and semi-fixed scree in the upper mountain zone of mountains. 6 populations were revealed. Each of them occupies a small area and is not numerous. Plants irregularly distant one from other, single, an average 1-2 specimens per 100 m² can be observed. Total number is approximately evaluated at 4 500–5 000. Limiting factors: low competition capacity. It grows in the zone of intensive summer pasturing. It is eaten by wild and domestic animals. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve and Ugam-Chatkal biosphere reserve.



53. ЮПҚА ПАРДАЛИ ОКСИТРОПИС

Остролодочник ложнооттопырчатый / *Oxytropis pseudoleptophylla* Boriss.

Мақоми 2. Кўхитанг тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 4–10 см, қалин бурама туклар билан қопланган, пойсиз, кўп йиллик ўт. Баргларининг узунлиги 2–10 см, чўзиқ, банди хурпайган оқ туклар билан қопланган. Баргчалари 5–8 жуфт, учли, ҳар икки томони пахмоқ тукли, узунлиги 5–7 мм, эни 3–5 мм. Гулпопуғи говакроқ, 8–12 гулли, косачасининг узунлиги 5–7 мм. Гултожи кўк ёки ҳаворанг. Дуккаги пуфаксимон шншган, тухумсимон-юмалоқ, юмшоқ, хурпайган оқ тукли, узунлиги 13–18 мм, эни 10–15 мм гача етади. Май–июнь ойларида гуллаб, июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмларидаги тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маданийлаштирилмаган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 2. Редкий эндемик Кугитанга.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное растение, высотой 4–10 см, все густоохнатое от длинных отклоненных белых волосков. Листья продолговатые, длиной 2–10 см, с оттопыренно-волосистыми черешками. Листочки в числе 5–8 пар, островатые, с обеих сторон густоохнатые, длиной 5–7 мм, шириной 3–5 мм. Кисть рыхловатая, 8–12-цветковая. Чашечки длиной 5–7 мм. Венчик синий или голубоватый. Бобы вздутые, яйцевидно-ша-

ровидные, мягко-оттопыренно-беловолосистые, длиной 13–18 мм, шириной около 10–15 мм. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Не культивируется.

Меры охраны. Охраняется в Сурхонском государственном заповеднике.

Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang range (Surkhondarya region). Inhabits stony slopes in the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection; protected in the Surkhan state reserve.



54. АНГРЕН ТАНГАЎТИ

Косачечник ангрениский / *Hedysarum angrenicum* Korotkova

Мақоми 1. Гарбий Тянь-Шаннинг Чотқол тизмасида учрайдиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см га етадиган поясиз, қишда ер усти қисмлари қуриб қоладиган кўп йиллик ўт. Барги мураккаб, узунлиги 10–16 см, баргчалари 3–4 жуфт, чўзиқроқ айлана шаклида, ҳар икки томони тукли, устки томони сийрак, пастки томони қалин тукли. Тўнгули баргига тенг, баъзан ундан узунроқ, 16–18 см. Косачаси узун тукли. Дўкағи туксиз, бир-икки, баъзан уч бўғимли. Июнь ойида гуллаб, меваси июль–августда етилади.



Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Чотқол тизмаси (Охангарон дарёси ҳавзаси) ва Фарғона водийси (Оқсув ва Қорасув дарёлари ҳавзалари)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли шимолий ёнбағирларда ўсади.

Сони. Яқка-яқка ҳолда учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ташқари кўп боқилиши туфайли ўсимлиkning уруғ бериши пасайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.
Манбалар. [137, 150].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой до 20 см, с отмирающей на зиму надземной частью. Листья

длинные (10–16 см), сложные, 3–4-парные. Листочки овальные, сверху слабоопушенные, снизу густоволосистые. Цветоносы равны листьям, иногда чуть длиннее их (до 16–18 см). Чашечка длинноволосистая. Бобы без щетинок, одно-, двух-, реже трёхчленистые. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Чаткальский хребет – бассейн реки Ахангаран; Ферганская долина – бассейны рек Аксу и Карасу.

Места обитания. Каменистые северные склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Нарушение среды обитания, снижение семенной продуктивности в результате чрезмерного выпаса.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [137, 150].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range; the Akhangaran; the Fergana valley; the Aksu and Karasu river basins (Tashkent and Namangan regions). Inhabits stony northern slopes in the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: destruction of habitats, reduction of seed productivity as a result of overgrazing. Measures of protection: not protected.



55. БУХОРО ТАНГАЎТИ

Копеечник бухарский / *Hedysarum bucharicum* B. Fedtsch.

Мақоми 2. Жануби-ғарбий Ҳисор тизмасида учрайдиган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–30 см орасидаги кўп йиллик ўт. Барглари мураккаб, баргчалари 5–8 жуфт, узунлиги 14–18 мм, эни 2–8 мм. Гулпоиси баргидан узун. Байроқчаси қайиқчасидан калтароқ. Дуккаги 2–3 бўғимли, 5–8 та қўндаланг кесимли бўртмалари бор. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбида, Қизилмозор, Тошқўрғон қишлоқлари атрофларида ҳамда Яккабўғ дарёсининг юқори оқимида, Ҳўжагургур-Ота тоғларида тарқалган.

Ўсиш шаронти. Гипсли, оҳақ-тошли тупроқларда ҳамда сийрак эрчазор, пистазорларда, шунингдек, ёвсан ва бошқа ўтлар орасида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда, баъзан кичик туллар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан зиёд кўп боқилиши туфайли камайиб кетган. Қурғоқчилик йиллари уруғи яхши унмайди.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [137, 150].

К.Ш. Тожибзев

Статус 2. Редкий вид Юго-западного Гиссара.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение со стеблями высотой 10–30 см. Листья сложные, 5–8-парные, листочки длиной 14–18 мм, шириной 2–8 мм. Цветоносы превышают листья. Флаг немного короче лодочки. Бобы 2–3-членные с 5–8 поперечными ребрами. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: юго-западные отроги Гиссарского хребта, окрестности кишлаков Кызыл-Мазар, Ташкурған, верховья Яккабаг-Дарьи, горы Ходжа-Гур-Гур-Ата.

Места обитания. Гипсы и известняки, среди арчового редколесья, в разреженных фисташниках и полынно-разнотравных сообществах.

Численность. Встречается единично, реже небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сильно страдает от выпаса мелкого рогатого скота. Плохо возобновляется в засушливые годы.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [137, 150].

К.Ш. Тожибзев

Rare species of the south-western part of the Hissar range. It is spread at the south-western outskirts of the Hissar range, the surroundings of the villages Kyzyl-Mazar, Tashkurgan, Yakkabag-Darya, Khoja-Gur-Gur-Ata (Kashkadarya and Surkhandarya region). Inhabits gypseous slopes and lime-stones, within juniper forests, pistachios and sagebrush-grasslands. The quantity is unknown. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



56. ДРОБОВ ТАҢҒАЎТИ

Копеечник Дробова / *Hedysarum drobovii* Korotkova

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шанда учрайдиган кам-ёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30-60 см, ўқ илдизли кўп бошчали, кўп йиллик ўт. Пояси кўп, баязан 2-3 та, тўпгули пояларининг учида жойлашган. Ўсимликнинг барча қисми ётиқ, қумушранг туклар билан қопланган. Варги мураккаб, узунлиги 7-10 см, баргчалари 2-3 жуфт. Гулбанди барг қўлтигидан чиққан, гуллари пуштиранг, эгилган, тўпгули ёйиқ. Дуккаги деярли бандсиз, узунлиги 6-8 мм, томирлари бўртиб чиққан. Июнда гуллаб, меваси июнь-июль ойларида етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Угом (Хумсон қишлоқ атрофи) ва Чотқол тизмалари (Бурчмулла ва Янгиқўрган қишлоқлари атрофи)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тошли-шағалли ҳамда бўз тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Санокли даражада учрайди, умумий сони 200 тупдан ошмайди. 2009 йили Бурчмулла қишлоғи атрофида 50 тупдан ошмайдиган кичик популяцияси қайд этилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорвоқ сув омбори қурилиши муносабати билан ўсимлик ареали кескин қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойлари Угом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида жойлашган.

Мабалар. [137, 150]

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Очень редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30-60 см с многоглавым стержневым корнем. Стебли многочисленные, реже 2-3, оканчивающиеся цветоносом. Все растение опушено прижатыми серебристыми волосками. Листья длиной 7-10 см, сложные, с 2-3 парами боковых листочков. Цветоносы пазушные, цветки розовые,

поникающие, собраны в рыхлое соцветие. Боб почти сидячий, длиной 6-8 мм, с резко выступающими жилками. Цветёт в июне, плодоносит в июне-июле.

Распространение.

Ташкентская область: Угамский хребет - окрестности кишлака Хумсан; Чаткальский хребет - окрестности Бурчмуллы и Янги-Кургана.

Места обитания. Каменисто-щебнистые и глинистые труднодоступные склоны в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается единично, общая численность около 200 экземпляров. В 2009 году отмечена маленькая популяция с 50 особями в окрестности к. Бурчмуллы.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Строительные работы и затопление Чарвакского водохранилища.



Культивирование. Следений нет.

Меры охраны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [137, 150]

К.Ш. Тожибаев

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam range: nearby the village Khumsan; the Chatkal range: nearby the villages Burchmulla and Yangi-Kurgan (Tashkent region). Inhabits stony and clayish almost inaccessible slopes in the lower belt of mountains. Single specimens occur sporadically. Total number of plants does not exceed 200 specimens. In 2009, a population of 50 plants was found near the Burchmulla village. Limiting factors: building works and flood of the Charvak reservoir. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



57. ОМОНҚҶТОН ТАҢАЎТИ

Комеичиник аманкутанский / *Hedysarum amankutanicum* B. Fedtsch.

Мақоми 0. Бу ўсимлик йўқолиб кетган бўлиши мумкин. Зарафшон тизмасидан атиги бир марта теришган.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70–85 см га етадиган қўп йиллик ўт. Барги мураккаб, баргчалари 3–5 жуфт, чўзикроқ думалоқ. Гулпоиси ингичка, узунлиги 20–22 см. Гуллари 25–40 тагача, оч пушти рангли, бандсиз. Дуккаги қандай экани номаълум. Май ойида гуллайдди.

Тарқалиши. Самарқанд вилояти: Зарафшон тоғининг Тахтақорача довоида учрайди.

нинг Комаров номидаги Ботаника институти гербарийсида сақланади (Санкт-Петербург). Сўнгги йилларда бу турни топиш учун уюштирилган экспедициялар самарасиз тугади.

Қўпайиши. Маълум эмас.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайдди.

Манбалар. [137, 150].

К.Ш. Тожибаев

Статус 0. Возможно, исчезнувший эндемик Зеравшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 70–85 см. Листья сложные, 3–5-парные, листочки овальные. Цветоносы тонкие, длиной до 20–22 см. Цветки бледно-розовые, сидичие, в числе 25–40. Бобы не известны. Цветёт в мае.

Распространение. Самаркандская область: Зеравшанский хребет – перевал Тахта-Карача.

Места обитания. Перевал на высоте 1500 м.

Численность. Единственный экземпляр, по которому описан этот вид, найден в 1913 году на перевале Тахта-Карача и хранится в гербарии Ботанического института РАН в г. Санкт-Петербурге. Последующие поиски не дали результатов.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [137, 150].

К.Ш. Тожибаев



Ўсиш шароити. Деңгиз сатҳидан 1500 м бандликкача бўлган довоида ўсган.

Сони. Мазкур тур Тахтақорача довоидан 1913 йили биринчи бор йиғилган ягона нусхаси бўйича тавсиф этилган. Айни вақтда бу нусха Россия Фанлар академияси-



Probably disappeared species of the Zerafshan range. It is spread at the Zerafshan range: the Takhta-Karacha pass (Samarkand region). Inhabits the passage (1500 m). The only specimen was found in 1913, on the Takhta-Karacha pass and is kept in the Herbarium of the Botanical Institute of RAS in Saint-Petersburg. Recent collecting missions had no success. Measures of protection; not protected.



58. ТИЗМА ТАНГАЎТ

Копеечник великоцветный / *Hedysarum magnificum* Kudr.

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70 см га борадиган кўп йиллик ўт. Пояси ғовак, оч яшил рангли. Баргларининг узунлиги 3–8 см, эни 5 см, чуқуқроқ думалоқ шаклдаги учта баргчадан ташкил топган, учигаги баргчаси йирикроқ. Гули хира бинафша ранг, баъзан эса оқиш тусда товланади. Гулпопузининг узунлиги 15 см, ғовак ва момик, Дуккаги 1–2 бўғимли. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари: Ҳисор (Дехқонобод, Оқравот, Лангар, Тошқўрғон атрофлари, Шўроб ва Дарбанд ораллигидаги Оқсуроттоғ, Оқсув, Мачай дарёлари водийсида, Қизилқишлоқ ва Қизилмачитқишлоғи орасида) ва Қўхитанг (Тўлғашсой ёқалари, Кампиртепа, Тангидевол довонида) тизмаларида тарқалган, Туркменистон (Қўхитанг-Ҳўжайил) да ҳам учрайди.

Ўсиш шаронти. Қуйи ва ўрта тоғларнинг сийрак ўсимликлар билан қопланган тошли-шағалли, ола тусли ва гипсли ёнбағирларида ўсади.

Сони. Маълумотлар йўқ.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди. Табиатда кузатилишича, намлик кўп бўлган йиллари яхши унб чиқади.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўзига хос тупроқда ўсишга мослашган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.



Муҳофаза чоралари. Сурхон ва Ҳисор давлат қўриқхоналарида муҳофаза этилади.

Манбалар. [137, 150, 208, 310].

К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 70 см. Стебли светло-зелёные, полые. Листья тройчатые, длиной от 3 до 8 см, шириной 5 см. Листочки овальные, конечные дольки крупные. Цветки гризно-фиолетовые,





реже белые. Кисти рыхлые, длиной 15 см. Бобы одно-двухчленистые. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июне-июле.

Распространение. В Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях: Гиссарский хребет – окрестности Дехканабада, Акрабата, Лянгара и Ташкургона, горы Аксурат между Шурабом и Дербентом, долины рек Аксу, Мачайдарья, между кишлаками Кызыл-кишлак и Кызыл-Мечеть; Кугитанг – по реке Тулгашсай, Кампиртепе, перевал Танги-Дувал. За пределами Узбекистана: Туркменистан – горы Кугитанг (Ходжа-Филь).

Места обитания. Каменно-щебнистые склоны, пестроцветные и гипсоносные обнажения низкогорий и среднегорий с разреженным растительным покровом.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное. Дружные всходы наблюдаются во влажные годы.

Причины изменения численности и ареала. Растения требовательны к субстрату.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском и Гиссарском государственных заповедниках.

Источники. [137, 150, 208, 310].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the south-western branches of Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the surroundings of Dekhkanabad, Akrobat, Langar and Tashkurgan, the Aksurat mountains between Shurab and Derbent the valleys of Aksu and Machaidarya rivers, between the villages Kyzylkishlak and Kyzyl-Mechet; the Kughitang: along the Tulgashsay river, the Tangi-Duval passage (Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits stony slopes, gypseous and gypsum-bearing outcrops of low and middle mountains with thinned vegetation. The quantity is unknown. Limiting factors: plants are sensitive to substrate. Measures of protection: protected in the Surkhan and Hissar state nature reserves.



59. ЛАНГАРСИМОН ЧЕЗНЕЯ

Чезнея яйцевидная / *Chesneya tribuloides* Nevski

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойнинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бақувват илдизли, ер бағирлаб ўсувчи поиларининг баландлиги 30 см гача етадиган қўп йиллик ўт. Барглари 2–3 жуфт юмалоқ баргчалардан ташкил топган. Гулдор поилари баргларида калта, алоҳида гулли. Гул-косачасининг узунлиги 5 мм, майда тишчали, қўнғироксимон. Гултожи тўқ сариқ, кейинчалик қизғиш тусга киради, дуккаги 11–12 мм. Май–август ойларида гуллаб, июнь–сентябрь ойларида мевазайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Қўхитанг ва Келиф-Шеробод тизмаларида учрайди. Туркманистонда ҳам тарқалган.

Ўсиш шароити. Қизил қумли тупроқларда ўсади.

Сони. Мамлакатимизда 140 тупи қайд қилинган.

длинной 9–10 мм. Цветет в мае–августе, плодоносит в июне–сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг и Келиф-Шерабадская гряда. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Краснопесчанники.

Численность. Зарегистрировано 140 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота, сокращение площади пестроцветов.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [159, 310].

Ф.О. Хасанов



Қўпайиши. Уругидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг қўп боқилиши ва ола тусли ер майдонларининг қисқариши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [159, 310].

Ф.О. Хасанов

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетник с мощным корнем и стелющимися стеблями высотой до 30 см. Листья 2–4-парные, с округлыми листочками. Цветоносы короче листьев, одноцветковые. Чашечка длиной 5 мм, колокольчатая с мелкими зубцами. Венчик оранжевый, позже краснеющий, длиной 11–12 мм. Бобы яйцевидные, волосистые,

Endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Kughitang and Kelif-Sherabad ridges (Surkhandarya region). Inhabits red sandstones, 140 plants were registered. Limiting factors: overgrazing and degradation of habitats. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.



60. БОЧАНЦЕВ ЭВЕРСМАННИЯСИ

Эверсманния Бочанцева / *Eversmannia botschantzevii* Sarkisova

выемчатые, густо опушенные. Цветоносы длиной 7–10 см. Венчик фиолетовый, длиной 15–17 мм. Боб длиной 3–5 см, голый. Цветет в мае–июне, плодоносит в июле.

Распространение. Кашкадарьинская область: хребет Элликбош (окрестности кишлака

Макоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойнинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Шохлари тукли, 60–70 см ли тиканак бута. Барглари 4–7 жуфт, баргчалари тухумсимон, учи кемтик, тукчалари зич жойлашган. Гулбандлари 7–10 см узунликда. Гултожи сиёхранг, 15–17 мм. Дуккаги 3–5 см, туксиз. Май–июнь ойларида гуллаб, июлда мевалайди.

Тарқалиши. Қашқадарё вилоятидаги Элликбош тоғ тизмаси (Қўрғонтош қишлоғи атрофи)да учрайди.

Ўсиш шароити. Қизил қумли тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши ва ола тусли майдонларнинг қисқариши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза этилмайди.

Манбалар. [159, 264].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 1. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Колючий кустарник высотой 60–70 см, с опушенными ветвями. Листья 4–7-парные, листочки яйцевидные, на верхушке

Курганташ).

Места обитания. Краснопесчанники.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение площади пестроцветов и выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 264].

Ф.О. Хасанов

Endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Ellikbosh range: nearby the village Kurgantash (Kashkadarya region). Inhabits red sandstones. The quantity is unknown. Limiting factors: overgrazing and degradation of habitats. Measures of protection: not protected.



61. ОСИЛУВЧАН (ЭГИЛУВЧАН) ҚУЛОНҚУЙРУҚ

Эremosparton обвислый / *Eremosparton flaccidum* Litv.

Мақоми 2. Қизилқумда тарқалган камёб ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Шохлари ингичка туклар билан қопланган, баландлиги 5–6 м гача етадиган сершоҳ бута. Барглари яхши ривожланмаган,



майда, ўткир тигсимон-чизикчали тангачалар шаклида. Гуллари тўқ бинафшаранг, бир-биридан муайян ораликда жойлашган. Дуккаги икки томондан қисилган, тухумсимон, тумшукчаси қисман ўроқсимон қайрилган, калта тик тукчалар билан қопланган. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: Қизилқум – Калла, Янгиказган ва Оқтошли қудуқлари атрофларида тарқалган. Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Қум барханларида ўсади.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг йил давомида муттасил боқилиши ва қулонқуйруқдан ўтин си-

фатида фойдаланилиши ўсимликка салбий таъсир кўрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Чорва молларининг боқилишини тартибга солиш ва ўсимликдан ўтин сифатида фойдаланишни тақиқлаш лозим.

Манбалар. [1, 272]

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 2. Редкий вид Кызылкума.

Краткое описание. Кустарник высотой до 5–6 м, сильно ветвистый, с тонкими войлочно-опущенными обвислыми ветвями. Листья недоразвитые, в виде мелких, острых ланцетно-линейных чешуек. Цветы темно-фиолетовые, расставленные. Бобы скзтые с боков, яйцевидные, полукруглые, со слегка серповидно изогнутым носиком, опущенные короткими отстоящими волосками. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: Кызылкум – окрестности колодцев Келле, Янгиказган и Актасты. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. На барханных песках.

Численность. Не установлено. Встречается редко на небольших участках.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Территория усиленно используется под пастбища. На распространение вида отрицательно влияет заготовка на топливо.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Необходимо регулировать выпас и запретить заготовку на топливо.

Источники. [1, 272].

Ф.О. Ҳасанов

Rare species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum; Kelle, Jangikazgan and Aktasty (Bukhara and Navoi regions). Inhabits sand dunes. The quantity is unknown. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: not protected.



БУҒДОЙДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО МЯТЛИКОВЫЕ (ЗЛАКОВЫЕ) - POACEAE (GRAMINEAE)

62. ОҚТОҒ ЧАЛОВИ

Ковыль актаевский / *Stipa aktauensis* Roshch.

Мақоми 2. Марказий Қизилқумдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–30 см га етадиган, чим ҳосил қилувчи, кўп йиллик ўт. Барглари ингичка, юқоридагилари бироз кенгайиб, тўпгулларини ўраб олган. Тўпгулнинг узунлиги 6–10 см, ингичка, кам бошоқли. Бошоғининг ўзаги деярли 13,5 см узунликда, бўғим-бўғим бўлиб қайрилган, бутун юзаси майда патсимон туклар билан қопланган, туклари 4–5 мм узунликда. Апрель–июнь ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Марказий Қизилқумдаги пасткам қолдиқ тоғларда тарқалган (Қорақалпоғистон, Навоий ва Бухоро вилоятлари).

Ўсиш шароити. Қуруқ тоғ ёнбағирларида, қояларнинг ёриқларида учрайди.

Сони. Маълумотлар йўқ.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқилиши туфайли қисқарган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Табиатда ва маданий шароитда бу турнинг биологиясини ўрганиш лозим. Уни назорат остига олиш учун Оқтоғ ва Томдигтоғда буюртмахоналар ташкил қилиш тавсия этилади.

Манбалар. [159, 219, 316].

Ҳ.Ф. Шомуродов

природе и культуре, организация комплексного заказника в Актау или Тамдытау.

Источники. [159, 219, 316].

Х.Ф. Шомуродов

Very rare endemic species of the central Kyzylkum. It is spread at the central Kyzylkum (Karakalpakstan, Navoi and Bukhara regions). Inhabits gypseous slopes. The quantity is unknown. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: it is necessary to study biology in nature and in culture, to establish the protected area in the Aktau or Tamdytau.



Статус 2. Очень редкий узкий эндемик Центрального Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее плотнокустовое дерновинное травянистое растение, высотой до 25–30 см. Листья узкие, верхние расширенные, обхватывающие соцветие. Соцветие длиной 6–10 см, узкое, малоколосковое. Ось зерновки длиной около 13,5 см, коленчато-согнутая, по всей длине перистая, волоски пера длиной 4–5 мм. Цветёт и плодоносит в апреле–июне.

Распространение. В Каракалпакстане, Навоийской и Бухарской областях: останцовые низкотеррасы Центрального Кызылкума.

Места обитания. Сухие щебнистые склоны, трещины скал.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Необходимо изучение биологии в

63. ҚОРАТОҒ ЧАЛОВИ

Ковыль каратавский / *Stipa karataviensis* Roshev.

Мақоми 2. Нурота тоғи ва Шимоли-ғарбий Тянь-Шаннинг ареали қисқариб бораётган камёб эндемик ўсимлиги.

Қискача тавсифи. Бўйи 20–30 см га етадиган зич пояли, чим ҳосил қилиб ўсувчи кўп йиллик ўт. Барглари ингичка, чизикли, четлари ичкарасига букилган, дағал тукли, юқори қисми бироз кенгайган, тўпгули ингичка, кам бошоқчали бўлиб, гирдини ўраб туради. Бошогининг узунлиги 8–9 см, бир марта бўғим-бўғим бўлиб букилган, пастки қисми

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 219, 316].

Н.Ю. Бешко

Статус 2. Эндемик Нуратинских гор и северо-западных отрогов Тянь-Шаня с сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Многолетнее, плотнокустовое, дерновинное травянистое растение, высотой до 20–30 см. Листья узколинейные, свернутые, щетиновидные, верхние расширенные, обхватывающие соцветие; последнее узкое, малоколосковое. Ость зерновки длиной 8–9 см, один раз коленчатосогнутая, в нижней части голая, выше колена перистоволосистая, волоски пера длиной 5–7 мм. Цветёт и плодоносит в июне–июле.

Распространение. Навоийская область: Хребты Нуратау (западная часть), Каратау и Актау. За пределами Узбекистана: Казахстан (Чу-Илийские горы и Сырдарьинский Каратау).

Места обитания. Каменистые, глинистые и известняковые склоны в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Разведка и добыча полезных ископаемых, перевыпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159, 219, 316].

Н.Ю. Бешко

Endemic species of the Nuratau mountains and the north-western branches of the Tien-Shan with the reducing area. It is spread at the Nuratau (the western part), the Karatau and Aktau ranges (Navoi region). Inhabits stony, clayish and lime-stony slopes. The quantity is unknown. Limiting factors: crushed stone and rubble quarrying, mining operations, overgrazing. Measures of protection: not protected.



туксиз, бўғимдан юқориси патсимон тукли, туклари 5–7 мм узунликда. Июнь–июль ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Нурота тизмасининг ғарбий қисми. Қоратоғ ва Оқтоғ тизмаларида ўсади. Қозғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва пастки қисмларидаги тошли, соз тупроқли ва оҳактошли энбағирларда ўсади.

Сони. Кам тарқалган, кичик-кичик туплар ҳосил қилади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Сановат корхоналари ва бошқа иншоотлар қурилиши ҳамда чорва молларининг боқилиши тўғрисида камайиб бормоқда.

64. ГНЕЗДИЛЛО ЧАЛОВИ

Ковыль Гнездило / *Stipa gnezdilloi* Pazij

Мақоми 1. Кўхитанг тизмасининг камёб, петрофит ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Пойлари тукланган, кўп йиллик ўт, бўйи 50–60 см. Барглари туксиз. Тилчаси 1–2 мм, киприкчали. Гулгўли 11–17 см узунликда. Бошоқлари деярли бир хил, 3–4 см узунликда. Пастки гул қобиги 11–13 мм. Бошоғи 12–13 см

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тарқалиш доираси тор бўлган стенобионт ўсимлик.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [159, 219, 316].

Х.Ф. Шомуродов



узунликда, икки бўғимли, туклари 0,2–0,3 мм. Май–июнь ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти; Кўхитанг тизмаси. Ўзбекистондан ташқари Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта камаридаги тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан қўпаяди.

Статус 1. Редкий петрофильный эндемик Кугитанга.

Краткое описание. Многолетник с опушенными стеблями высотой 50–60 см. Листья голые. Язычок длиной 1–2 мм, с ресничками. Метелка узкая, длиной 11–17 см. Колоски почти равные, длиной 3–4 см. Нижняя цветковая чешуя длиной 11–13 мм, верхняя с 7 линейными волосками. Ость длиной 12–13 см, двухколенчатая, волоски длиной 0,2–0,3 мм. Цветет и плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Стенобионтный узколокальный эндемик.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурхонском государственном заповеднике.

Источники. [159, 219, 316].

Х.Ф. Шомуродов

Endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang range (Surkhandarya region). Inhabits stony, rocky slopes in the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: endemic stenobiontic species. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



ГИАЦИНТДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ГИАЦИНТОВЫЕ (ЛИЛЕЙНЫЕ) – HYACINTHACEAE (LILIACEAE)

65. ТУРКИСТОН ДИПКАДИЙСИ

Дипкади туркестанский / *Dipcadi turkestanicum* Vved.

Мақоми 0. Жанубий Ўзбекистонга хос жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача таъсифи. Вўйи 15–20 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи қўлранг, юпқа қобикли. Илдизолди барглари (2–3 та) чизикли, новсимон, серат. Пояси камгулли. Гулбарглари этли, ўроқсимон эгилган, ташқи томони хира кўкимтир, оқ ҳшияли, ички томони оқш рангли. Меваси кўсакчага ўхшайди. Уруги ингичка. Апрельда гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Шеробод водийсидаги Ховдак қўлдиқ тоғида учрайди.

Ўсиш шароити. Мустақкам қум уюмларида ва уларнинг оралиқларидаги текисликларда ўсади.

Сони. 1975 йили ўсимликдан икки нусха йиғилиб, гербарий қилинган. 1975 йилдан сўнг ўсимлиكنинг бирорта тупи ҳам топилмаган. Тур йўқолиб кетган бўлиши мумкин.

Кўпайиши. Аниқланмаган. Эҳтимол, уругидан кўпайса кевак.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ховдак тоғида, айниқса, баҳор мавсумида чорва моллари кўплаб боқилиши натижасида йўқолиб кетган.

Маданийлаштирилиши. 1938 йил САГУ (ҳозирги ЎзМУ) Ботаника боғида ўсимлик пиёзидан экиб ўстирилган. Кейинчалик эса у қуриб қолган, 1975 йили бу турнинг 2 дона пиёзи қавлаб олинди, ЎзР ФА Ботаника боғида экилганида ҳам қуриб қолган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [156–159, 223].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 0. Редчайший узкий эндемик Южного Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 15–20 см. Луковица с серыми бумагообразными оболочками. Прикорневые листья (2–3) линейные, желобчатые, мясистые. Стебель с немногочисленными цветками. Листочки окололистника слегка мясистые, серповидно отогнутые, снаружи грязновато-зелёные, белоокаймленные, внутри беловатые. Плод – коробочка. Семена узкокрылые. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Сурхандарьинская область: Шерабадская долина – останцовые горы Хаудактау.

Места обитания. Закреплённые барханные пески, котловины выдувания.

Численность. В 1975 году собрано лишь 2 экземпляра. После 1975 года ни одного растения не найдено, несмотря на неоднократные поиски. Вид, видимо, исчез.

Размножение. Не установлено: вероятно сеянное.

Причины изменения численности и ареала. Район Хаудактау интенсивно используется под весенний выпас скота.

Культивирование. В 1938 году был выращен в Ботаническом саду САГУ (НУУз) из луковиц, затем высох. Две луковицы, собранные в 1975 году, после высадки в Ботаническом саду АН РУз погибли.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [156–159, 223].

Ф.О. Ҳасанов

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Sherabad valley: the Khaudaktau remnant mountains (Surkhandarya region). Inhabits fixed sand hills, kettles of blowing. In 1975, only 2 specimens were collected. After 1975, no plants were found, despite special search, none plant was found. Species probably disappeared. Limiting factors: the Khaudaktau region is intensively pastured during spring time. Measures of protection: not protected.



ГУЛСАФСАРДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ИРИСОВЫЕ – IRIDACEAE

66. ИТАЛИЯ ГЛАДИОЛУСИ

Шпажник посевной / *Gladiolus italicus* Mill.

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойга хос камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80 см гача етadиган қўп йиллик ўт. Барглари қиличсимон, узунлиги 18-20 см, ўткир учли, кам томирли. Тўпгули бошоқсимон, 6-8 гулли (баъзан 10 та-гача). Гулдан барглари наштаарсимон, гуллари тик, гулқўрғони пушти рангли. Меваси юмалоқ-тухумсимон қўсак шаклида, узунлиги 1 см гача. Тугунак пиёзчаси тухумсимон, қўнғир рангли қобиқ билан ўралган. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилояти: Ҳисор, Бойсунтоғ ва Қўхитанг тизмаларида тарқалган. Тожикистон, Туркменистон ва Афғонистонда, шунингдек, Ўрта Ер денгизи мамлакатларида ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Бу-лоқлар атрофида, соз ва юмшоқ тупроқли ёнбағирларда ва тоғ дарёлари бўйларидаги яйловлар ҳамда бута-зорларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари гулдасталар учун териб олиниши ва ёш ниҳолларининг оёқости қилиниши туфайли камайиб бормоқда.



Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Сурхон ва Китоб давлат қўриқоналарида муҳофаза этилади.

Манбалар. [156–159, 335].

О.Т. Тургинов

Статус 3. Редкий вид Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 80 см. Листья мечевидные, длиной 18–20 см, остроконечные, с немногими жилками. Соцветие колосовидное, с 6–8, реже до 10 цветками. Прицветные листья ланцетные, цветки прямостоячие, околоцветник розовый. Плод – шаровидно-яйцевидная коробочка длиной до 1 см. Клубнелуковички яйцевидные, с коричневыми обертками. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет, Байсунские горы, Кугитанг. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Средиземноморье.

Места обитания. Лёссовые и мелкоземистые склоны, ближе к родникам, среди зарослей кустарников, в долинах горных рек.

Численность. Встречается спорадически, одиночно и группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Собираются на букеты, всходы вытаптываются скотом в ювенильной стадии.

Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском и Китабском государственных заповедниках.

Источники. [156–159, 335].

О.Т. Тургинов

Rare species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar, the Baysun, the Kughitang ranges (Kashkadarya and Surkhondarya regions). Inhabits loess and soft slopes, near springs, among shrubwoods, in valleys of mountain rivers. Single specimens and groups sporadically can be found. Limiting factors: picking of flowers, seedlings are trampled down at juvenile stage. Measures of protection: protected in the Surkhan and Kitab state reserves.



67. ВИНКЛЕР ГУЛСАФСАРИ

Ирис Винклера / *Iris winkleri* Regel

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шанга ҳос жуда камёб, ареали бўлинган тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см гача етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзининг қобиғи қора, қоғозсимон. Илдизолди барглари 4 та, чизикли, эни 1–2 мм, ўроқсимон эгилган. Гули якка, гулқўргони барглариининг узунлиги 4 см атрофида, бинафша рангли. Апрель–май ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Чотқол ва Курама тизмалари – Ангрен дарёсининг юқори оқимида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги майсазорларда ўсади.

Сони. 15 та жойда ўсиши аниқланган. Умумий сони ҳақида маълумотлар йўқ.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу турнинг камёблиги сабаби, унинг музйин тупроқ ва иқлим шароитига мослашганлигида бўлса керак.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақида маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ареали ва сонини аниқлаш лозим.

Манбалар. [159, 170].

И.Г. Левичев

Статус 2. Очень редкий вид Западного Тянь-Шаня с дизъюнктивным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой до 20 см. Кроющие чешуи луковицы чёрные, бумагообразные. Прикорневые листья в количестве 4, узколинейные, шириной 1–2 мм, серповидные. Цветок одиночный, лепесточки околоцветника длиной 4 см, фиолетовые. Цветёт и плодоносит в апреле–мае.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Чаткальский и Кураминский хребты – верховья реки Ангрен.

Места обитания. Альпийские лужайки.

Численность. Известно 15 местонахождений. Общая численность не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к специфическим местообитаниям.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 170].

И.Г. Левичев

Very rare species of the western Tien-Shan with the reducing area. It is spread at the Chatkal and Kurama ranges: the upper part of the Akhangaran river basin (Tashkent and Namangan regions). Inhabits alpine slopes. Known from 15 locations. Total number is unknown. Limiting factors: stenobiont ecology. Measures of protection: not protected.



68. АНТИКА ГУЛСАФСАР

Ирис величественный / *Iris magnifica* (Vved.) Vved.

Мақоми 2. Зарафшон тизмасида ўсувчи жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–40 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Илдизи йўғон, урчқсимон, пиёзи яхши ривожланган. Пояси йўғон, барглари бир-биридан муайян оралиқда жойлашган. Ўроқсимон, оч яшил рангли, ялтироқ, пастки қисмидаги баргларининг эни 3,5–5 см. Гуллари 3–7 та. Гулқўрғон найининг узунлиги 4,5–5 см, яшил-бинафша рангли, ички гулқўрғони баргчалари оч бинафша рангли, узунлиги 22–27 мм. Чангдонлари оқш. Уруғи йирик, гадир-будур, ялтироқ. Апрель–май ойлари гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмасининг ғарбий қисми ва Омонқўтон довоида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмидаги майда тупроқли ерларда ва қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Кичик-кичик туплар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уругидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари ва пиёзларининг йиғиб олинishi сабабли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника ботида ўстирилмоқда. Маданий шароитда гуллаб, уруг бермоқда.

Муҳофаза чоралари. Ўсимлик ўсадиган айрим ҳудудлар Китоб давлат қўриқхонаси томонидан

муҳофазага олинган. Омонқўтон довои ҳудудида ўсимлик муҳофазасини ташкил қилиш ва популяция мониторингини юритиш лозим.

Манбалар. [53, 59, 283, 366].

Н.К. Раҳимова

Статус 2. Редкий эндемик Зеравшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 25–40 см. Корни сильно утолщённые, веретеновидные, луковица хорошо развита. Стебель мощный с расставленными листьями и хорошо заметными междоузлиями. Листья светло-зелёные, блестящие, серповидные, нижние шириной 3,5–5 см. Цветки в количестве 3–7. Трубка околоцветника длиной 4,5–5 см, светло-сиреневая; внутренние листочки околоцветника бледно-сиреневые, длиной 22–27 мм, пыльники беловатые. Семена крупные, морщинистые, блестящие. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях: западная часть Зеравшанского хребта, перевал Аманкутан.

Места обитания. Мелкоземистые площадки и трещины скал в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов на букеты и выкапывание луковиц.

Культивирование. Успешно интродуцируется. В Ботаническом саду АН РУз цветёт и плодоносит.

Меры охраны. Часть популяций охраняется в Китабском государственном заповеднике. Необходимо организация охраны растений и мониторинг популяций в районе перевала Аманкутан.

Источники. [53, 59, 283, 366].

Н.К. Раҳимова

Rare endemic species of the Zeravshan range. It is spread at the western part of the Zeravshan ridge, Amankutan pass (Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits clefts of rocks. The quantity is unknown. Limiting factors: picking of flowers; an digging out of bulbs. Measures of protection: some populations protected in the Kitab state nature reserve. The preservation and monitoring of populations at the Amankutan pass is required.



69. ОРХИДЕЯНАМО ГУЛСАФСАР

Ирис орхидный / *Iris orchoides* Carrière

Мақоми 3. Ғарбий Тянь-Шаннинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Илдизи урчуқсимон шаклда бироз йўғонлашиб кетган куп виллик пиезли ўт. Пиези 1,5–2,5 см қалинликда. Пояси 15–25 см узунликда, бир-биридан муайян ораликда жойлашган барглари оч яшил тусда, ўроқсимон, чети оқ хошьяли, бироз дағалроқ. Гуллари 3–5 та, оч сариқ тусда, гуллаш даври нисҳоясида бинафшаранг тус олади. Ташқи гулбаргчалари 3,5–4,5 см, оч-сариқ. Ички гулбаргчалари 1–1,5 см, япроқлари учли. Апрель ойида гуллаб мева беради.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Қурама (Оҳангарон дарёси ҳавзаси), Чотқол (Одамтош, Сўқоқ, Чотқол биосфера қўриқхонаси, Чимён), Қоржонтов (Оқтош), Писком (Ойғайнинг, Майдонтол ҳавзасида учрайди) тизмаларида тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон (Сарноғоч, Жилға, Дарбоза, Сырдарё Қоратоғи) ва Тожикистонда (Мўғултоғ) тарқалган.

Ўсиш шароити. Адир ва тоғ минтақаларининг тошли-шағалли ёнбағирликларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғи ва бошқа мамлакатларнинг ботаника боғларида ўстириб келинмоқда.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида ва Уғам-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [53, 59, 283, 366]

Н.К. Раҳимова

Статус 3. Редкое, эндемичное растение Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Клубнелуковица толщиной 1,5–2,5 см. Стебель высотой 15–25 см. Листья светло-зеленые, серповидные, по краю окаймленные, более-менее шероховатые. Цветки в количестве (1) 3–5, бледно-желтые, по отцветании приобретают фиолетовый оттенок. Наружные листочки околоцветника длиной 3,5–4,5 см. Внутренние листочки околоцветника длиной 1–1,5 см, с острой пластинкой. Цветет и плодоносит в апреле.

Распространение. Ташкентская область: Курaminsкий (бассейн реки Ахангаран), Чаткальский (Адамташ, Сукок, Чаткальский биосферный заповедник, Чимган), Каржантау (Акташ), Пскемский (Ойганинг, Майдантал) хребты. За пределами Узбекистана: Таджикистан (Моголтау), Казахстан (Сары-Агач, Джилга, Дарбаза, Сырдаринский Каратау).

Места обитания. Мелкоземные и каменистые

склоны в предгорьях, нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Не установлена

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Успешно выращивается в Ботаническом саду АН РУз, а также в ботанических садах других стран.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника и Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [53, 59, 283, 366]

Н.К. Раҳимова

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Kurama (the Akhangaran valley), the Chatkal (the Adamtash, the Sukok, the Chimgan, the Chatkal reserve), the Karzhantau (Aktash), the Pskem (Oygaining, Maydantal) ranges. Inhabits stony and fine slopes in the low and middle mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.



70. ИППОЛИТ ГУЛСАФСАРИ

Ирис Ипполита / *Iris hippolyti* (Vved.) Kamelin

Мақоми 1. Қизилқум қолдиқ тоғларининг жуда камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Тугунак пиёзи 1,5 см йўғонликда. Поясининг баландлиги 10 см. Барглари ўроқсимон, эни 1–1,5 см, силлиқ, четлари оқ ҳошияли, ўткир учли. Гуллари биттадан, оч бинафшаранг тусда. Ташқи гулбарглари 2 см узунликда, ичкилари 15 мм узунликда, ромб шаклида, учи қиррали. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси апрель–майда пишди.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Қўқча-тоғ.

Ўсиш шароити. Сув ҳавзаларини яқинга ажратувчи қоятошли жойларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уругидан ва тугунак пиёзларидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиатдан камёб, эндемик тур. Ўсиш жойларида чорва моллари жуда қўп боқилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза этилмайди.

Манбалар. [53, 59, 283, 366].

Ҳ.Ф. Шомуродов

Статус 1. Редчайший узколокальный эндемик низкогорий Кызылкума.

Краткое описание. Клубнелуковица шириной 1,5 см. Стебель высотой 10 см. Листья серповидные, шириной 1–1,5 см, гладкие, по краю белоокаймленные, острые. Цветки бледно-фиолетовые, по одному. Внешние листочки околоцветника длиной около 2 см, внутренние длиной 15 мм, ромбовидные, островатые. Цветет в марте–апреле, плодоносит в апреле–мае.

Распространение. Навоийская область: Кокча-тау.

Места обитания. Скалы в приводораздельной части.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Естественно редкий эндемичный вид. Угрозу представляет чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [53, 59, 283, 366]

Ҳ.Ф. Шомуродов

Extremely rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Navoi region: the Kokchatau relic mountain. Inhabits clefts of rocks. The quantity is unknown. Limiting factors: Rare endemic species. The habitat is used for pastures. Measures of protection: not protected.



71. СВЕТЛАНА ГУЛСАФСАРИ

Ирис Светлана / *Iris svetlanae* (Vved.) T.Hall et Seisums

Мақоми 2. Ғарбий Помир-Олойдяги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Кулранг қопламали тугунак пиезининг эни 2-2,5 см. Поясининг баландлиги 10-15 см. Барглари ўроқсимон, эни 3-4 см, силлиқ, четлари (атрофи) оқ ҳошияли, учи ўткир. Гуллари 1-2 та, сариқ тусли. Ташқи гулқўргон бўлаклари 12-16 см узунликда, ромб шаклида, учи ўткирроқ. Апрель ойида гуллаб, май ойида мева тугади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Зарафшон ва Ҳисор тизмасининг ғарбий қисми – Қашқадарё ҳавзаси (Қизилча, Қўргонтош, Торқопчиғай ва Ишкент қишлоқлари, Тахтақорача доғони атрофи)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Қизил қумтошли тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

островкаты. Цветет в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Кашкадарьинская область: западные отроги Зеравшанского и Гиссарского хребтов – бассейн реки Кашкадарья (окрестности кишлаков Тойча, Кызылча, Курганташ, Таркапчи-гай и Ишкент, перевал Тахтакарача).

Места обитания. Краснопесчаники.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение естественных местообитаний и выпас скота.

Культивирование. Успешно культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [53, 59, 159, 283, 366].

Н.К. Рахимова



Қўлайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиий ўсиб турган жойларининг қисқариши ва чорва боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФАнинг Тошкентдаги ботаника боғида ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [53, 59, 159, 283, 366].

Н.К. Рахимова

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Клубнелуковица шириной 2-2,5 см, с серыми чешуями. Стебель высотой 10-15 см. Листья серповидные, шириной 3-4 см, гладкие, по краю белоокаймленные, острые. Цветки желтые, в числе 1-2. Внешние листочки околоцветника длиной 4-5 см, внутренние 12-16 мм, ромбовидные,

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Kashkadarya region; the western branches of the Zerafshan and Hissar ranges, nearby the pass Takhta-Karacha, the villages Ishkent, Tarkapchigay, Kurgantash, Toycha and Kyzylcha. Inhabits red sandstones. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of habitats and overgrazing. Measures of protection: not protected.



72. ВИКТОР ГУЛСАФСАРИ

Ирис Виктор / *Iris victoris* F.O.Khass., Khuzhan, et Rakhimova

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойга хос камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Дағал ва кулранг пўстлокли туғунак пиёзининг эни 2–2,5 см. Поясининг баландлиги 10–15 см. Барглари ўроқсимон, эни 3–4 см, силлиқ, гирди (атрофи) оқ хошияли, учи ўткир. Гуллари 1–2 та, сариқ тусли. Ташқи гулқўрғон япроқлари 4–5 см, ички гулқўрғон япроқлари эса 12–16 мм узунликда, илғаксимон. Февраль–март ойларида гуллаб, меваси апрелда пишади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Қўҳи-тангда (Келиф-Шеробод тизмаси, Оқтош қишлоғи) тарқалган.

Ўсиш шароити. Ёз тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уругидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиий ўсиб турган жойларининг қисқариши ва чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [366].

Н.К. Раҳимова

Статус 1. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Клубнелуковица шириной 2–2,5 см, с серыми чешуями. Стебель высотой 10–15 см. Листья серповидные, шириной 3–4 см, гладкие, по краю бело-окаймленные, острые. Цветки

желтые, в числе 1–2. Внешние листочки околоцветника длиной 4–5 см, внутренние 12–16 мм, булавовидные. Цветет в феврале–марте, плодоносит в апреле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Келиф-Шерабадская гряда (пос. Акташ).



Места обитания. Серые глины.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение естественных местообитаний и выпас скота.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [3, 366].

Н.К. Раҳимова

Extremely rare endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Surkhandarya region: the Kelif-Sherabad range (near Aktaш). Inhabits grey clays. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of habitats and overgrazing. Measures of protection: not protected.



ЗИРАДОШЛАР (СОЯБОНГУЛДОШЛАР) ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ (ЗОНТИЧНЫЕ) – APIACEAE (UMBELLIFERAE)

73. МАЙДА МЕВАЛИ ДОРЕМА

Дорема мелкоплодная / Dorema microcarpum Korovin

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шань ва Шимолий Помир-Олойда ўсувчи ўта камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1-2 м гача етадиган кўп йиллик ўт. Барглари кулранг тусда бўлиб, қиррали бутун ҳамда ярмигача кесилган кичик бўлакчаларга тўрт қарра патсимон шаклда бўлинган. Баргининг ҳар икки томони калта-калта тукчалар билан қопланган. Соябончалари қисқа шохчаларда биттадан ёки иккитадан бўлиб, кетма-кет ўрнашган. Соябончаларидаги гуллари 10 тадан. Меваси майда-майда, узунлиги 6-7 мм. Май ойида гуллаб, июнда мева беради.



Тарқалиши. Наманган ва Фарғона вилоятлари: Ғарбий Тянь-Шанда – Чотқол тизмасида (Қўқонбий ва Тергачи қишлоқлари оралиғи); Олой тизмаси (Шоҳимардон)да тарқалган. Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидаги соғ тупроқли ва шаралли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кичик-кичик майдонларда яқка-яқка ҳолда учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликнинг камайишига ерларнинг қишлоқ хўжалиғи мақсадлари учун ўзлаштирилиши ва қорва молларининг боқилиши сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1961 йилдан бошлаб муваффақиятли равишда ўстириб келинмоқда.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [140, 159].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного Тянь-Шаня и Северного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 1-2 м. Листья сероватые, четырехжды перисто-рассеченные на ланцетовидные цельные и до половины надрезанные дольки, с обеих сторон с коротким опушением. Зонтики расположены на коротких веточках по 1 или по 2 друг над другом. Цветков в зонтичках по 10. Плоды мелкие, длиной 6-7 мм. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Наманганской и Ферганской областях: Западный Тянь-Шань – Чаткальский хребет – по дороге от селений Куканбия и Тергачи (Наманганская область) и Алайский хребет (Шахмардан). За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Глинисто-щебнистые склоны в предгорьях.

Численность. Встречается единичными экземплярами на небольших площадях.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение мест естественного произрастания под сельхозугодья, выпас скота.

Культивирование. С 1961 года успешно выращивался в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [140, 159].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Rare endemic species of the Naryn river basin in the western Tien-Shan and northern Pamir-Alay. It is spread at the western Tien-Shan: the Chatkal ridge – along the road from the villages of Kukanbiya and Tergachi (Namanagan region) and the Alay ridge (Shakhimardan). Inhabits clay and gravelly slopes in foothills. Single specimens in small areas can be observed. Limiting factors: Destruction of habitats and overgrazing. Measures of protection: not protected.



74. ДЕНОВ ЖУФТУРУҒИ

Шароэоитичник дензусзй / *Sphaeroscladium denafase* (Schischk.) Pimenov et Kljuykov

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги йуқолиш арафасида турган камёб эндемик реликт ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м га етадиган поликарп ўсимлик. Пойси тўғри, туксиз, юмалоқ, тўлиқ. Илдиэбўғзи ҳамда пой барглари узун ва йўғон бандли, узунлиги 20–30 см, эни 10–20 см, асосида пойни ўраб турувчи 3 см гача кенгайган қулоқсимон қинга эга. Барглари уч марта патсимон қирқилган, туксиз, уларнинг 1-сегментлари узун, 2-си қисқа бандчали, охириги 5-7 см, эни 2–4 см, тенгсиз, четлари юмалоқ тишчали, илдиэбўғзи ва пойнинг қуйи қисмида уларнинг шакли кенг тухумсимон, пойнинг ўрта қисмида ланцетсимон. Юқориғи барглари ингичка ланцетсимон қингача редукциялашган: марказий соябон остида 2 та йирик, узунлиги 7–9 см, эни 0,6–1 см ва 1 та майда, узунлиги 2–3 см, эни 0,4–0,6 см; ён соябонлари остида 2 та қин бўлиб, узунлиги 4–6 см, эни 0,3–0,4 см. Ўсимлиكنинг марказий соябончаси каттароқ, 10–15 та худди шундай кичик соябончаларни жамлаган, ён тарафдаги соябонлари 3–11 та. Уруғлаган вақтида нурларининг узунлиги 9–15 см га етади, деярли туксиз. Урама барғи ва урама барғчалари йуқ. Меваси икки бўлакки, юмалоқ. Апрель–майда гуллаб, меваси май–июнь ойида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Хисор тизмасидаги Сангардак дарёси водийси (Нилу қишлоғидан Хондиза дарёсининг қуйи оқимиғача) ва Тупаланг дарёсининг ўрта оқимида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қояларда ўсади.

Сони. 2014 йилда Сангардакда 180 тупи топилган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу тур ўсадиган ерларда қўллаб қорва моллари боқилади.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Бу турнинг биологик хусусиятларини ўрганиб чиқиш лозим.

Манбалар. [142, 159].

Д.Т. Хамраева



Статус 1. Редчайший реликтовый эндемичный вид и род Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Поликарпик высотой около 1 м. Стебель прямой, голый, округлый, полный. Прикорневые и стеблевые листья на длинных и толстых черешках, длиной 20–30 см и шириной 10–20 см, при основании расширенных в стеблеобъемлющие мясистые, кожистые влагалища ушковидной формы до 3 см ширины. Листья трижды перисто-рассеченные, голые, их первичные сегменты на длинных, вторичные – на коротких ножках, а конечные сидячие. Сегменты листа длиной 3–7 см и шириной 2–4 см, неравные, с округлыми зубцами, форма сегментов прикорневых и нижних стеблевых широкояйцевидная, в средней части ланцетовидная. Верхние листья редуцированы до влагалищ узколанцетной формы: под центральным зонтиком 2 крупных длиной 7–9 см, шириной 0,6–1 см, и 1 мелкое длиной 2–3 см, шириной 0,4–0,6 см; под боковыми зонтиками 2 влагалища длиной 4–6 см и шириной 0,3–0,4 см. Центральный зонтик более крупный из 10–15 зонтичков, боковые зонтики из 3–11 зонтичков. При плодах с широко раскинутыми, длинными (9–15 см), почти голыми лучами. Обертки и оберточки отсутствуют. Плод двойчатый, шаровидный. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – долина реки Сангардак, от кишлака Нилу до низовьев Хандизы и реки Тупаланг в среднем течении.

Места обитания. Скалы в среднем поясе гор.

Численность. В 2014 году зарегистрировано 180 растений в Сангардаке.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [142, 159].

Д.Т. Хамраева



Rarest relict endemic species and genus of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar ridge, the Tupalang and Sangardak valleys, from the village Nilyu to Khandiza (Surkhandarya region). Inhabits rocks in the middle mountainous zone. In 2014, 180 plants were registered in the Sangardak valley. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: not protected.

75. ПОПОВ ЖЎЯКМЕВАСИ

Борсодөвлодинк Попова / *Aulacospermum popovii* (Korov.) Klyukov, Pimenov et V.N.Tikhom.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шандаги ареали бўлинган, камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40–50 см, ўқ илдизли кўп йиллик монокарп ўсимлик. Илдизининг йўғонлиги 1 см га етади. Илдиз бўғизи эски қуриган баргланининг бандлари билан қопланган. Ёпирма барглари патсимон, бўлинган, барг банди ингичка қанотчали, тўқ яшил рангли. Пояси бақувват, жўякли, асосидан бошлаб шохланган. Соябони кўп, 10–18 та шўълали камончаси бор, эни 5–7 см. Тожбарглари сарғиш. Меваси чўзиқ, ён томонидан қисилган. Август ойида гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Ғарбий Тянь-Шанда – Уғам, Писком ҳамда Чотқол (ғарбий қисми) тизмаларида тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Қирғизистонда учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан баландлиги 1 600–2 000 м бўлган тоғларнинг шимолий ва шимоли-шарқий ёнбағирларидаги оҳақтошли қояларда ўсади.

Сони. Табиатда яқка-яқка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади. 7 та популяцияси аниқланган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик фақатгина бир марта гуллаб, мева бериши (монокарп) ва уруғининг яши унмаслиги ҳамда алоҳида шароит (оҳақтошлар)га мослашганлиги туфайли сони жуда кам.

Маданийлаштирилиши. Қисқа вақт давомида ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Уғам-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади. Биологик хусусиятларини ўрганиш лозим.

Манбалар. [140, 159].

М.Г. Пименов, Е. Ключков

Статус 2. Редкий узкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетний стержнекорневой травянистый монокарпик высотой 40–100 см. Корень толщиной до 1,8 см, корневая шейка одета остатками черешков отмерших листьев. Прикорневые листья перисторассечённые, с узкокрылатыми черешками, темно-зелёные. Стебель крепкий, бороздчатый, от самого основания ветвящийся; верхние ветви мутовчатые. Зонтики многочисленные, с 10–18 лучами, 5–7 см в поперечнике. Лепестки

желтоватые. Плод продолговатый, слегка сжатый с боков. Цветёт в августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Западный Тянь-Шань – Угамский, Пскемский хребты и западная оконечность Чаткальского хребта. За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Трещины и уступы отвесных известняковых скал северной и северо-восточной экспозиции в среднем поясе гор (1 600–2 000 м).

Численность. Встречается единичными экземплярами на небольших площадях. Известно 7 популяций.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Редкое монокарпическое растение с узким экологическим диапазоном.

Культивирование. Непродолжительное время культивировался в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Произрастает на территории Угам-Чаткальского национального парка. Необходимо изучение биологических особенностей.

Источники. [140, 159].

М.Г. Пименов, Е. Ключков

Rare endemic species of the western Tien-Shan with the reducing area. It is spread at the western Tien-Shan: the Ugam, the Pskem and Chatkal ranges (Tashkent region). Inhabits clefts and ledges of plumb lime-stony rocks of the northern and north-eastern expositions in the middle belt of mountains (1 600–2 000 m above sea level). Only 7 populations are known. Limiting factors: rare monocarp plant with strict ecology. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



76. ТЯНЬ-ШАНЬ КАМЕЛИНИЯСИ

Камелиния тьяншанская / *Kamelinka tianschanica* F.O. Khass. et I.I. Mal'tsev

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шань ҳудудига мансуб жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–50 см, қўп туғунакли, қўп йиллик поликарп ўсимлик. Илдиз бўғизидagi барглари узун бандли, япроғи уч қарра бўлинган, бўлаклари чуқроқ-думалоқ, нишлари бор. Пойдаги барглари бандли, юқоридагилари қисқариб новга айланган. Сонбонидagi 5 та ўрама баргчали камонлари 5–10 та, узунлиги 10 см. Косачаси пардасимон тишли. Гултоғи оқ. Меваси юмалоқроқ, узунлиги 4 мм, эни 5 мм. Май ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Ғарбий Тянь-Шанда – Охангарон дарёси ҳавзасида иккита ўсиш жойи маълум: Дукентсой ва Қорабосой.

Ўсиш шароити. Деңгиз сатҳидан баландлиги 1 200–1 600 м бўлган жойлардаги қўчиб тушган тошлар уюми орасида ўсади.

Сони. Дукентсойдаги популяцияси ўрганилган. 80 га майдонда 600 дан ортиқ ҳар хил ёшдаги туғилари маълум.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Махсус шароитга мослашган, атроф-муҳитнинг ўзгарувчан шароитларига чидамсиз (стенобионт) ва реликт тур.

Маданийлаштирилиши. 2009 йили ЎзР ФА Ботаника боғига экилган.

Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойлари Уғам-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудига жойлашган.

Манбалар. [159, 311].

И.И. Мальцев

Статус 2. Редкий реликтовый эндемичный вид из рода Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое растение с пальчато ветвящимися клубневидными корнями. Стебли высотой 30–50 см. Прикорневые листья на удлинённых черешках, пластинки их трижды рассечённые на ланцетно-овальные доли. Стеблевые листья нижние на черешках, верхние редуцированные до влагалищ. Лучей зонтика 5–10 до 10 см длины, с обверточками из 5 листочков. Зубцы чашечки пленчатые. Лепестки белые. Плоды черные, округлые, длиной 4 мм, шириной 5 мм. Цветет в мае, плодоносит в июле.

Распространение. Западный Тянь-Шань – в долине реки Ахангаран известны популяции из Дукентская и Карабау.

Места обитания. Каменистые осыпи на высоте 1 200–1 600 м.

Численность. Изучена популяция в Дукентском. На площади около 80 га произрастает более 600 растений различного возраста.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Стенобионтный и реликтовый вид.

Культивирование. Высажен в Ботанический сад АН РУз в 2009 г.

Меры охраны. Находится на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [159, 311].

И.И. Мальцев

Rare, relic, endemic species and genus of the western Tien-Shan. It is spread at the western Tien-Shan: the Chatkal range (the surroundings of Yangiabad, the Karabau and Dukantsai rivers). Inhabits stony slopes at 1200–1600 m. Population in the Dukantsay was studied. On the area of 80 hectares, more than 600 plants were registered. Limiting factors: relic and stenobiont taxon. Measures of protection; protected in the Ugam-Chatkal national park.



77. СУМБУЛ КОВРАК

Ферула муссатива / *Ferula sumbul* (Kasoffm.) Hook. f.

Мақоми 3. Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 150 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Поялари 2-5 та, ингичка, юқори қисми сершоҳ. Барглари қаттиқ бўлиб, илдиэ бўғизиди ўрнашган. Япроғи уч карра патсимон бўлинган, узунлиги 2-3 см, кенлиги 1-1,5 см, учидаги бўлаклари тухумсимон нишли. Узунлиги 2-3 см, кенлиги 1-1,5 см. Гуллари сариқ рангда. Косача барглари тишчали. Меваси майда, узунлиги 7 мм, эни 4 мм. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд, Навоий, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Нурота, Туркистон, Зарафшон ва Ҳисор тизмаларида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.



Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли ёнбағирларда, бутазорларда ўсади.

Сони. Ниҳоятда камёб, тўп-тўп бўлиб учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва зраалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан муттасил ва нооқилона тарзда атир-упа саноати учун ҳамда доривор хом ашё сифатида йиғиб олиниши ва уруғининг турли хашаротлар томонидан зарарланиши унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Ўзбекистон Миллий университетининг Ботаника боғида бундан бир неча йиллар олдин ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Нурота, Зомин, Китоб, Ҳисор давлат қўриқхоналарида, Зомин миллий табиат боғида муҳофаза этилади.

Манбалар. [141, 159, 237].

М.Г. Пименов, Е. Ключков

Статус 3. Редкий эндемик Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое травянистое растение высотой до 150 см. Стебли в количестве 2-5, тонкие, в верхней части ветвящиеся. Листья жесткие, в прикорневой розетке. Пластика трижды перисто-рассеченная, конечные дольки яйцевидные, ланцетные или продолговатые, 2-3 см длиной, 1-1,5 см шириной, зубчатые. Цветки желтые. Зубцы чашечки заметные. Плоды мелкие, длиной 7 мм и шириной 4 мм. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: хребты Нуратау, Туркестанский, Зеравшанский и Гиссарский. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Каменистые склоны среднего пояса гор, среди зарослей кустарников.

Численность. Крайне редок, встречается небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивная и нерациональная заготовка местным населением в качестве лекарственного и парфюмерного сырья. Семена сильно повреждаются насекомыми-вредителями.

Культивирование. Ранее успешно культивировался в Ботаническом саду Национального университета Узбекистана.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском, Зааминском, Китабском, Нуратинском государственных заповедниках и Зааминском национальном парке.

Источники. [141, 159, 237].

М.Г. Пименов, Е. Ключков

Rare endemic species of the Pamir-Alay. It is spread at the Nuratau, the Turkestan, the Zeravshan, the Hissar ranges (Jizzakh, Samarkand, Navoi, Kashkadarya and Surkhondarya regions). Inhabits stony slopes in the middle belt of mountains, among shrubs. The quantity is unknown. Limiting factors: stocking by local population as medicinal plant, mentioned by Avicenna. Most of seeds are damaged by insects. Measures of protection: protected in the Hissar, the Zaamin, the Nuratau, the Kitab state reserves and the Zaamin national park.



78. ТУГАНАКЛИ КОВРАК

Ферула клубникозая / *Ferula tuberifera* Korovin

Мақоми 3. Ўзбекистоннинг жануби-ғарбида ўсадиган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик монокарп ўсимлик. Илдизи қисқа, бир неча бутоқларга бўлинган, ён томирлари тугунакли. Поясининг бўйи 50–60 см, оч яшил рангда, бўғим оралиқлари пуфаксимон шишган, ўрта қисмидан шохланган. Поянинг пастки қисмидаги шохлари кетма-кет, юқоридагилари эса ҳалқа шаклида ўрнашган. Илдиз бўғизидаги барглари ромб шаклида, банди қисқа, уч қарра патсимон бўлинган, тишчали, 1,5–2 см узунлиқта. Соябони ҳар хил: ўрта-сидагилари деярли бандсиз, 7–13 шуълали, диаметри 8 см атрофида, ён томондагилари 2–3 тадан бирлашган. Соябончалари 10–15 гулли. Тожбарги сариқ рангли, чўзиқ-думалоқ шаклда. Мевалари чўзиқроқ-думалоқ, оқиш-сарик рангли. Май ойида гуллаб, июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқларида (Кўхитанг, Чўлбайир) тарқалган.

Ўсиш шаронти. Бойсунтоғларнинг ўрта қисмидаги тошли ва тошли-шағалли ерларда, арча-зорларда тарқалган.

Сони. Кўпинча якка-якка ҳолда, баъзан тўп-тўп бўлиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони па ареалининг ўзгариш сабаблари. Уруғи етилмаган пайтда ўсимликни чорва молларининг барча турлари яхши истеъмол қилади. Шунингдек, ем-хашак сифатида ўриб олинади.

Маданийлаштирилиши. Экиб ўстирилмайди.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқ-хонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [141, 159, 237].

О.Т. Тургинов

Статус 3. Редкий вид Юго-западного Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее монокарпическое растение. Корень короткий, разветвленный, с клубнями на боковых корнях. Стебель бледно-зелёный, высотой 50–60 см, в узлах вздутый, от середины ветвящийся. Нижние ветви очередные, верхние – мутовчатые. Прикорневые листья в очертании ромбические, трижды перисторассеченные; конечные дольки обратнойцевидные, 1,5–2 см длиной, зубчатые. Зонтики разные: центральные почти сидячие, 7–13-лучевые, около 8 см в диаметре, боковые собраны по 2–3. Зонтики 10–15-цветковые. Лепестки жёлтые, продолговато-овальные. Плоды овальные, бледно-жёлтые. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: юго-западные отроги

Гиссарского хребта – Кугитанг, Чутьбайр. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Каменистые и щебнисто-галечниковые субстраты в среднем поясе гор, в арчовниках.

Численность. Часто встречается единичными экземплярами, реже образует небольшие группы.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас (в стадии незрелых плодов хорошо поедается всеми видами животных) и сенокосы.

Культивирование. Не культивируется.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [141, 159, 237].

О.Т. Тургинов

Rare and endemic species of the south-western Uzbekistan. It is spread at the south-western outskirts of the Hissar range: the Kughitang, the Chulbair (Surkhandarya region). Inhabits stony and pebble substrates in the middle belt of mountains, in juniper stands. The quantity is unknown. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



79. ҚИЗИЛҚУМ КОВРАГИ

Феруза кызылкумская / *Ferula kyzylkumika* Korovin

Мақоми 3. Қизилқумдаги қолдиқ тоғларда ўсадиған камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган поликарп ўт. Пояси ўрта қисмидан рўваксимон шохланади, кейинчалик қизил тусга киради. Шохлари кетма-кет жойлашган. Илдиз бўғизидagi барглари қисқа ва йўғон бандли, кенг новли. Япроғи кенг ромбсимон, учтадан бўлакка ажралган, бўлаклари, ўз навбатида, уч қарра пат шаклида бўлинган, учидagi паллалари тухумсимон, 5–10 мм узунликда. Поядаги барглари япроқлари жуда қисқа. Соябонлари ўрама баргчаларсиз, 7–10 гулли. Косача барглари тишсиз, тоғбарглари сариқ рангда. Меваси чузиқ-думалоқ шаклда. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: Қизилқумдаги қолдиқ тоғларда (Томдитоғ, Белтоғ, Сангрунтоғ, Бўкантоғ, Қулжуктоғлар) ва ола тусли тупроқларда тарқалган.

Ўсиш шароити. Тошли-шағалли ёнбағирларда, ола тусли тупроқларда ва юзага чиқиб қолган туб жинсларда тарқалган.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ташқари қўп боқилиши сабабли сони камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Қизилқум чул станциясининг тажриба майдонида синаб қўрилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [141, 159, 237].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Статус 3. Редкий эндемик останцовых гор Кызылкума.

Краткое описание. Поликарпическое растение высотой 50 см. Стебель в средней части ветвящийся в неширокую метёлку, позднее краснеющий. Ветки очередные. Листья прикорневые, на коротких и толстых черешках, расширенных во влагалище. Пластинка листа в очертании ширококоромбическая, тройчаторассечённая, конечные доли яйцевидные, 5–10 мм длиной, перистонадрезанные. Стеблевые листья с сильно уменьшенной пластинкой. Зонтики без обёрточек

7–10-цветковые. Чашечка без зубцов, лепестки желтые. Плоды продолговато-овальные. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: останцовые горы и пестроцветы Кызылкумов – Тамдытау, Бельтау, Сангрунтау, Букантау, Кульжуктау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны, пестроцветы и выходы коренных пород.

Численность. Встречается одиночными растениями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Испытывается в коллекционном питомнике Кызылкумской станции АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [141, 159, 237].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Rare and endemic species of remnant mountains of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Tamdytau, the Beltau, the Sengruntau, the Bukantau, the Kuldjuktai (Bukhara and Navoi regions). Inhabits stony and pebble slopes, outcrops of variegated beds. Single specimens can be found. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: not protected.



80. ПРАТОВ КОВРАГИ

Феруза Пратова / *Ferula pratovii* F.O. Khass. et L.J. Matzev

Мақоми 1. Гарбий Помир-Олойдagi камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик поликарп ўсимлик, бўйи 30–60 см. Пояси туксиз. Барглрининг аксарият қисми илдиз бўғизида жойлашган, уч карра бўлинган, оқ тукли, ён томонидаги паллачалари тухумсимон – чузиқ, 3–5 бўлакли. Соибони 4–8 шуълали, узунлиги 2–3 см. Соибонининг шуъласи 8–10 та. Ўрама баргли ва ўрама баргчасиз. Косачасининг тишлари тўмтоқроқ. Гултожи оқиш, овалсимон. Стиллоподи ясси. Тугунча ва меваси туксиз. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилоти: Ҳисор тизмасининг жануби-гарбий тармоқларида тарқалган (Вуари қишлоғи атрофида).

Ўсиш шаронти. Денгиз сатҳидан 2 400 м баландликдаги гипсли ён бағирларда ўсади.

Сони. 60 туп ўсимликдан иборат 2 та популяцияси аниқланган.

Кўпайиши. Уруғи орқали кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиий ўсиб турган жойларининг бузилиши ва кўплаб мол боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [159, 308].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 1. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое растение 30–60 см длиной. Стебли голые. Листья все трижды перисто-рассеченные, с вздутым черешком, грубо волосистые, латеральные доли овальные, 3–5 раздельные. Зонтик с 4–8 лучами, 2–3 см длиной, зонтики 8–10 лучевые. Прицветников и прицветничков нет. Чашечка тупозубчатая. Лепестки белые, овальные. Стиллоподии сплюснутые. Завязь и плоды голые. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Кашкадарьинская область: юго-западные отроги Гиссарского хребта (окрестности кишлака Вуары).

Места обитания. Гипсированные склоны на высоте 2 400 м.

Численность. Известны 2 популяции (60 растений).

Размножение. Семенное.



Причины изменения численности и ареала. Разрушение естественных местообитаний и выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 308].

Ф.О. Ҳасанов

Rare species of the western Pamir-Alay. It is spread at the western part of the Hissar range: nearby the village Vuary (Kashkadarya region). Inhabits gypsaceous slopes (2 400 m.s.l.). 2 populations are known (60 plants). Measures of protection: not protected.



81. ФЕДЧЕНКО КОВРАГИ

Ферула федченкоўсая / *Ferula fedtschenkoana* Koso-Pol.

Мақоми 2. Ғарбий Памир-Олойдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Мутлақ туксиз қўп йиллик поликарпий ўт ўсимлик. Пойси якка ёки бир нечта бутоқчадан иборат ингичка, бинафшаранг, юқори қисми қўпинча қалқонсимон шохланган. Шохлари кетма-кет, юқоридагилари супротив. Барглари рағиб ранги оч қўқ, юмшоқ, туксиз, беш қарра бўлинган (кесилган), учидаги паллачалари торайиб кетган, 10–20 мм узунликда. Соябони 4–8 шуълали. Соябончасининг шуъласи 8–10 та. Косачаси калта тишчали. Гултожи сариқ, овалсимон, 1,4 мм узунликда. Меваси узунчоқ-овалсимон, туксиз, 6 мм узунликда, эни 3,5 мм. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё, Сурхондарё ва Жиззах вилоятлари: Ҳисор тизмаси (Қизилдарёнинг юқори қисми), Туркистон ва Молғузар тизмалари. Ўзбекистондан ташқарида: Тожикистон.

Ўсиш шароити. Тоғлардаги арчазор ҳудудининг шимолий ёнбағирликларидаги майда тупроқли-шағалли жойларда ўсади.

Сони. Саноқли даражада учрайди, 10 x 10 м² майдонга 2–3 та ўсимлик туғри келади.

Қўпайиши. Уруғи орқали қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор ва Зомин давлат қўриқхоналарида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [141, 159, 237].

М.Г. Пименов, Е. Ключков

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое совершенно голое травянистое растение. Корень веретеновидный. Стебель одиночный или их несколько, тонкий, нередко фиолетовый, в верхней части щитковидно ветвящийся; ветви очередные, верхние супротивные. Листья сизоватые, мягкие, голые, пятикратно перисто-рас-

сеченные; конечные доли узкие, 10–20 мм длиной. Зонтики конечные 4–8-лучевые. Зонтики 8–10-цветковые. Чашечка с короткими зубцами. Лепестки желтые, овальные, 1,4 мм длиной. Плоды продолговатого овальные, сжатые со спинки, голые, 6 мм длиной, 3,5 мм шириной. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский (верховья Кызылдары), Туркестанский и Малгузарский хребты. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые северные склоны в арчевом поясе.

Численность. Встречается одиночно, по 2–3 растения на 10 x 10 м².

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Не культивировался.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском и Зааминском заповедниках.

Источники. [141, 159, 237].
М.Г. Пименов, Е. Ключков

Rare species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Jizzakh, Kashkadarya and Surkhandarya regions; the Hissar (the Kyzyl-darya river basin), the Turkestan and Malguzar ranges. Inhabits the rubbly northern slopes in juniper belt. Single or by 2-3 plans at 10 m x 10m plots can be observed. Measures of protection; protected in the Hissar and Zaamin state reserves.



82. КОРЖИНСКИЙ КОВРАГИ

Ферула Коржинского / *Ferula korshinskyi* Korovin

Мақоми 2. Шимолий Помир-Олойга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик, пояси туксиз поликарп ўсимлик. Илдизи шолғомсимон йўғонлашган. Пояси, одатда, бир нечта ингичка новдадан иборат, новдаларининг ранги кўкимтир, узунлиги 2 м гача етади, япроқларсиз, юқорига қараб икки ёки уч тармоққа ажралиб кетган. Барглари уч-тўрт карра учга бўлинган. Учигаги бўлаклари наштасимон-чўзиқ ёки узунчоқ, узунлиги 1,5–6 см, кенглиги 6–15 мм, четлари бир текис, бус-бутун. Учигаги соябончалари 5–11 шуълали бўлиб, диаметри 6–8 см. Косачаси калта тишчалардан иборат. Баргчалари майда, чўзиқроқ, сариқ тусда. Мевалари кўкимтир, пастки тарафи кичрайиб кетган, чўзиқроқ шаклда, узунлиги 6–7 мм. Июль ойида гуллаб, августда мева беради.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой тизмаси (Шоҳимардон). Ўзбекистондан ташқарида: Қирғизистон.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларида тошлоқларда, гипсли туб жинсларда ва бошқа тоғ жинсларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тоғ этакларидаги ерларнинг тинимсиз ўзлаштирилиши ҳамда чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [141, 159, 237].



М.Г. Пименов,
Е. Ключиков

мелкие, овальные, желтые. Плоды сизые, сжатые со спинки, овальные, 6–7 мм длиной. Цветет в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Ферганская область: Алайский хребет (долина реки Шохимардон). За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Лесовые, мелкоземисто-каменистые склоны в нижнем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение предгорных ландшафтов, чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [141, 159, 237].

М.Г. Пименов,
Е. Ключиков

Rare species of the northern Pamir-Alay. It is spread at the Ferghana region: the Alay range, Shashimardan. Inhabits loess, clayey-stony slopes in lower mountain belt. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of habitats, economic activity in foothills, overgrazing. Measures of protection: not protected.

Статус 2. Редкое растение Северного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое совершенно голое травянистое растение с вертикальным реповидно утолщенным корнем. Стеблей обычно несколько; они сизые, тонкие, до 2 м высотой, безлистные, сверху дважды или трижды ветвящиеся. Листья трижды-четырежды тройчаторассеченные; конечные доли ланцетно-овальные или продолговатые, 1,5–6 см длиной, 6–15 мм шириной, цельнокрайние. Зонтики конечные 5–11 лучевые, 6–8 см в диаметре. Чашечка с короткими зубцами. Лепестки



83. ЎРИНБОСАР КОВРАК

Ферула замещающая / *Ferula vicaria* Korovin

Мақоми 1. Ферғона водийсининг жанубий адирларида ўсувчи камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик монокарп ўт ўсимлик. Илдизида шарсимон йўғонлашган жойлари бор. Пояси, бир нечта бўлиб, қўқимтир рангда, ингичка, 2 м гача баландликда, қалқонсимон шохланган. Барглари калта, мустақам тукли, 3–4 қарра патсимон қирқилган, учидаги бўлаклари ингичка-узунчоқ, 0,5–2 см узунликда; пой барглари найсимон, ёпирма барглargaча редукцияланган. Соябони 2–5 шуълали; соябончалари 7–8 гулли. Косачаси тишчасиз. Гултожибарглари деярли ясси, кенг овалсимон, оч яшил-қўнғир. Меваси тескари тухумсимон, 4,5–6 мм узунликда. Июнь-июль ойларида гуллаб, мева ҳосил қилади.

Тарқалиши. Туркистон ва Олой тизмалари этакларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларида, тошлоқларда, гипсли туб жинсларда ва бошқа тоғ жинсларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тоғ этакларидаги ерларнинг тинимсиз ўзлаштирилиши ҳамда чорва молларининг қўлаб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [141, 159, 237].

М.Г. Пименов,
Е. Ключиков

Статус 2. Редкий эндемик южных предгорий Ферганской долины.

Краткое описание. Многолетнее монокарпическое травянистое растение. Корни с шаровидными утолщениями. Стебель одиночный, тонкий, высотой 20–60 см, вверху щитковидно ветвящийся. Листья слегка шероховатые от коротких жестких волосков, 3–4-перисто-рассеченные; конечные доли узколинейные, 0,5–2 см длиной; стеблевые

листья редуцированы до трубчатых влагалищ. Зонтики с 2–5 лучами; зонтики 7–8-цветковые. Чашечка без зубцов. Лепестки почти плоские, широко овальные, оливково-бурые. Плоды обратно-йцевидные, скатые со спинки, 4,5–6 мм длиной. Цветет и плодоносит в июне–июле.

Распространение. Предгорья Туркестанского и Алайского хребтов.

Места обитания. Щебнистые и пестроцветные склоны, по сухим руслам и галечникам.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение предгорных ландшафтов, чрезмерный выпас скота.


Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [141, 159, 237].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Rare endemic species of the southern foothills of the Ferghana valley. It is spread at the Ferghana region; the foothills of the Turkestan and Alay ranges. Inhabits rubble and gypseous slopes, dry stream beds, pebbles, at 900–1500 m ± 1. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing under antropogenic pressure. Measures of protection: not protected.



84. ЕЛЕНА КОВРАГИ

Ферула Елена / *Ferula helena* Rakhm. et Melibaev

Мақоми 2. Нурота олди қолдиқ тоғларида (Баликлитоғ, Эгарбелитоғ) ўсадиган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Қўп йиллик монокарп ўсимлик. Илдизи цилиндрсимон, илдиз бўғзи қуриган барглarning қўп соғли толалари билан қопланган. Поясининг баландлиги 60–70 см, мустаҳкам, ингичка, юқоридан шохланувчи, бўғинидан бир нечта шох ҳосил қилади. Барглари оқиш-қўқимтир қалин дағал туклар билан қопланган; тўлбарглари калта, мустаҳкам, қалин бандли, япроқлари кенг ромбсимон, мураккаб патсимон. Поядаги барглarning япроқлари жуда қисқа. Соғбони икки хил. Меваси кучли ҳидга эга. Май ойида гуллаб, июнда етилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Нурота олди қолдиқ тоғлари (Баликлитоғ, Эгарбелитоғ)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тош-шағалли ёнбағирларда тарқалган.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда ўсади. Бир нечта жойларда ўсиши аниқланган.

Қўпайиши. Уруғи орқали қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиий ўсиб турган жойларнинг бузилиши ва қўлаб мол боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақида маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Мухофаза қилинмайди. **Манбалар.** [141, 159, 237].

А.Р. Батошев

Статус 2. Редкий эндемик останцовых гор при Нуратау.

Краткое описание. Многолетний монокарпик. Корень цилиндрический, корневая шейка покрыта многочисленными волокнами отмерших листьев. Стебель высотой 60–70 см, крепкий, тонкий, вверх ветвящийся, по несколько ветвей в узле. Листья сероватые от густо покрывающих жестких волосков: прикорневые – на коротких, крепких и толстых черешках, пластинка широко-ромбическая, тройчатая, многократно перисто-рассеченная на овальные перисто-надрезные, по краям курчавые дольки длиной 2–3 мм. Стеблевые листья с сильно уменьшенной пластинкой, верхние сведены до яйцевидных, вздутых, стеблеобъемлющих влагалищ. Зонтики двоякие. Плоды с сильным скипидарным запахом. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Джизакская область: Принуратинские останцовые горы (Балыклитау, Эгарбелитаг).

Места обитания. Каменно-щебнистые склоны.

Численность. Встречается единичными особями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Разрушение естественных местообитаний и выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [141, 159, 237].

А.Р. Батошев

Rare and endemic species of the Prinuratau. It is spread at the remnant mountains near the Nuratau range the Balyklitau and Egarbellistag (Jizzakh region). Inhabits stony-rubbly mountain belt. Single specimens can be found. Limiting factors: destruction of habitats and overgrazing. Measures of protection: not protected.



85. ТОЖИК КОВРАГИ

Ферула таджикова / *Ferula tadshikorum* Pimenov

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойд-ги сон жихатдан қисқариб бораётган, арсали бўлинган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик монокарп ўсимлик бўлиб, бўйи 1,5–1,8 м, саримсоққа хос кучли ҳидга эга. Илдизи йўғон, вертикал илдиз-пояли. Оддий каудексли. Пояси якка, барглари юмшоқ, позик, тезда сўлиб қолади, юқори қисми деярли туксиз. Тўпгули – кенг, шингилли. Соя-бонлари кўп, барчаси мева тугади. Соябончалари 10–15 гулли, ўрама баргчасиз. Гулбандлари қисқа, 0,5–0,8 см. Косачабарглариининг тишчалари майда, уч қиррали. Гултожибарглари сариқ, 2–2,5 см узунликда, чўзинчоқ-эллипсимон. Меваси 1,9–2,7 см узунликда, эни эса 0,9–1,2 см, тескари тухумсимон, чўзинчоқ-тухумсимон, овалсимон ёки эллипсимон, орқа томондан сиқилган, ясси, туксиз. Апрель-май ойларида гуллаб, июнь-июль ойларида мевалайди.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқларида ва Боботоғда тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида: Жанубий Тожикистон.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмидаги ёнбағирларда ва қояларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки кичик-кичик популяцияларни ташкил қилган ҳолда ўсади. Умумий сони аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаб-лари. Сўнгги 20 йил мобайнида табиатдан фойдаланувчилар томонидан ўсимлик ширасининг ре-жасиз ва назоратсиз йиғиб олиниши натижасида табиий захиралари ва популяцияларининг ўсиш майдонлари кескин қисқариши кузатишмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника институти мутахассислари томонидан хўжалик шартномалари асосида Боботоғ ўрмон хўжалиги ҳудудларида сунъий плантациялари ташкил этилган.

Муҳофиза чоралари. Табиатда мавжуд популяциялари қатъий назоратга олиниши керак. Мазкур популяциялардан ўсимлик сунъий план-

тацияларини ташкил қилишда фойдаланиш лозим.

Манбалар [1, 2].

А.В. Маҳмудов

Статус 3. Эндемик Юго-Западного Памиро-Алая с сокращающейся численностью.

Краткое описание. Многолетнее монокарпическое растение высотой 1,5–1,8 м, с сильно выраженным чесночным запахом. Корень толстый с вертикальным корневищем. Каудекс простой. Стебли одиночные. Листья мягкие, быстро увядающие, сверху почти голые, снизу серовато-опушенные. Соцветие – широкая метелка. Зонтики 10–15-цветковые, без обверточек. Цветоножки короткие, 0,5–0,8 см. Лепестки желтые, длиной 2–2,5 мм, продолговато-эллиптические, тупые, с загнутой внутрь верхушкой. Подстолбия чашевидные. Плоды длиной 1,9–2,7 см, шириной 0,9–1,2 см, обратнойцевидные, продолговато-яйцевидные, овальные или эллиптические, со спинки сжатые, плоские, голые. Цветет в апреле-мае; плодоносит в июне-июле.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: юго-западные отроги Гиссарского хребта, Бабатаг. За пределами Узбекистана: Южный Таджикистан.

Места обитания. Склоны в нижнем и среднем поясах гор.



Численность. В естественных условиях встречаются одиночно или в виде небольших популяций. Общая численность не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Вследствие усиленной и бесконтрольной эксплуатации растений ради камеди (смолы) в течение последних 20 лет, наблюдается сильное сокращение естественных ресурсов и площади популяций.

Культивирование. Институтом ботаники АН РУз на основе хозяйственных договоров созданы искусственные плантации на территории Вабатагского лесхоза.

Меры охраны. Необходимы регулярный и жесткий контроль за естественными популяциями, создание искусственных плантаций путем подсева семян в природные популяции.

Источники. [1, 2].

А.В. Махмудов

Endemic of south-western Pamir-Alay. It grows in the Kashkadarya and Surkhandarya regions on slopes or rocks in the lower and middle mountain belts. Populations drastically decreased as a result of overharvesting. Protection measures: not protected.



86. ФЕДЧЕНКО ПИЛДИРОҚМЕВАСИ

Омежник федченкоўский / *Oenanthe fedtschenkoana* Koso-Pol.

Мақони 0. Фарғона водийсига ҳос Nicholson қамб (балки йўқолган), эндемик ўсимлик.

Қисқача таъсифи. Бўйи 50 см гача етadиган (эхтимол монокарп) кўп йиллик ўт. Понси битта, юмалоқ, чуқурроқ чизикли, кам шохли. Барслари қисқа бандли, асоси кенг – новсимон, икки қарра патсимон қирқилган, бўлақлари чуқик-қалами. Соябони 8–14 нурли, соябончалари кўп гулли, ўрама баргчалари 5–10 та, нашта-симон. Мевалари тухумсимон, узунлиги 2 мм. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июнь ойида етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Қўқон шаҳри атрофларида учраган. Ушбу ўсимлик Москва шаҳрида (MW) сақланмоқда деб келинган гербарий типид асосида тавсирланган. Бироқ MW (Губанов, 2002) ва МНА да бундай ўсимлик йўқ. Қўқон шаҳри атрофларида олиб борилган бир неча изланишлар натижа бермаган. Урта Осиёга мансуб гербарийларда ҳам ўсимлиكنинг қайта терилган нусхалари йўқ. Эхтимол, мелиорация ва сугориш тизимларининг бир неча бор ўзгариши оқибатида ўсимлиكنинг ўсиш жойлари ўзлаштирилган бўлиши мумкин. Ўсимлик бир мартагина терилган, холос. Шунда ҳам Қирғизистоннинг Қўқон шаҳрига яқин жойларидан терилган бўлиши ёки ўсимликка онд маълумотларда чалкашликка йўл қўйилган бўлиши эхтимолдан йироқ эмас.

Ўсиш шароити. Ботқоқланган ерларда ва эхтимол, ариқ бўйларида ҳам ўсган.

Сони. Қўқон шаҳри атрофидан бир марта йиғилган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайган деган тахмин бор.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу тур ҳақида маълумотлар етарли эмас.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсимлиكنинг табиатда борлигини исботлаш зарур.

Манбалар. [147, 348].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Статус 0. Чрезвычайно редкий (возможно, исчезнувший) эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Многолетнее, травянистое (возможно, монокарпическое) растение высотой до 50 см. Стебель одиночный, округлый, сильнобороздчато-гранитый, слабоветвистый. Листья из коротких черешках, при основании расширенных во влагалище, дважды перисторассечённые на продолговато-линейные доли. Зонтики 8–14-лучевые, зонтики многоцветковые, обёртки из 5–10 ланцетовидных листочков. Плоды яйцевидные, длиной около 2 мм. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июне.

Распространение. Ферганская область: в окрестностях г. Коканда. Все указания основаны на единственном местонахождении в окрестностях г. Коканда, при чем тип будто бы находится в г. Москве (MW). Однако в гербариях MW (см. Губанов, 2002) и МНА такого растения нет. Неоднократные поиски в болотах в окр. г. Коканда никаких результатов не дали. Нет повторных сборов и ни в одном из среднеазиатских гербариев. Вполне возможно, что местонахождение исчезло в процессе многократного изменения поливной сети и мелиорации. Не исключено также, что единственный сбор этого растения был сделан на территории Кыргызстана близ г. Коканда или даже произошла путаница этикеток.

Места обитания. Заболоченные низины, возможно, по берегам арыков.

Численность. Известен по единственному сбору из окрестностей города Коканда.

Размножение. Возможно семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведения о виде крайне недостаточны.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [147, 348].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Extremely rare and probably disappeared endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the surroundings of Kokand (Ferghana region). All information was based on the only locality nearby Kokand town; and, the type of the mentioned specimen is stored in Moscow (MW). However, in MW (Gubanov, 2002) and MNA these species were not found. There is none specimen in all herbaria of Central Asia. Several collecting missions in surroundings of Kokand were unsuccessful. Probably, this locality disappeared during enlarged melioration system in the 20 century. Probably, the plant was collected in Kyrgyzstan or determination label was changed. Inhabits swampy valleys, along channels. The species known by single collection nearby Kokand. Limiting factors: information about it is incomplete. Measures of protection: not protected.



87. ЧИЗИҚПОЯЛИ ПИЛДИРОҚМЕВА

Омежаник разноплодный / *Oenanthe heterococca* Korovin

Мақоми 1. Қашқадарё воҳасига мансуб, йўқолиш арафасида турган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси говак, асосидан шохланган, юмалоқ, усти чизикли. Поянинг пастидаги барглари бандли, юқоридагилари бандсиз, ингичка новли, уч карра патсимон қирқилган. Бўлаклари қалами, ўткир учли, узунлиги 7–8 мм. Соябони узун бандли, 10 та шуълалли. Соябончалари кўп гулли. Урама баргчалари 7–9 та, ҳар хил узунликда, наштарсимон. Меваси пилдироқсимон, узунлиги 3 мм. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Самарқанд вилоятлари: Шахрисабз шаҳри атрофидаги тоғ олди текисликларида ҳамда Зарафшон тизмасида Терсаксойда тарқалган. Гербарий намуналарнинг ўрганиш мазкур турни Эрон ва Кавказдан то Европа ва Шимолий Африкагача тарқалган, ўхшаш экологик шароитда ўсадиган *O. silaifolia* M. Bieb. туридан деярли фарқланмаслигини кўрсатди. Ўзбекистонга

O. silaifolia шולי уруғи билан кириб келган бўлиши мумкин. Ҳалигача топилмаётган *O. fedtschenkoana* турининг ҳам мазкур турга мансублиги тўғрисида фикрлар йўқ эмас.

Ўсиш шароити. Сугориладиган даладор орасида, сой бўйларида, ботқоқлашган жойларда ўсади.

Сони. 2016 йилда мазкур турнинг популяцияси (50 туп атрофида) Зарафшон тизмасида Терсаксойнинг юқори қисмида, ботқоқлашган тоғ ўтлоқларида топилган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайган бўлса керак, деган тахмин бор.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу тур ҳақида маълумотлар жуда кам.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [147, 348].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Статус 1. Чрезвычайно редкий эндемик бассейна реки Кашкадарья.

Краткое описание. Травянистое многолетнее растение высотой до 50 см. Стебель полый, от основания ветвистый, округлый, бороздчатый. Листья у основания черешковые, выше – сидячие, на узком влагалище, трижды перисторассечённые на линейные острые доли длиной до 7–8 мм. Зонтики на длинных цветоносах, 10-лучевые. Зонтики многоцветковые. Обёрточка из 7–9 ланцетовидных листочков разной длины. Плоды кубаревидные, длиной 3 мм. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарьинская и Самаркандская области: подгорная равнина близ города Шахрисабза, Зеравшанский хребет (Терсаксай). Изучение гербарных образцов вида показало, что он практически неотличим от *O. silaifolia* M. Bieb., который имеет сходную экологию и широко распространён от Ирана и Кавказа до Европы и Северной Африки.

В Узбекистан *O. silaifolia* мог быть занесён, например, с семенами риса. Не исключено, что сюда же может быть отнесён и *O. fedtschenkoana*, материал по которому не найден до сих пор.

Места обитания. Заболоченные участки среди поливных полей, берега ручьёв, сазы.

Численность. В 2016 году популяция вида (около 50 растений) была найдена на Зеравшанском хребте в верховьях Терсаксая, на сазе.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведения о виде крайне недостаточны.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [147, 348].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

*Extremely rare endemic species of the Kashkadarya valley. It is spread at the submontane plain near Shakhrisabz and on the Zerafshan range (Kashkadarya and Samarkand regions). Revision of herbarium material showed that this species is very similar with *O. silaifolia* M. Bieb., a species with the same ecology which is widespread from Iran and the Caucasus up to Europe and the northern Africa. Probably, it was introduced in Uzbekistan together with rice crops. Probably, *O. fedtschenkoana* could be the same species as well. Inhabits swampy plots among fields requiring irrigation, on reservoir banks. A population of about 50 plants has been found in 2016 on the Zerafshan range. Measures of protection: not protected.*



88. ШАШИРСИМОН ПУФАКЎҒИМ

Комаровия шероносемянная / *Komarovia anisosperma* Korovin

Мақоми 1. Зарафшон тизмасининг тармоқларида тарқалган камёб, реликт ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 2–3 м гача етадиган. Йўғонлашган илдизтуғунакли, қўп йиллик ўт. Пояси ингичка, бўғимлари бироз пуфаксимон шишган, юқори қисмидан шохланган. Ёпирма барглариининг узунлиги 70 см га етади, қўп марта патсимон бўлакларга ажралган. Япроғининг учидаги бўлаклари наштартсимон, узунлиги 4–5 см, эни 10 мм гача. Соябонлари 2–7 шўълали, соябончалари юмалоқ, ўрама барг ва баргчалари йўқ. Тожбарглари сариқ, узунлиги 10 мм. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмасининг ғарбий тармоқларида ва унинг давоми Қаратеп тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1 300–1 700 м баландликдаги дараларда, шағалли тик ёнбағирларда, сурилмаларда, қояларнинг ёриқларида ўсади.



Сони. Фақат бешта жойда борлиги маълум. Тўплари (10–100 тупдан бўлиб) бир-биридан ажралган ҳолда тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлиكنинг сернам жойларга қатъий мослашганлиги ва аҳоли зич жойлашган ҳамда қишлоқ хўжалиги учун фойдаланиладиган ерларда ўсганлиги ўсимлик сонининг кзмайишига олиб келган.

Маданийлаштирилиши. Москва давлат университетининг Ботаника ботида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Турнинг айрим популяциялари Китоб давлат қўриқхонасида муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [142, 156–159].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Статус 1. Редкий реликтовый вид и род Зеравшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое травянистое растение высотой до 2–3 м, с утолщенным ветвистым стеблемкорнем. Стебель тонкий, в узлах слегка вздутый, метельчато-ветвистый в верхней части. Листья в основном прикорневые, длиной и шириной до 70 см, многократно перисторассеченные, с ланцетными конечными долями длиной 4–5 см и шириной до 10 мм. Зонтики 2–7-лучевые, зонтики шаровидные, без оберток и оберточек. Лепестки желтые, длиной до 10 мм. Плоды продолговато-яйцевидные. Цветёт в июне-июле, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях: западная оконечность Зеравшанского хребта и его продолжение – хребет Каратепе.

Места обитания. Узкие ущелья и крутые щебинистые склоны, осыпи и трещины скал на высоте 1 300–1 700 м.

Численность. Отмечен в 5 пунктах. Встречается в виде сильно разрозненных популяций численностью от 10 до 100 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Реликтовая природа вида и антропогенный фактор.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду МГУ

Меры охраны. Часть популяций охраняется в Китобском заповеднике.

Источники. [142, 156–159].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Rare, relict species and genus of the Zerafshan range. It is spread at the northern and southern slopes of the Zerafshan range (Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits narrow defiles and steep slopes, mounds and cracks of rocks at the height of 1 300–1 700 m. 5 populations (from 10 to 100 specimens) can be found. Limiting factors: relict nature of the species and antropogenic factor. Measures of protection: some populations grow in the Kitab nature reserve.



89. ХИСОР САРПОЯСИ

Головонок гиссарский / *Cephalopodium hissaricum* Pimenov

Мақоми 1. Хисор тизмасидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–50 см га етадиган қўп йиллик, монокарп ўт. Пойсининг туби 2–3 см гача баргбандининг қолдиқлари билан қопланган, юқори қисми шохланган. Ёпирма барглари қўқимтир, патсимон бўлган, япроқ учидаги бўлаклари қалами-наштърсимон, узунлиги 0,5–1,5 см, эни 0,1–0,2 см. Соябони 12–20 тача шуълалли, диаметри 5–7 см, ўрама барглари йўқ, соябончалари юмалоқ, тожбарглари рағи рағи эмас. Мева си июль ойида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Хисор тизмасининг жанубий ёнбағирлари (Тупаланг дарёси ҳавзаси)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги дарахт ва бутазорлар орасида, қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган. Бир марта йиғилган ҳол.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди деган тахмин бор.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159].

М.Г. Пименов, Е. Ключков

Статус 1. Редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетний травянистый монокарпик высотой 30–50 см. Стебли при основании покрыты жесткими остатками черешков, тонкие, ветвящиеся в верхней части. Прикорневые листья сизоватые, 3–4-перисторассечённые, с линейно-ланцетными конечными долями длиной 0,5–1,5 см, шириной 0,1–0,2 см. Зонтики 12–20-лучевые, 3–4 см в диаметре, без обёрток, зонтички шаровидные. Лепестки не известны. Плоды (незрелые) голые, широколанцетные. Плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: южный макросклон Гиссарского хребта – бассейн реки Тупаланг.

Места обитания. Трещины скал древесно-кустарникового пояса.

Численность. Не установлена, известен по единственному сбору.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159].

М.Г. Пименов, Е. Ключков

Rare endemic species of the Hissar range. It is spread at the southern slope of the Hissar range; the Tupalang (Surkhandarya region). Inhabits cracks of rocks in woody-shrubby belt. There is the only locality. Measures of protection: not protected.



90. РЕГЕЛ КИРКБОШИ

Зеравшания Регеля / *Zeravschania regelliana* Korovin

Мақоми 2. Ғарбий Помир-Олойдаги ниҳоятда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м гача етadиган ўқ илдизли, қўп йиллик ўт. Илдиз бугизи шохланган, эски барг юлдиклари билан қопланган. Поялари қўп, деярли баргсиз. Ўртасидан шохланган. Ёпирма барглари қалин, узун бандли, уч қарра патсимон қирқилган, бўлаклари майда овалсимон. Поядаги барглари жуда майда, узунлиги 3-4 мм, поянинг юқори қисмидагилари эса майдалашиб, новга айланган. Соябонининг эни 4-8 см. Тоғбарглари тескари тухумсимон, оқ. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари; Зарафшон ва Ҳисор тизмаларининг ғарбий қисмида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг тошли ёнбағирлари (арчазорлар)да ўсади.

Сони. Учта ерда мавжудлиги аниқланган. Умумий сони ҳақида аниқ маълумотлар йўқ.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор ва Китоёб давлат қўриқхоналарида муҳофаза этилади.

Манбалар. [159, 349].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое травянистое растение высотой до 1 м. Корень стержневой. Стеблекорни разветвленные, покрыты остатками черешков отмерших листьев. Стеблей несколько, они полые, округлые, от середины ветвящиеся. Прикорневые листья на длинных черешках, трижды перисторассеченные, конечные доли мелкие, овальные, лопастные, длиной 3-4 мм, стеблевые листья сильно уменьшенные, верхние редуцированные до влагалищ. Зонтики 4-8 см в поперечнике, с обертками и оберточками. Лепестки белые, обратнойцевидные. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: западная часть Зеравшанского и Гиссарского хребтов. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Каменистые склоны гор в поясе арчовников.

Численность. Известны 3 местонахождения, сведений об общей численности нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не известны.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском и Китабском заповедниках.

Источники. [159, 349].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Rare and endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the western parts of the Zerafshan and Hissar ranges (Kashkadarya and Surkhandarya region). Inhabits stony slopes of mountains in the juniper belt. 3 populations are known. Total number is unknown. Measures of protection: protected in the Kitab and Hissar state reserves.



91. САРИҚ КИРКГУЛ

Ферганская многоцветковая / *Fergania polyantha* (Korovin) Pimenov

Мақоми 1. Фарғона водийсининг тоғолди худудларига хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см гача етадиган кўп йиллик, монокарп ўсимлик. Пойлари якка, майда чизикли. Ёпирма барглари (гуллаган пайтида) исси ва кенг бандли. Япроғи учбурчак шаклида, уч қарра қирқилган, бўлаклари ўз навбатида патсимон қирқилган. Соябони ён шоҳларда ва пойнинг учида жойлашган, 7–10 шуъали кўп гулли (гуллар 36 тагача), юмалоқ. Гуллари сариқ, косачасиз. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой ва Туркистон тизмаларининг Фарғона водийсига юзланган томонида тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Қирғизистон ва Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмида ва тоғ этакларида, соз тупроқли туб жинслар (сланец, конгломерат)дан ташкил топган ёнбағирларда, нураётган қонлар ва ўрнашиб қолган сурилмаларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 231].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Статус 1. Редкий эндемик предгорий Ферганской долины.

Краткое описание. Многолетнее монокарпическое травянистое растение высотой до 40 см со стержневым корнем. Стебли одиночные, тонкобороздчатые. Листья прикорневые, с расширенными черешками. Пластинка листа в очертании треугольная, тройчаторассечённая; конечные доли продолговато-эллиптические, лопастные, 3 см длиной, 1,5 см шириной. Зонтики 7–10-лучевые, зонтики шаровидные. Лепески жёлтые, чашечка без зубцов. Плоды сжатые со спинки. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Ферганская область: предгорья Алайского и Туркестанского хребтов, обращённые к Ферганской долине. За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Таджикистан.

Места обитания. Сланцевые и глинисто-сланцевые конгломераты на склонах, разрушающиеся скалы и неподвижные щебнистые осыпи в предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Одиночно или небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведений нет.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 231].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Rare species of the Ferghana valley. It is spread at the piedmont zone of the Alay and Turkestan ranges in the Ferghana valley (Ferghana region). Inhabits schistous and clayish-schistous conglomerates on slopes, destroying rocks and fixed mounds in piedmont zone. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



92. ПИЛДИРОҚ ҚЎШШОХ

Жабрица кубарчатая / *Seseli turbinatum* Korovin

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шань ва Помир-Олойнинг жуда камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси жўякли, туксиз, шохланган. Барглари уч карра патсимон қирқилган, бандли. Бўлаклари наштартсимон, учли, узунлиги 10–12 мм. Поянинг юқори қисмидаги барглари қаламинаштартсимон новли. Соябонлари 4–5 нурли, соябончалари тигиз, 20 та гулли, ўрама баргчалари 9–11 та, наштартсимон. Тожбарглари чўзиқ-овалсимон, юқори қисми ичига букилган. Меваси чўзиқ-овалсимон, тукли, узунлиги 5 мм га етади. Июль ойида гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Нурота тизмаси (Қўйтош тоғи, Устихон сой)да тарқалган. Тошкент вилояти, Қурама тизмаси. Ўзбекистондан ташқари Қозоғистонда учрайди.

Ўсиш шароити: Тошли ёнбағирлар ва қояларнинг ўрқачларида, бодомзор ва арчазорлар орасида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [148, 230].



Статус 1. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое травянистое растение высотой до 1 м. Стебель бороздчатый, голый, ветвящийся. Листья на черешках, трижды перисторассечённые на ланцетные, острые доли длиной 10–12 мм, верхние стеблевые листья редуцированы до линейно-ланцетных влагалищ. Зонтики 4–5-лучевые, без оберток, зонтики плотные, 20-цветковые, обёрточки состоят из 9–11 ланцетных, почти свободных листочков. Лепестки желтые, продолговато-овальные. Плоды продолговато-

овальные, опушенные, длиной до 5 мм. Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Джизакская область: Нуратинский хребет (горы Койташ, урочище Устахан; хребет Нуратау, урочище Гурдара); Ташкентская область: Кураминский хребет. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Каменистые склоны и скалистые гребни.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [148, 230].

Н.Ю. Бешко

Н.Ю. Бешко



Rare endemic species of the western Tien-Shan and Pamir-Alay. It is spread at the Nuratau range: the Koytash mts., the Ustakhan valley; the Nuratau mts., the Gurdara valley (Jizzakh region), the Kurama range. Inhabits stony slopes and rocky ridges. The quantity is unknown. Measures of protection; not protected.



93. ОВЧИННИКОВ ПАУЛИЯСИ

Паулия Овчинникова / *Paulita ovczinnikovii* (Korovin) Sojak

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойнинг эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Баландлиги 50–100 см бўлган кўп йиллик монокарп ўсимлик. Илдизи тугунаксимон, бармоқсимон тармоқланган. Пойлари йкка-икка ҳолатда, ичи ғовак, ўртасидан бошлаб юқориқда шохланади. Илдизолди барглари тез қурийд; ипроқлари кенг учбурчаксимон, икки, уч қарра патсимон қирқилган; асос қисмидаги бўлақларининг бандчалари бор; учки бўлақлари кенг, ромбсимон, йирик тишчали. Гултожибарги оқ, косачасининг тишчалари йўқ. Меваси 2,5 мм узунликкача, тухумсимон, бир-бирига тенг бўлган қовурғалари туфайли сал гадирбудур. Май ойида гуллаб, июнь-июлда мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси, ғарбда Мачайдарёгача, Боботоғ. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тош-шағалли, соз тупроқли ёнбағирликларда ўсади (д. с. б. 900–2 000 м).

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан зиёд қўп боқилиши, ўсиш жойларининг деградацияга учраши, маҳаллий аҳоли томонидан зиявор сифатида териб олиниши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [141, 159].

М.Г. Пименов, Е. Ключков

Статус 1. Эндемичное растение Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетний монокарпик высотой 50–100 см. Корень клубневидный, пальчаторазветвленный. Стебли одиночные, полые, от середины ветвящиеся. Прикорневые листья рано увядающие; пластинка в очертании широкотреугольная, дважды-трижды перисторассеченная; базальные первичные сегменты из черешочка; конечные доли широкие, ромбические, крупнозубчатые. Зонтики 20–27-лучевые с оберткой и оберточками из цельных листочков. Лепестки белые; зубцы чашечки отсутствуют. Плоды до 2,5 мм длины, яйцевидные, слегка шероховатые с



короткими равными килевидными ребрами. Цветет в мае, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет, на западе до Мачайдары, хребет Бабатаг.

Места обитания. Мелкощебнистые, мелкоземистые склоны (900–2 000 м н. у. м.).

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота, деградация местообитаний, заготовка населением в качестве пряности.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [141, 159].

М.Г. Пименов, Е. Ключков

Endemic species of the Pamir-Alay. It is spread at the Surkhondarya region: the Hisar range (the Sangardak and Tupalang river basins), the Babatag range. Inhabits clay and rubbly slopes, among shrubs, at 900–2 000 m.s.l. Can be found in small groups with limited areas. Limiting factors: Intensive pasturing, habitat degradation using by local population as spice. Measures of protection: not protected.



94. ГАРОЙИБ КУЗАКИ

Осенница неопределенная / *Autumnalia inopinata* Pimenov

Мақоми 1. Нурота тизмасидаги Қоратоғнинг ўта камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача таъсифи. Баландлиги 1 м гача етадиган қўп йиллик поликарп ўсимлик. Понлари якка-якка, тигиз. Барглари икки қарра уч бўлакли, учидagi бўлақларининг банди қисқа, тухумсимон, четлари бутун, учи ўткирлашган. Соябонлари қўп, майда шарсимон, 4–5 шўълали; ўрама барглари тухумсимон, пастга қийрилган. Гултоғинбарги оч сариқ; косачасининг тишчалари йўқ. Меваси туксиз, тухумсимон ёки сал юмалоқлашган. Август–сентябрда гуллаб, сентябрь–октябрда мевалайди.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Нурота тизмаси Қоратоғдаги Қорақарга довоми атрофида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тош-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 2009 йилда битта популяцияси аниқланган (50 та туп). 2012–2014 йилларда яна иккита популяцияси топилган (ўсимликларнинг умумий сони 150 га яқин). Тахминан 20 км² майдонда тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиатда камёб эндемик ўсимлик. Ўсиш жойларида чорва моллари жуда қўп ёқилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159].

Н.Ю. Бешко, К.Ш. Тожибаев



Статус 1. Редчайший эндемик горы Каратау Нуратинского хребта.

Краткое описание. Многолетний стержнекорневой поликарпик до 1 м высотой. Стебли одиночные плотные с метельчато-разветвленным соцветием. Листья дважды тройчатые; конечные доли на черешочках, яйцевидные, цельнокрайние, на конце заостренные. Зонтики многочисленные мелкие шаровидные, 4–5-лучевые; листочки обертки яйцевидные, пленчатые, вниз отогнутые; оберточка отсутствует. Лепестки светложелтые; зубцы чашечки отсутствуют. Плоды голые, яйцевидные или почти округлые сильно сжатые со спинкой мерикарпиев; спинные ребра мерикарпиев почти незаметные, краевые крыловидные. Цветет в августе–сентябре, плодоносит в сентябре–октябре.

Распространение. Навоийская область: Нуратинские горы, хребет Каратау, окрестности перевала Кара-карга.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны, выходы сланцев, среди колючешишковых на высоте 600–800 м н. у. м.

Численность. В 2009 году была обнаружена одна популяция численностью не более 50 особей. В 2012–2014 гг. выявлено 2 популяции общей численностью около 150 растений. Общая площадь распространения около 20 км².

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Естественно редкий узкоэндемичный вид. Места обитания используются под выпас большого количества скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159].

Н.Ю. Бешко, К.Ш. Тожибаев

Very rare, endemic species of the Nuratau mountains, belonging to endemic Central Asiatic genus. It is spread at the Navoi region: the Nuratau mts, the Karatau range (near the Kara-karga passage). Endemic of Uzbekistan. Inhabits stony rubble slopes, among the shrubs of Amygdalus spinosissima, at 600–800 m. s. l. In 2009 only one population (about 50 plants) was found. In 2012–2014, about 150 plants were counted in two localities. Distribution area is about 20 sq. km. Limiting factors: endemic stenotopic species. The habitat is used for pastures. Measures of protection: not protected.



95. ЧАКАМИГМЕВАСИМОН АСТОМАТОПСИС

Астоматопсис подмаренникоплодный / *Astomatopsis gallocarpa* Korevin

Мақоми 2. Дарвоз тизмаси ва Ҳисор тизмаси жанубий ёнбағирларининг эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Умуман туксиз, кўп йиллик поликарп ўсимлик, эфемероид. Тугунаги шарсимон. Пояси якка-якка, ингичка, 10–25 см баландликда. Илдизолди баргларининг япроқлари 2 қарра уч бўлакли қирқилган; учки бўлаклари 1–2 см узунликда, эни 0,5 см, тухумсимон, уч бўлакли; поя барглари учкидаги бўлаклари ингичка. Соябонлари ўрама барглари ва баргчаларсиз, 2–7 та ингичка, бир-бирига тенг 20 мм узунликдаги шўълалардан иборат. Қосачаси тишчасиз. Гултожи оқ, 0,9 мм узунликда. Меваси икки бўлакли, қўшалоқ қўнғир, силлиқ, 1,5–1,9 мм узунликда, эни 3–4 мм. Июнь-июлда гуллаб, июль-августда мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси, Тупаланг дарёсининг ҳавзаси. Ўзбекистондан ташқарида: Тожикистон.

Ўсиш шароити. Майда шағалли тўқилмалар, қоялар остидаги майин тупроқлар тўпланган ёнбағирликлар, қор секин эрийдиган жойларда, дарё ёқаларида денгиз сатҳидан 2 200–2 300 м. баландликда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғи ва тугунагидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофазат қоралари. Муҳофазат қилинмайди.

Манбалар. [142, 233].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Статус 2. Эндемик южного макросклона Гиссарского и Дарвазского хребтов.

Краткое описание. Совершенно голое многолетнее поликарпическое растение, эфемероид. Клубень шаровидный. Стебель тонкий, одиночный, высотой 10–25 см. Пластинки прикорневых листьев дважды тройчаторассеченные; конечные доли 1–2 см длиной, 0,5 см шириной, яйцевидные, трехлопастные; стеблевые листья с линейными конечными долями. Зонтики без оберток и оберточек, с 2–7 тонкими, примерно равными лучами длиной 20 мм. Чашечка без зубцов. Лепестки белые, длиной 0,9 мм. Плоды двойчатые, бурые, гладкие, длиной 1,5–1,9 мм и шириной 3–4 мм. Цветет в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область:

Гиссарский хребет, бассейн реки Тупаланг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Мелкощелочистые осыпи, скопления мелкозема под скалами, в местах позднего таяния снега, вдоль ручьев, на высоте 2 200–3 000 м.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенами и клубнями.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [142, 233].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков



Rare endemic species of the southern slope of the Hissar and Darvaz ranges. It is spread at the Surkhandarya region: the Hissar range, the Tupalang. Inhabits scree, formed by small detrit stones, snow melting places under rocks, alongside streams, 2 200–3 000 m.s.l. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



96. АНГРЕН ЗИРАСИ

Эльвения ангрени / *Elwendia angreni* (Korovin) Pimenov et Kljuykov

Мақоми 1. Оҳангарон дарёси ҳавзасининг кам-ёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Қўп йиллик, туксиз, поликарп эфемероид ўсимлик. Тугунаги шарсимон. Пояси якка-якка, 15 см гача. Барглари ингичка-ланцетсимон бўлакларга уч қарра патсимон қирқилган, бўлаклари 10 мм узунликкача. Соябони ўрама барглрсиз, 2-5 шуълали, шуълалар узунлиги 15-20 мм. Соябончаси ўрама баргчаларсиз. Косачасининг тишчалари йўқ. Гултожи оқ, бир хилда эмас, ташқаридагилари ичкиларидан йирикроқ. Мева-



си эллипсимон, мева бандидан бир неча марта калтароқ. Май-июнда гуллаб, июнь-июлда мева-лайди.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол ва Курама тизмалари (Оҳангарон дарёси ҳавзаси)да.

Ўсиш шароити. 1 200-2 300 м баландликдаги шаралли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаб-лари. Чорва молларининг боқилиши ва торли ҳудудларнинг ўзлаштирилиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.



Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонаси ва Уғам-Чотқол биосфера резерватиди муҳофаза қилинади.

Манбалар. [114, 145].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Статус 1. Редкий эндемик бассейна реки Ахангаран.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое голое растение, эфемероид. Клубень шаровидный. Стебли одиночные, высотой до 15 см. Листья тройчато-перисто рассеченные на линейно-ланцетные участки длиной до 10 мм. Зонтики без обверток, 2-5-лучевые, лучи 15-20 мм длиной. Зонтики без обверточек. Чашечка без зубцов. Лепестки белые, неодинаковые, наружные крупнее внутренних. Плоды эллиптические, во много раз короче плодоножек, 2,2 мм длиной. Цветет в мае-июне, плодоносит июне-июле.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский и Кураминский хребты (в пределах бассейна реки Ахангаран).

Места обитания. Щебнистые склоны в диапазоне высот 1 200-2 300 м.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота, освоение горных территорий.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника и Угам-Чаткальского биосферного резервата.

Источники. [114, 145].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Rare endemic species of Akhangaran river basin It is spread at the Tashkent region: the Chatkal and Kurama ranges, of the Akhangaran river basin. Inhabits scree slopes, 1 200-1 300 m s l. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing, economic activity in the mountainous area. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve and Ugam-Chatkal state biosphere reserve.

97. НОВБАРГЛИ ЗИРА

Эльвендия влагалищная / *Elwendia vaginata* (Korovin) Pimenov et Kljuykov

Мақоми 1. Гарбий Тянь-Шаннинг реликт, кам-ёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик, умуман туксиз, поликарп ўт ўсимлики. Тугунаги шарсимон, диаметри 2 см гача. Пояси якка-якка, 25 см гача. Барглари 2 карра латсимон қирқилган, қалин, тухумсимон-ланцет шаклида кенгайган, илтироқ новбарглари учидаги бўлаклари ингичка, 10 мм узунликда ва эни 1 мм. Соибони ўрама барглрсиз, 5–10 шуълалли, шуълалар узунлиги 3–10 мм. Соибончаси 15–20 гулли. Косачасининг тишчалари йўқ. Гултожи оқ, тескари юраксимон, кемтикли, 1,5 мм узунликда. Меваси узунчоқ-овалсимон, 3 мм узунликда. Май-июнда гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Қоржонтоғдан бир марта И.И. Мальцев терган. Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон (Талас Олатоғи, Сырдарё Қоратоғи).

Ўсиш шароити. Сувайирғичларнинг яқинидаги тошли-шағалли ёнбағирликлар.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойлари Уғам-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида жойлашган.

Манбалар. [114, 145].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Статус 1. Редкий реликтовый эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Совершенно голое поликарпическое травянистое растение, эфемероид. Клубень шаровидный, до 2 см в диаметре. Стебель одиночный, до 25 см высотой. Листья дважды перисто-рассеченные, с кожистыми, яйцевидно-ланцетными расширенными, блестящими влагалищами; конечные доли линейные, до 10 мм длиной и 1 мм шириной. Зонтики без обертки, с 5–10 лучами, длиной 3–10 см, зонтики 15–20-цветковые. Чашечка без зубцов. Лепестки белые, обратно-сердцевидные, выемчатые, длиной 1,5 мм. Плоды продолговато-овальные, сжатые со спинки, длиной 3 мм. Цветет и плодоносит в мае-июне.

Распространение. Ташкентская область: Западный Тянь-Шань – Каржантау (один раз было собрано И.И. Мальцевым). За пределами Узбекистана: Казахстан (Таласский Алатау, Сырдарьинский Каратау).

Места обитания. Каменно-щебнистые приводораздельные склоны гор.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Места произрастания находят-

ся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [114, 145].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Rare endemic relict species of the western Tian-Shan. It is spread at the Tashkent region: the western Tian-Shan, the Karzhantau range (collected once by I.I. Maltsev). Inhabits stony and rubbly mountain slopes near water-sheds. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal National park.



98. ГАЙСИМОН ДИМОРФОСЦИАДИЙ

Диморфосциадий гайевидный / *Dimorphosciadium gayoides* (Regel & Schmalh.) Pimenov

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шань ва Помир-Олойнинг камёб ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик монокарп ўт ўсимлик. Илдизи – ўқ илдиз. Пояси ривожланмаган, кўп сонли шоқлари илдиз бўғзи олдидан чиқади. 10 см узунлиқкача. Баргларининг ҳаммаси илдизолди баргларидан иборат: япроқлари патсимон ёки 2 қарра патсимон қирқилган; учигаги бўлақлари овалсимон, тахминан 2 мм узунлиқда. Соябонлари икки хил: марказийлари каттароқ, эгилувчан, ёнбошлари майдароқ. Урама барг ва баргчалари бутун япроқчалардан ташкил топган. Косачаси тишчаларсиз. Гултожи оқ, тухумсимон, 15 мм узунлиқда. Меваси тухумсимон, туксиз, 4 мм. Июль–августда гуллаб, август–сентябрда мевалайди.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Писком ва Чотқол тизмалари. Ўзбекистондан ташқарида: Қирғизистон, Тожикистон, Ғарбий Хитой.

Ўсиш шароити. Баланд тоғларнинг очик, шағалли ёнбағирликларида ўсади (2 900–3 700 м).

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уругидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг бениҳоя кўп боқилиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида ва Уғам-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [235].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Статус 2. Редкое растение Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее монокарпическое травянистое растение. Корень стержневой. Стебель не развит, с многочисленными, выходящими из розетки приподнимающимися ветвями, до 10 см длиной. Листья все прикорневые; пластинки перистые или дважды перисторассеченные; конечные доли овальные, около 2 мм длиной. Зонтики двойные: центральные более крупные, сидячие, боковые более мелкие, на верхушках ветвей. Обертки и оберточки из цельных листочков. Чашечка без зубцов. Лепестки белые, яйцевидные, 1,5 мм длины. Плоды яйцевидные, голые, 4 мм длины. Цветет в июле–августе, плодоносит август–сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Пскемский и Чаткальский хребты. За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Таджикистан, западный Китай.

Места обитания. На открытых щебнистых склонах высокогорий (2 900–3 700 м).

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника и Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [235].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Rare species of the western Tian-Shan and Pamir-Alay. It is spread at the Tashkent region: the Pskem and Chatkal ranges. Inhabits open rubbly slopes in the alpine belt (2 900–3 700 m.s.l.). The quantity is unknown. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: protected in the Chatkal Biosphere state reserve and Ugam-Chatkal national park.



99. КОРОВИН ЛОМАТОКАРПАСИ

Окаймленноплодный Коровина / *Lomatocarpa korovinii* Pimenov

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шаннинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик поликарп ўт ўсимлики. Кўп сонли поялари баргсиз, 5–15 (20) см узунликда, туксиз. Баргларининг ҳаммаси илдиз-олди баргларидан иборат. Кўп сонли, бандли, туксиз, узунлиги 5–10 см, эни 1–2 см, япроқлари 2 қарра патсимон қирқилган; учидаги булақлари овалсимон ёки тухумсимон, 3–4 мм узунликда, тишчалари бор. Соябонлари 3–10 шуълалли. Урама барг ва баргчалари 5–6 та ланцетсимон япроқлардан ташкил топган. Соябончаси 10 гулли. Косчаси тишчалари тухумсимон. Гултожи оқ, тухумсимон, 15 мм узунликда. Меваси тухумсимон, узунлиги 4 мм, эни 3–4 мм. Июнь–июлда гуллаб, июль–августда мевалайди.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Пискон, Уғам, Чотқол, Курама тизмалари. Ўзбекистондан ташқарида: Қирғизистон, Қозғистон.

Ўсиш шароити. Баланд тоғларнинг шағалли ёнбағирликларида ўсади (3 000–3 600 м).

Сони. Кичик тўплар ҳолида ўсади. Бошқизилсой юқори қисми (Қўрғонтош ва Қизилсура чўққиларининг атрофлари) ўсимлик доминантligидаги кичик жамоалар қайд қилинган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг бениҳоя кўп боқилиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида, Уғам-Чотқол биосфера резерватида ва Уғам-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [236].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Статус 1. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое травянистое растение с многоглавым каудексом. Стебли безлистные, многочисленные, длиной 5–15(20) см, голые. Листья все прикорневые, многочисленные, на коротких черешках, голые, длиной 5–10 см и шириной 1–2 см, дважды перисто-рассеченные; конечные доли овальные или яйцевидные, 3–4 мм длиной, зубчатые. Зонтики 3–10-лучевые с обертками и оберточками из 5–6 ланцетных или линейных листочков. Зонтички 10-цветковые. Зубцы чашечки яйцевидные. Лепестки белые. Плоды яйцевидные, 4–5 мм длиной и 3–4 мм шириной. Цветет в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Чаткальский, Кураминский, Угамский и Пскемский хребты. За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Казахстан.

Места обитания. На щебнистых склонах верх-

него пояса гор (3 000–3 600 м).

Численность. Встречается группами. В верховьях Башкызылсай (окрестности Курганташа и Кызылнуры) отмечены сообщества с доминированием вида.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Летний выпас скота.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника, Угам-Чаткальского биосферного резервата и Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [236].



М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Tashkent and Namangan regions: the Chatkal, the Kurama, the Ugam and the Pskem ranges. Inhabits rubble slopes in alpine zone, at the altitude 3 000–3 600 m.s.l. It grows in groups. In the Bashkyzylsai river basin (the Kurgantash, the Kyzylnura mts.) large populations were revealed. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Chatkal and Ugam-Chatkal biosphere reserves and the Ugam-Chatkal national park.



100. ИНГИЧКА БАРГЛИ ПОНАПАНЖА

Клинолобастник тонкорассеченный / *Sphaenobolium tenuisectum* (Korovin) Pimenov

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шаннинг камёб ва эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик монокарп ўт ўсимлики, баландлиги 40–100 см. Илдизпояси шохланган. Барглари узун барг бандларида жойлашган илдизолди баргларида ноборат; япроқлари кенг ромбсимон, икки ва уч қарра қирқилган бўлаклари узун бандчаларда жойлашган, учидаги бўлаклари узунчоқ, узунлиги 10 мм, кенглиги 1,5 мм. Соябонлари 5–10 шуълали, ўрама барг ва баргчалари бутун япроқчалардан ташкил топган. Косачаси тишчалари калта. Гултожи оч сариқ, тухумсимон, 15 мм узунликда. Меваси 6,5 мм узунликкача, тухумсимон-ланцет шаклида, туксиз. Июлда гуллаб, август-сентябрда мевалайди.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Қоржонтов, Писком ва Угом тизмалари. Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон.

Ўсиш шароити. Шағалли ёнбағирликлар ва қояларнинг ёриқларида ўсади (д. с. б. 1 500–2 400 м).

Сони. Яқка-яқка ўсади.

Қўпайиши. Уругидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойлари Угом-

Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида жойлашган.

Манбалар. [234].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Статус 2. Редкое и эндемичное растение Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетний стержнекорневой поликарпик 40–100 см высотой. Стеблекорень разветвленный. Стебли округлые, плотные. Листья преимущественно прикорневые на длинных черешках; пластинка в очертании широкоромбическая, дважды-трижды тройчаторассеченная; сегменты на длинных черешочках; конечные доли линейные, длиной до 10 мм и шириной 1,5 мм. Зонтики 5–10-лучевые с обертками и оберточками из цельных коротких листочков. Лепестки светло-желтые; зубцы чашечки короткие. Плоды до 6,5 мм длиной, яйцевидно-ланцетные, голые. Цветет в июле; плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Каржантау, Пскемский и Угамский хребты. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. На щебнистых осыпях и в трещинах скал (1 500–2 000 м).

Численность. Встречается одиночно.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не известно.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Произрастает на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [234].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Tashkent region: the Karzhantau, the Ugam and Pskem ranges. Inhabits stony slopes and rock crevices at the altitude 1 500–2 000 m.s.l. Solitary specimens. Measures of protection; protected in the Ugam-Chatkal national park.



ИСИРИҚДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО МОГИЛЬНИКОВЫЕ
(ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ) – PEGANACEAE (ZYGOPHYLLACEAE)

101. ҚҰНҒИР ҚУМУЗУМ

Мягководник критмолистный / *Malacosarpus crithmifolius* (Retz.) C.A. Mey.

Мақоми 2. Ўзбекистонда ягона турга эга туркумнинг реликт тури.

Қисқача тавсифи. Чирмашиб ўсадиган, қишда барглари тўкадиган бута. Барглари этли, учли-наштарсимон, қирқилган, узунлиги 7 см, эни 6 см. Гули икки жинсли, қўш гулқўрғони сариқ. Меваси 3 уяли, қўп уруғли, ясси-юмалоқ, диаметри 1–1,5 см, этли, сершира, қўнғир-қизғиш рангли. Уруғи майда, узунлиги 3 мм. Июнь–сентябрь ойларида гуллаб, меваси июль–октябрда пишди.

Тарқалиши. Қорақалпоғистон: Уstyуртда тарқалган. Қозоғистон, Туркменистон ва Эронда ҳам ўсади.

Ўсиш шароити. Тошлоқларда, шўр тупроқларда, чучук ва маъданли булоқлар атрофида ўсади.

Сони. 2014 йили ўсимлиқнинг 6 та ценотик популяцияси (5 та жанубий, 1 та шарқий чинкда) топилган. Улардаги тупларнинг умумий сони 200 та атрофида.

Қўпайиши. Уруғидан ва илдиз бачкилари орқали қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўзбекистон ҳудудига ўсимлик ўз ареалининг шимоли-шарқий чегараси орқали кириб келган. Аҳоли уни меваси учун йиғади.

Маданийлаштирилиши. Ашхобод ва Шевченко шаҳарларидаги ботаника боғларида қўп йиллардан бери муваффақиятли ўстириб келинмоқда.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [196].

Ҳ.Ф. Шомуродов

Статус 2. Редкий реликтовый вид монотипного рода.

Краткое описание. Лианопоподобный листопадный кустарник. Листья мясистые, ланцетно-линейные, рассеченные, длиной 7 см и шириной 6 см. Цветки обоеполые, с двойным околоцветником, лепестки лимонно-жёлтые. Плод – трёхгнездная, многосеменная ягода округло-плюснutoй формы, 1–1,5 см в диаметре. Мякоть плода сочная, оранжево-красного цвета. Семена мелкие, длиной 3 мм. Цветёт в июне–сентябре, плодоносит в июле–октябре.

Распространение. Каракалпакстан: Плато Уstyурт. За пределами Узбекистана: Казахстан, Туркменистан и Иран.

Места обитания. Галечники, засоленные почвы близ пресных и минерализованных родников.

Численность. В 2014 г. отмечено 6 ценотических популяций вида (5 на южном чинке и 1 на восточном чинке Уstyурта), общей численностью около 200 растений.

Размножение. Семенное и вегетативное (отводками).

Причины изменения численности и ареала. В Узбекистане находится на северо-восточной окраине ареала. Интенсивный сбор местным населением.

Культивирование. Успешно выращивается в ботанических садах г. Ашгабада и г. Шевченко.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [196].

Ҳ.Ф. Шомуродов

Rare, relict and genus species. It is spread at the Ustyurt Plateau (Karakalpakstan). Inhabits pebbles, saline soils near fresh and mineral springs. Limiting factors: Uzbekistan is the north-eastern limit of the distribution area. Intensive collection by local people. Measures of protection: not protected.



ИТУЗУМДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ПАСЛЕНОВЫЕ - SOLANACEAE

102. ОЛОЙ ХИЁЛИ

Пузырица алайская / Physochlaina alaiica Korotkova ex Kovalevsk.

Мақоми 1. Олой ва Туркистон тоғларига мансуб жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача таъсифи. Бўйи 50 см га етадиган, кўп йиллик ўт. Поялари кўп, тик, ёйиқсийрак, оддий ва безчали туклар билан қопланган. Барглари узун бандли, кенг тухумсимон, япроғининг узунлиги 5–10 см, эни 4–8 см, устки томони деярли туксиз, пастки томони томирлари бўйлаб сийрак туклар билан қопланган. Гуллари қисқа (0,5 см), мевасининг етилишига қараб узайиб борадиган, безчасимон тукли бандларда ўрнашган. Тупгули ёйиқ, юқори қисми каллакчасимон. Косчаси безчасимон тукли, узунлиги 0,5 см. Гултожи қўнғироқсимон, узунлиги 10–15 мм, хира пушти рангли. Меваси кўсакча, узунлиги 10–12 мм. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой тизмасида, Шоҳимардон ва Сўх дарёларининг ҳавзаларида учрайди. Қирғизистон, Тожикистон (Туркистон тизмаси: Ворух, Хўжабақирган қишлоқлари атрофлари)да ҳам тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1 800–2 000 м бандликда қояларнинг соялари, бутазорларнинг тағлари, арчазорлар ва очик ерларда ўсади.

Сони. Жуда сийрак тарқалган. Турли ёшдаги ўсимликларнинг умумий сони 8000 тупдан ошмайди.

Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан доривор ўсимлик сифатида кўплаб ишлатилиши сабабли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Табиий шаронгта экиб ўстирилганда ижобий натижа бермаган. ЎзР ФА Ботаника боғида 1973 йилдан буён ўстириб келинади.

Муҳофазат чоралари. Махсус муҳофазат чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [122, 159].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Редчайший эндемик Алайского и Туркестанского хребтов.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 50 см. Стебли многочисленные, прямостоячие, рыхловолосистые, с примесью железистых волосков. Листья широкояйцевидные, с верхней стороны почти голые, с нижней по главной жилке рыхловолосистые, на длинных черешках, пластинки листа длиной 5–10 см, шириной 4–8 см. Цветки на коротких (0,5 см) и удлиняющихся при плодах железистых цвето-

ножках, собраны в рыхлое соцветие, на верхушке головчатое. Чашечка железистоволосистая длиной 0,5 см. Венчик колокольчатый, длиной 10–15 мм, грязно-кремовый. Коробочка длиной 10–12 мм. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Ферганская область: Алайский хребет – бассейны рек Шахмардан и Сох. За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Таджикистан (Туркестанский хребет – окрестности кишлаков Ворух, Ходжабакирган).

Места обитания. В тени скал, под кустарниками, в арчовниках и на открытых полянах в среднем поясе гор, на высоте 1 800–2 000 м над уровнем моря.

Численность. Встречается редко, единичными особями. Общая численность разновозрастных растений не превышает 8 000 экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Нерациональное использование вида местным населением в качестве лекарственного сырья.

Культивирование. Предпринята неудачная попытка культивирования в природных местах обитания. В Ботаническом саду АН РУз выращивалась с 1973 года.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [122, 159].

К.Ш. Тожибаев

Very rare endemic of the Alay and Turkestan ranges. It is spread at the Alay range: the Shakhimardan and Sokh valleys (Ferghana region). Inhabits rock shades, under shrubs, on the open glades among the juniper stands in the middle belt of mountains, at an elevation of 1 800–2 000 m.s.l. Single specimens can be found rarely. Total number of plants of different age not exceeds 8000 specimens. Limiting factors: irrational use of these species by local population as medicinal raw material. Measures of protection: not protected.



КАРАМДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО КАПУСТНЫЕ (КРЕСТОЦВЕТНЫЕ) –
BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

103. ҲИСОР ИСКАНДАРАСИ

Искандера гиссарская / *Iskandera hissarica* N. Busch

Мақоми 1. Ҳисор тизмасидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Вўйи 30 см га етадиган, поясининг пастки қисми ёғочланган, кўп йиллик ўт. Ёпирма барглари тескари наштасимон, қисқа бандли, узунлиги 1–8 см, эни 3–15 мм, юлдузсимон тукли. Гулпояси, одатда, баргсиз бўлади. Косачабарглари чўзикроқ, бинафша рангли, узунлиги 8 мм, эни 6,5 мм. Қўзғи юқорига қараган, 3–5 см узунликда, кенг наштасимон ёки чизикли-узунчоқ, юлдузсимон ва безсимон туклар билан қопланган. Май ойида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тоғи (Қорақўл, Хондиза ва Тўпаланг дарёларининг юқори irmoқлари)да тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмида, қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Кам учрайди, кичик-кичик тўплар ҳосил қилади. Тўпаланг дарёси ҳавзасида 3 000 тупи қайд қилинган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофазат чоралари. Махсус муҳофазат чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [46, 263].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Редкий узколокальный эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее растение высотой до 30 см с древеснеющими в нижней части побегами. Листья розеточные, обратноланцетные, короткочерешковые, длиной 1–8 см, шириной 3–15 мм, звездчатоопушенные, многолучевые. Цветоносные стебли, как правило, безлистные. Чашелистики продолговатые, фиолетовые, длиной около 8 мм, шириной 6,5 мм. Стручки вверх торчащие, длиной



3–5 см, широколанцетно или линейно-продолговатые, опушены звездчатыми и железистыми волосками. Цветёт в мае, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – Каракуль, верховья Хандизы и притоков реки Тупаланг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Трещины скал в субальпийском поясе гор.

Численность. Встречается небольшими куртинками. 3 000 растений в Тупаланге.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Культивировался в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [46, 263].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic of the Hisar range. It is spread at the Hisar range: Karakul, Khandiza and Tupalang (Surkhandarya region). Inhabits cracks of rocks in the subalpine zone. The quantity is 3000 plants in the Tupalang area. Measures of protection: not protected.



104. ТОШБУЗАР ПАРРИЯСИ

Паррия камнеломка / *Parrya saxifraga* Botsch. et Vved.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шанда ареали бўлинган, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10 см га етадиган, деярли поясиз кўп йиллик ўт. Қисқа пояси куруқ барг қолдиқлари билан қопланган. Илди-зи кўпбошчали. Ёпирма барглари чўзиқ тухумсимон, қаттиқ, четлари тишли. Гул-поя-лари баргсиз, оддий, узунлиги 3-7 см. Гуллари би-нафша рангли. Меваси кўзок, юқорига қараб қайрилган. Уруғи ясси, юмалоқ, эни 2,5-5 мм, ўрта қисмидан учига ва асосига қараб ингичкалаша боради. Июнь



ойида гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Наманган вилоятлари: Чотқол ва Курама тизмасидаги Бетоголик, Кенгсоз ва Қўйтош дараларида, Жирдон, Орашон доволарида ўсади.

Ўсиш шароити. Тоғларда 2 600-2 900 м баланд-ликдаги шагалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда ёки кичик туплар ҳосил қилиб учрайди. Бу тур тоғларнинг қиёш қийин бўлган жойларида сўқланиб қолган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уруғининг униб чиқиш даражаси паст бўлганлиги туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофазა чоралари. Махсус муҳофаза қилиш тадбирлари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [36, 159].

К.Ш. Тожибаев



Статус 2. Редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее, почти бесстебельное травянистое растение высотой до 10 см. Укороченные стебли покрыты сухими остат-

ками отмерших листьев. Корень многоглавый. Листья в прикорневой розетке, жесткие, зубчатые, продолговато-яйцевидные. Цветочные стебли безлистные, простые, высотой 3-7 см. Цветки фиолетовые. Плод - косо вверх направленный стручок. Семена плоские, округлые, шириной 2,5-5 мм, к основанию и верхушке суженные. Цветет в июне, плодоносит в августе.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Кураминский и Чаткальский хребты - урочище Бетоголик, Кенгсоз и Койташ, перевалы Джирдан, Арашан.

Места обитания. Щебнистые склоны субальпийского пояса гор, на высоте 2 600-2 900 м.

Численность. Одиночно или небольшими группами. Сохранился в труднодоступных местах.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Слабое семенное возобновление.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [36, 159].

К.Ш. Тожибаев

Rare and endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range: Betagalik, Kengsaz and Koitash, the Djirdan and Arashan passes (Tashkent and Namangan regions). Inhabits slopes of the subalpine belt of mountains at a height of 2 600-2 900 m s l. Single specimens or small groups can be found. They are extant in almost inaccessible regions. Limiting factor: bad seed reproduction. Measures of protection: not protected.



105. КУРАМА ПАРРИЯСИ

Паррия кураминская / Parrya kuramensis Boetsch.

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шанда учрайдиган кам-ёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см гача етадиган по-ясиз, каудекс кўп бошчали, кўп йиллик ўсимлик. Барглари илдиз бўғзида тўп бўлиб ўрнашган, од-дий, кенг бандли, безчасимон қалин туклар билан қопланган, ўткир учли, япроқчалари йирик тиш-ли. Гулпояси тик, узунлиги 15–18 см, баргсиз, без-часимон тукли. Гуллари бинафша рангли. Қўзоғи узунчоқ, ясси, тик, туксиз, бўғим оралиқлари би-роз ингичкалашган. Уруғи эллипссимон, бир қатор ўрнашган. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Курама тизмасидаги Қамчиқ довоида тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2 200–2 300 м баландликда, сийрак арчазорлар орасида, шағалли тик ёнбағирларда ўсади. Очиқ, шимоли-шарқий ёнбағирлар уларнинг ўсиши учун қулай жой ҳисобланади.

Сони. Яқка-яқка ҳолда ёки 3–5 тупдан иборат ҳолда ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва аре-алнинг ўзгариш сабабла-ри. Қамчиқ довои атрофида моллар боқиладиган ерларда ўсганлиги туфайли оёқости бўлиб, камайиб кетган.

Маданийлаштирили-ши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Та-биатда ва маданий шароитда ўстириб, турнинг би-ологик хусусиятларини ўрганиш лозим.

Манбалар. [36, 159].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Редкий узколокальный эндемик За-падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее бесстебель-ное травянистое растение высотой до 25 см с много-

главым каудексом. Листья розеточные, простые, с густо железистым опушением, широкочерешковые, ланцетные, острые, по краю крупнопильчатые. Це-точные стебли высотой 15–18 см, прямостоячие, безлистные, с железистыми волосками. Цветки фи-олетовые. Стручки голые, линейные, плоские, вверх направленные, с перетяжками между семенами. Се-мена эллиптические, однорядные. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Ташкентской и Наманган-ской областях: Кураминский хребет – перевал Кам-чик.

Места обитания. Крутые щебнистые склоны на высоте 2 200–2 300 м, среди разреженных арчовни-ков; предпочитает открытые северо-восточные экс-позиции.

Численность. Малочислен, встречается еди-нично или небольшими (3–5 растений) группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Про-израстает вблизи перевала на трассе скотопргона, вы-таптывается и поедается скотом.

Культивирование. Све-дений нет.

Меры охраны. Не охра-няется.

Источники. [36, 159].

К.Ш. Тожибаев



Rare, endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Kurama range: the Kamchik pass (Tashkent and Namangan regions). Inhab-its steep slopes at an altitude of 2 200–2 300 m, among sparse juniper stands; prefers the open north-eastern ex-positions. Not numerous, solitary specimens or small (3–5 plants) groups can be found. Limiting factors: grows near the passage on the route of cattle road, trampled down and eaten by cattle. Measures of protection: not protected.



106. ЗАРАФШОН СОХТА КЛАУСИЯСИ

Ложноклаусия зеравшанская / *Pseudoclausia zerawschanica* (Regel et Schmalh.) Botsch.

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жануби-ғарбий минтақасига хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60–70 см га етадиган оддий, узун ҳамда безчасимон туклар билан қопланган бир ёки икки йиллик ўт. Якка пояли, тубидан шохланган. Барглари тўмтоқ, чузиқ, патсимон бўлакли. Гуллари оч бинафша рангли. Қўзоғи туксиз ёки тукли, етилганда тасбеҳсимон. Апрель–май ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Жиззах, Навоий ва Самарқанд вилоятлари: Нурота, Оқтоғ тизмаларида, Зирабулоқ тоғларида ҳамда Зарафшон дарёси водийсидаги паст тоғларда учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларида шағалли ва майда тупроқли жойларда, шувоқ, бута ва ярим буталар орасида ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда ёки 2–10 тадан тўп-тўп бўлиб учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг қўплаб боқилиши ва уруғининг яхши униб чиқмаслиги сабабли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат қўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [37, 159, 228].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик юго-западной части Узбекистана.

Краткое описание. Одно-двулетнее травянистое растение высотой до 60–70 см, опушенное простыми длинными волосками с примесью железистых. Стебель от основания разветвляется, одиночный. Листья тупые, продолговатые, перистолопастные. Цветки светло-фиолетовые. Стручки голые и опушенные, слабочетковидные. Цветёт и плодоносит в апреле–мае.

Распространение. В Джизакской, Навоийской и Самаркандской областях: хребты Нуратау, Актау, Зирабулакские горы, низкогорья в долине реки Зеравшан.

Места обитания. Щебнистые и мелкоземистые субстраты в нижнем и среднем поясах гор, среди полынных, кустарников и полукустарников.

Численность. Встречается единично и спорадически небольшими (от 2 до 10 растений) группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота и низкая семенная продуктивность.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [37, 159, 228].

К.Ш. Тожибаев



Rare endemic species of the south-western Uzbekistan. It is spread at the Nuratau, the Aktau ranges, the Zirabulak mountains, the low mountains in the Zerafshan river valley (Jizzakh, Navoi and Samarkand regions). Inhabits stony and fine earth substrates in the lower and middle belts of mountains, among sage brushes, shrubs and semishrubs. Single specimens and sporadically small (from 2 to 10 specimens) groups can be found. Limiting factors: overgrazing and low seed productivity. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



107. ЧИМЁН СОХТА КЛАУСИЯСИ

Ложноклаусия чимганская / Pseudoclausia tschimganica (Popov ex Botsch. et Wed.) A.V.Vassil.

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шанга мансуб жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–50 см, баъзан 100 см гача етадиган узун, оддий ва қисқа безчасимон туқлар билан қопланган икки йиллик ўсимлик. Пойси асосидан шохланган. Епирма барглари кўп, тескари наштарсимон, бандли. Гуллари қўнғир тусда, томирлари бинафша ранг, узунлиги 9–11 мм. Қўзоғи ясси, тасбеҳсимон кўринишда, понга ёпишган, узун тумшукчали. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Фақатгина Чотқол тизмасида тарқалган. Шунингдек, Қирғизистонда ҳам ўсади (Сандалош тизмаси).

Ўсиш шароити. Қояларда, тошли ва шағалли ёнбағирларда, дарё бўйларидаги тошлоқларда, зрийётган қор уюмлари атрофида ўсади.

Сони. Табиатда кам тарқалган. Яқка-яқка ҳолда ўсади.

Кўпайиши. Уругидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқ маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Аниқ маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Камайиб бориш сабаблари аниқланиши лозим. Ўсиш жойлари Угам-Чотқол миллий табиат боғининг ҳудудида жойлашган.

Манбалар. [37, 159, 228].



блю, с длинным носиком. Цветёт в июне-июле, плодоносит в августе.

Распространение. Ташкентская область: отмечен только на Чаткальском хребте. За пределами Узбекистана: Кыргызстан (Сандалашский хребет).

Места обитания. Скалы, каменистые склоны и осыпи, песчано-галечниковые берега ручьев, вблизи тающего снега.

Численность. Немногочислен. Встречается спорадически единичными растениями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Места произрастания находятся

на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [37, 159, 228].

К.Ш. Тожибаев

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range (Tashkent region). Inhabits rocks, stony slopes and mounds, sandy-pebble banks of streams, near melting snow. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Очень редкий узкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Двухлетнее растение высотой 30–50, реже до 100 см, с длинными простыми и короткими железистыми волосками. Стебель от основания ветвистый. Листья прикорневые, многочисленные, черешковые. Лепестки длиной 9–11 мм, коричневые, с фиолетовыми жилками. Стручки уплощенные, слабо-четковидные, прижаты к сте-



108. ЮРАКСИМОН ТОРОЛ

Клоповник почтисердцелистный / *Lepidium subcordatum* Botsch. et Vred.

Мақоми 2. Қизилқум ва Устюртда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см гача етадиган, поялари кўп бошчали, кўп йиллик ўт. Илдиз бўғизи тўкилиб кетган эски барг бандларининг пардали қолдиқлари билан ўралган. Поялари 2-3 та ва ундан ҳам кўпроқ, туксиз, шохланган. Барглари қалин тукли, поянинг асосида ўрнашганлари кўп, тескари тухумсимон, тўмтоқ, йирик тишли ёки патсимон бўлинган, бандига қараб ингичкалашиб боради. Гуллаган пайтида шингилли тигиз, мевадеш даврига бориб сийраклашади. Косача барглари юмалоқ, тўмтоқ, ташқи томони тукли. Тоғ-барглари оқ рангли. Меваси тухумсимон кўзоқ шаклида. Уруғи майда, кўнгир рангли. Апрель-май ойларида гуллаб, меваси май-июнда етилади.

Тарқалиши. Қарақалпоғистон, Навоий ва Бухоро вилоятлари: Қизилқумдаги қолдиқ тоғлар (Кулджуктоғ, Бўкантиғ ва Султонувайс)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғлардаги ола жинсли, шагалли ва қумли тупроқларда тарқалган.

Сони. Маълум эмас. Яқин-яқин ва 3-5 тупдан иборат тўплар ҳисил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик уруғлаган вақтда чорва молларининг қўлаб боқилиши унга айниқса юмддий шикаст етказди.

Маданийлаштирилиши. Чўл яйловлари унумдорлигини ошириш мақсадида кўп йиллик, сершира ем-хашак ўсимликлари етиштирилиши қўпайтириш УЭР ФА Қизилқумдаги тажриба станциясида экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [64, 159].

Ҳ.Ф. Шомуродов

Статус 2. Редкий эндемик останцов Кызылкума и Устюрта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение длиной до 40 см. Стебли формируются от многоглавой головки. Шейка корня покрыта пленчатыми остатками черешков отмерших листьев. Стебли от 2-3 до многочисленных, голые, разветвленные. Листья опушены густыми волосками, розеточные, многочисленные, обратноййцевидной формы, тупые, крупнозубчатые или перисто-раздельные, постепенно суженные в черешок. Кисти при цветках очень плотные, при плодах рыхлые. Чашелистики почти округлые, тупые, по спинке пушистые. Лепестки белые. Стручки яйце-

видные, семена коричневые, мелкие. Цветёт в конце апреля-мая, плодоносит в мае-июне.

Распространение. В Каракалпакстане, Навоийской и Бухарской областях: останцевые возвышенности Кызылкумов – Кулджуктау, Букантау и Султанаяйс.

Места обитания. На щебнистых и каменистых склонах, выходах пестроцветных пород, опесчаненных почвах по останцовым горкам.

Численность. Не установлена. Встречается одиночно и группами по 3-5 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сильно страдает от перевыпаса скота в период созревания семян.

Культивирование. Имеются опытные посевы на Кызылкумской пустынной станции АН РУз. Испытывается как сочный многолетний корм с целью фитомелиорации пустынных пастбищ.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [64, 159].

Ҳ.Ф. Шомуродов

Rare endemic species of the Kyzylkum and Ustyurt. It is spread at the Kyzylkum: the Kuldjuktau, the Bukantau and Sultan-Ulzdag relict mountains (Karakalpakstan, Navoi and Bukhara regions). Inhabits gravelly and stony slopes, outcrops of gypsaceous rocks, sandy soils on the hills. The quantity is unknown. Single specimens and groups of 3-5 specimens can be found. Limiting factors: suffers from overgrazing when seed maturing. Measures of protection: not protected.



109. ОЛЬГА ЛЕПИДИУМИ

Клоповник Ольга / *Lepidium olgae* (R.M. Vinogr.) Al-Shebbaz et Mumm.

Мақоми 2. Нурота тизмасининг камёб эндемик тури.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўт ўсимлик, илдизпояси тик, йўғонлашган. Пояси 30–70 см баландликда, туксиз, анча йўғон, юқори қисми шохланган. Барглари туксиз, кулранг, этли. Илдиз бўғзидаги барглари йирик, кенг тухумсимон ёки деярли юмалоқ, пластки қисми торайган, кенг қанотчали бандга эга. Поядаги барглари тухумсимон, бандсиз, секин - аста кичрайиб боради. Гуллари кўп гулли ўсимлиkning тепа қисмидаги шингилларда мураккаб рўвқ ҳосил қилиб ўрнашган. Гултожи оқ, узунлиги 8–9 мм. Косачабарглари 2 барабар узун. Қўзоқчаси очилмайдиган, тескари тухумсимон, узунлиги 16–20 мм, эни 8–10 мм, сал қабарикли, пишганлари осилиб туради, узун ва қайрилган мева-бандида ўрнашган. Апрель ва майнинг бошларида гуллаб, меваси май-июнда етилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Нурота тоғ тизмасининг марказий қисмида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тош-чағиртошли, тошли-майда чағиртошли тоғларнинг ўрта қисмидаги шимолий ва ғарбий ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам, тарқоқ ҳолда бир неча тупдан то ўнлаб ўсимликкача таркиб бўлган кичик-кичик популяциялар учрайди. Умумий сони 1 000 тупга яқин.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликларнинг кичик майдонларда ўсиши, шароитга унча мослашмаганлиги, маҳаллий аҳоли томонидан илдизпояларининг қавлаб олиниб, доривор маҳсулот сифатида ишлатилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота қўриқхонасида муҳофаз қилинади.

Манбалар. [64, 159, 289].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик хребта Нуратау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с утолщенным вертикальным корневищем. Стебли высотой 30–70 см, голые, донально толстые, в верхней половине разветвленные. Листья голые, сизоватые, мясистые. Цветки в многоцветковых верхушечных кистях, собранных в сложное метельчатое соцветие. Лепестки белые, 8–9 мм длиной, в два раза длиннее чашелистиков. Стручочки нераскрывающиеся, обратнойцевидные, 16–20 мм длиной и 8–10 мм шириной, слегка вздутые, зрелые повислые, на длинных отогнутых плодоножках. Цветёт в апреле – начале мая, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Жиззакская область: центральная часть хребта Нуратау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны нижнего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко, спорадически, небольшими популяциями от нескольких экземпляров до нескольких десятков. Общая численность составляет не более 1 000 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность вида к ограниченному местообитанию и заготовка корневищ местными жителями в качестве народного лекарственного средства.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нуратинского государственного заповедника.

Источники. [64, 159, 289].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the Nuratau range. It is spread at the central part of the Nuratau range (Jizzakh region). Inhabits stony slopes in the lower mountainous zone. About 1 thousand of specimens were revealed. Limiting factors: stenobiont rare species, roots collected by local population for medicinal purposes. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



110. ГОРДЯГИН КАТРОНИ

Катран Гордягина / *Scambe gordjaginitii* Spreygin et Popov

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50–70 см га етadиган, кўп пояли, поясининг асоси хурпайган, дағал тукли, кўп йиллик ўт. Поясининг остки қисмидаги барглари узун бандли, турли даражада ўйилган, тухумсимон ёки лирасимон, кичик бўлакларга ажралган. Тўпгуллари рўваксимон, узун шохчали. Гуллари тўқ сариқ рангли. Қўзоқчасининг юқори бўғими эллипссимон, силлиқ. Апрель ойида гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари; Ғузор, Тўдадашт, Гулчадашт атрофидаги тепаликларда тарқалган.

Ўсиш шароити. Эфемер, эфемерондлар орасида, шағалли ва гипсли қизил тупроқларда ўсади.

Сони. Ғузор атрофидаги тепаликларда бу турнинг мингга яқин туллари сақланиб қолган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тўғ этакларининг қишлоқ ҳўжалиғи учун ўзлаштирилиши ва чорва молларининг қўплаб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстириш учун қилинган ҳаракат натижасиз тугади.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [131, 336].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Очень редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 50–70 см. Стебли многочисленные, с торчащими жесткими волосками у основания. Нижние листья длинно-черешковые, неправильно-выемчатые, яйцевидные или ланцетные, с маленькими долями. Соцветие метельчатое, с длинными ветвями. Цветки ярко-желтые. Стручок эллипсоидальный, гладкий. Цветет в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: низкие холмы в окрестностях Гузара, Туда-Дашта, Гульча-Дашта.

Места обитания. Щебнистые холмы и выходы гипсоносных красных глин, среди эфемеров и эфемерондов.

Численность. Около 1 тысячи особей в окрестностях Гузара.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение зоны предгорий, интенсивный выпас скота.

Культивирование. Попытка выращивать в Ботаническом саду АН РУз оказалась неудачной.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [131, 336].

К.Ш. Тожибаев

Very rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the low hills nearby Guzar, Tuda-Dasht, Gulcha-Dasht (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits hills and outcrops of gypsymbearing red loams among ephemeroïd plants. About 1 000 specimens can be found in the surroundings of Guzar. Limiting factors: economic reclamation of foothills, intensive grazing. Measures of protection: not protected.



111. ВИНКЛЕР СПРИГИНИЯСИ

Спрыгиния Винклера / Spryginia winkleri (Regel) Popov

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик туксиз ўт. Пояси оддий, узунлиги 10–40 см. Барглари этли, бутун, бандли, чўзиқ-ланцетсимон, ўткир қирралли. Косачабарглари чўзиқ-чизикли, бинафшаранг, юқори четлари оқиб пардали, узунлиги 7–10 мм. Гулбарглари қирмизи-бинафша рангда бўлиб, косачабарглardan 2–2,5 марта узун, узун бандли. Мевабандининг узунлиги 5 мм. Қўзоқчалари чўзиқ, ясси, ўроқсимон эгилган, узунлиги 4–8 см, эни 2 мм, калта тумшукчаси томон ингичкалашган. Март–апрель ойида гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятида.

Ўсиш шароити. Кул ранг, бўз тупроқларда ўсади.

Сони. Оқтош атрофидаги тепаликларда бутурнинг 200 га яқин тупи сақланиб қолган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тоғ этакларининг қишлоқ хўжалиги учун ўзлаштирилиши ва чорва молларининг қўлаб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайд.

Манбалар. [38].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Очень редкий эндемик Юго-западного Памира-Алая.

Краткое описание. Однолетнее голое, зеленое растение. Стебель простой, длиной 10–40 см. Листья мясистые, цельные, черешковые, продолговато-ланцетные, острые. Чашелистики линейно-продолговатые, фиолетово-окрашенные, вверху по краю бело-перепончатые, длиной 7–10 мм. Лепестки пурпурно-фиолетовые, в 2–2,5 раза длиннее чашелистиков, длинноноготковые, на верхушке округлые. Плодоножки 5 мм длиной. Стручки линейные, четковидные, сплюснутые, серповидно отогнутые, длиной 4–8 см, шириной 2 мм, суженные в короткий носик. Цветёт в марте–апреле, плодоносит в мае.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.

Места обитания. Серые глины.

Численность. 200 растений в окрестностях кишлака Акташ.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение зоны предгорий, интенсивный выпас скота.

Культивирование. Нет информации.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [38].

К.Ш. Тожибаев



Very rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the low hills nearby Aktash (Surkhondarya region). Inhabits grey clays. 200 specimens nearby Aktash can be found. Limiting factors: destroying of habitats and overgrazing. Measures of protection: not protected.



113. ЕКАТЕРИНА КИРПИЎТИ

Акантолимон Екатерины / *Acantholimon ekatherinae* (B. Fedtsch.) Czerniak.

Мақоми 2. Чотқол тизмасига хос камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Ерга ёпишиб ўсадиган, диаметри 15–40 см орасидаги ёстиқсимон, шохчалари бироз қўтарилиб ўсувчи ярим бута. Барги ясси, наштартсимон ёки учли наштартсимон, узунлиги 2 см, эни 4 мм. Гуллояси 5–20 см, баргидан узун. Гуллари, 3–8 тадан сийрак жойлашиб, бошоқча ҳосил қилади. Косачаси пушти ёки қирмизи. Тож-барглари пушти рангли. Июль–сентябрь ойларида гуллаб, меваси сентябрь–октябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизмасининг Чимён тоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмидаги ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Инсон омили таъсирида ҳамда чорва молларининг қўлаб боқилиши туфайли пайҳон бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1962 йилдан бери муваффақиятли ўстирилмоқда. Экилганидан уч йил ўтиб, гуллайди, уруғ беради. Уруғидан униб чиқиши кузатилмаган. Нам шароитда яхши ўсади.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсиш жойлари Уғам-Чотқол миллий табиат боғининг ҳудудида жойлашган.

Манбалар. [11, 177, 178].

И.В. Белолипов

Статус 2. Редкий эндемик Чаткальского хребта.

Краткое описание. Подушковидный полукустарник с распростертыми и слегка поднимающимися ветвями 15–40 см в диаметре. Листья плоские, ланцетные или линейно-ланцетные, длиной до 2 см и шириной 4 мм. Цветоносы превышают листья, высотой 5–20 см. Цветки в редких 3–8-колосковых колосках. Чашечка розовая или пурпурная. Лепестки розовые. Цветёт в июле–сентябре, плодоносит в сентябре–октябре.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет – Большой Чимган.

Места обитания. Горные склоны субальпийского и альпийского поясов.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Антропогенное воздействие: вытаптывается человеком и скотом.

Культивирование. С 1962 года успешно выращивается в Ботаническом саду АН РУз. Цветёт и плодоносит на 3-м году жизни. Самосева не отмечено. Положительно реагирует на подпитывающий умеренный полив.

Меры охраны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [11, 177, 178].

И.В. Белолипов

Rare endemic species of the Chatkal range. It is spread at the Chatkal range; the Great Chimgan mt. (Tashkent region). Inhabits mountain slopes of the subalpine and alpine belts. The quantity is unknown. Limiting factors: anthropogenic press. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



114. МАРГАРИТА КИРПИЎТИ

Acantholimon margaritae Korovin et Lincz.

Мақоми 2. Курама тизмасига мансуб камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Диаметри 25–50 см орасидаги бута. Ер усти қисми ярим шарсимон ғовак ёстиқча ҳосил қилади. Барглари ишил, деярли текис, узун бигизсимон, узунлиги 2–4 см, эни 1–2 мм. Гулпоисининг узунлиги 10–15 см. Бошоқчаси якка-якка жойлашган гуллардан ташкил топган. Косачаси қирмизи, тожбарги пуштиранг. Июль–август ойларида гуллаб, меваси сентябрь–октябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Курама тизмасида Охангарон дарёсининг чап томонида тарқалган.



Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги арчазорларда, қояларда, тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Бутун ареали бўйлаб санокли даражада ўсади ва жуда кам учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиатда жуда кам тарқалган. Туллариининг ҳолати ва сони махсус ўрганилмаган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1963 йилдан бошлаб ўстириб келинмоқда. Экилгандан сўнг иккинчи йили гуллаб, уруғ берган, боғ шаронтида уруғидан қўпайиши кузатилмаган. Саккиз-тўққиз йилдан сўнг табиий қурий бошлаган ва 15-йилга келиб барчаси қуриб кетган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [11, 177, 178].

И.В. Белоліпов

Статус 2. Редкий эндемик Кураминского хребта.

Краткое описание. Кустарник, имеющий форму рыхлой полушаровидной подушки 25–50 см в диаметре. Листья зелёные, линейно-шиловидные, длиной 2–4 см, шириной 1–2 мм. Цветоносы длиной 10–15 см. Колоски в одноцветковых колосках. Чашечка пурпурная, лепестки розовые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в сентябре–октябре.

Распространение. Ташкентская область: Кураминский хребет – левобережье реки Ахангаран.

Места обитания. Каменистые склоны среднего пояса гор, скалы, среди арчовников.

Численность. В пределах ареала растёт единичными экземплярами и встречается крайне редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Встречаются малочисленные особи в нескольких популяциях. Их состояние и численность не исследовались.


Культивирование. С 1963 года успешно выращивается в Ботаническом саду АН РУз. Цветёт и плодоносит на 2-м году жизни. Самосева не наблюдалось. Естественное отмирание отмечено на 8–9 году выращивания, массовое – на 15-м.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [11, 177, 178].

И.В. Белоліпов

Rare endemic species of the Kurama range. It is spread at the Kurama range: the left bank of the Akhangaran river (Tashkent region). Inhabits stony slopes in the middle belt of mountains, rocks, among juniper stands. Solitary specimens can be found within the distribution area. Limiting factors; not numerous specimens in several populations. Their state and number were not investigated. Measures of protection; not protected.



115. НУРОТА КИРПИЎТИ

Акантолиммон нуратинский / *Acantholimon nuratavicum* Zakirov

Мақоми 2. Нурота тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Диаметри 20 см келадиган, яримшар шаклидаги поялари жуда тигиз ёстиқча ҳосил қилувчи ярим бута. Барглари қўқимтиряшил, уч қиррали, чўзиқ наشتарсимон ёки деярли бигизсимон, узунлиги 0,5–1 см, эни эса 0,5–1 мм, қисқа ва қалин туклар билан қопланган. Гулловси баргидан узунроқ, баландлиги 10–15 см. Гуллари бошқосимон тўпгул ҳосил қилади. Косачабарги қалин тукли, пушти рангли, тожбарги ҳам пушти рангли. Июль–августда гуллаб, меваси август–сентябрь ойларида етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги тошли ва шагалли қуруқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кам учрайди. Кичик популяциялар (20–30 тадан 100–200 тупгача) ҳосил қилади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиатан камёб эндемик тур. Чорва боқиладиган ерларда ўсанлиги туфайли оёқости бўлиб, камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат қўриқ-хонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [11, 177, 178, 208].

Н.Ю. Бешко

Статус 2. Редкий эндемик Нуратау.

Краткое описание. Полукустарник, образующий плотные, довольно высокие подушковидные подушки до 20 см в диаметре. Листья зеленовато-сизые, плоско-трёхгранные, узколинейно-ланцетные или почти шиловидные, длиной 0,5–1 см, шириной 0,5–1 мм, густо и очень короткоопушенные. Цветоносы значительно превы-

шают листья, высотой 10–15 см. Цветки в колосовидных соцветиях. Чашечка густоопушенная, розовая, лепестки розовые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Жиззакской, Самаркандской и Навоийской областях: хребет Нуратау.

Места обитания. Каменистые и щебнистые сухие склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается спорадически. Образует локальные популяции численностью от 20–30 до 100 и более растений. Общая площадь распространения около 10 тыс. га.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Естественно редкий, узкоэндемичный вид. Страдает от чрезмерного выпаса скота из-за вытаптывания.

Культикирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [11, 177, 178, 208].

Н.Ю. Бешко

Rare endemic species of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau range (Jizzakh, Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony dry slopes in the middle belts of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: endemic stenotopic species. Trampling down because of the overpasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



116. ДЕЯРЛИ СУЛИСИМОН КИРПИЎТ

Акантолимон почтниковский / *Acantholimon subaevasceum* Lincz.

Мақоми 2. Нурота тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Диаметри 30–40 см гача етадиган, яримшар шаклидаги тиканли ёстиқсимон ярим бута. Барглари яшил, ясси уч қиррали, энсиз қалами – бигизсимон, узунлиги 1,5–2,5 см, эни эса 1 мм га яқин, жуда қисқа тукли. Гулпоёси баргидан узун, бўйи 10–15 см, туксиз, оддий ёки камшоҳ. Гуллари сийрак бошоқсимон тўпгул ҳосил қилади. Бошоқчалар 1 гулли. Гулён-баргчали туксиз. Косачаси сийрак тукли, пушти рангли, қирмизи томирли, гултожи ҳам пушти рангли. Июлда гуллаб, меваси август–сентябрь ойларида етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота тизмасининг марказий қисмида тарқалган (Сентобсой, Устуксой).

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги тош-ли, қуруқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда кичик майдонда (тахминан 20–25 км²) тарқалган. Якка ҳолда, баъзан кичик тўп бўлиб учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлиكنинг умумий сони ва тўпларининг ҳолати махсус ўрганилмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Нурота қўриқхонасидаги химоя майдонида ўсади.

Манбалар. [11, 177, 178].

Н.Ю. Бешко

Причины изменения численности и ареала. Естественно редкий стенотопный вид. Угрозу представляет чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Произрастает в буферной зоне Нуратинского государственного заповедника.

Источники. [11, 177, 178].

Н.Ю. Бешко



Rare endemic species of the Nuratau ridge. It is spread at the central part of the Nuratau ridge: Sentaobsay, Ustusay (Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony dry slopes in the middle mountain belt. Single specimens or small populations occur sporadically. Distribution area is about 20–25 км². Limiting factors: overpasturing. Endemic stenotopic species. Measures of protection: grows in buffer zone of the Nuratau state reserve.

Статус 2. Редкий эндемик Нуратау.

Краткое описание. Колючий подушковидный полукустарник. Подушки довольно плотные, высокие, полушаровидные подушки до 30–40 см в диаметре. Листья ярко-зеленые, плоско-трёхгранные, узколинейно-шиловидные, длиной 1,5–2,5 см, шириной около 1 мм, очень коротко опушенные. Цветоносы голые, простые или в верхней половине коротко ветвистые, значительно превышают листья, высотой 10–15 см. Цветки в редких колосовидных соцветиях. Колоски 1-цветковые. Прицветники голые. Чашечка 10–11 мм длины, воронковидная, розовая, с темно-пурпурными жилками. Лепестки розовые. Цветёт в июле, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Самаркандской и Навоийской областях: центральная часть хребта Нуратау (Сентабсай, Устуксай).

Места обитания. Каменистые сухие склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается редко, спорадически, немногочисленными популяциями. Площадь распространения примерно 20–25 км².

Размножение. Семенное.



117. ТУХУМОЁҚ ИЛДИЗБОШ, ЦЕФАЛОРИЗУМ

Қорғоғлаз яйценогий / *Cephalorhizum oobotum* Popov et Korovin

Мақоми 2. Жанубий Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик, 40–60 см баландликдаги йўгон илдизли, тухумсимон каудексга ўтувчи ўсимлик. Барча барглари илдиз бўғзида жойлашган, бандли, серат, ромбсимон, узунлиги 5–15 см, эни 1,5–2,5 см. Гулбанди 2–4 та, тўғри, шохланган, тўлгули бир томонлама жойлашган 5–15 гулли. Косачаси қалин тукли, узунлиги 7–8,5 мм, найчаси ўтсимон, қобирғали, юпқа, кўжимтир, кейинроқ оқарувчи қайтариқли. Гултожи қизил-бинафша рангли.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Шерабод тепаликларида тарқалган. Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Ола жинсли паст тоғлардаги бўз тупроқларда ўсади.

Сони. 2009 йили 13 туп ўсимлик борлиги аниқланган.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ола жинсли ерларнинг қисқариши ва молларнинг боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [179, 180, 310].

Ф.У. Ҳасанов



Rare endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Kelif-Sherabad range (Surkhandarya region). Inhabits grey clays in variegated low mountains. 13 plants were registered in 2009. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.

Статус 2. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетник высотой 40–60 см, с толстым корнем, переходящим в яйцевидный каудекс. Листья все прикорневые, черешковые, мясистые, сизые, ромбические, длиной 5–15 см, шириной 1,5–2,5 см. Цветоносы в числе 2–4, прямые, ветвистые с односторонними 5–15-цветковыми соцветиями. Чашечка густо опушенная, длиной 7–8,5 мм, трубка ее травянистая, ребристая, с перепончатым с синевшим, позже белеющим отгибом. Лепестки красновато-фиолетовые. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Келиф-Шерабадская гряда. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Серые глины пестроцветных низкогорий.

Численность. В 2009 г. зарегистрировано 13 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение площади пестроцветов и вылас.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [179, 180, 310],
Ф.О. Хасанов



КЕЛИНСУПУРГИДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ТИМЕЛЕЕВЫЕ – TNYMELAEACEAE

118. АЛЬБЕРТ ҚИСРОНИ

Викстремия Альберта (рестелла Альберта) / *Wikstroemia alberti* (Regel) Domke
(= *Betulia albertii* (Regel) Pobed.)

Мақоми 3. Помир-Олой ва Ғарбий Тянь-Шань тоғларида учрайдиган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1,5 м га етадиган бута. Эскирган шохлари қўнғир, кулранг, ёш новдалари ётиқ тукли. Барглари наштарсимон, 1,5-3 см узунликда, эни эса 0,5-1,5 см, асоси понасимон, учи тўмтоқ, ҳар икки томони тукли, пастдагилари бандсиз. Гуллари 5-13 тадан соябонсимон бошча тўпгул ҳосил қилади. Гулбанди 1,5 см яшил, ётиқ тукли. Тоғбарглари сариқ. Ёнғоқ меваги, қуриган гулқўрғон бўлаклари билан ўралган. Июнь-июль ойида гуллаб, меваги июль-августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Наманган ва Сурхондарё вилоятлари: Ғарбий Тянь-Шань (Чотқол, Писком, Қурама тизмалари) ва Помир-Олойда (Ҳисор тизмасининг жанубий ёнбағри, Бойсун тоғлари)да тарқалган. Тожикистон ва Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Арчазорлар орасида, сернам ва юмшоқ тупроқларда ўсади.

Сони. Кам учрайди, кичик тўплар ҳосил қилади.

шириной 0,5-1,5 см, клиновидные при основании, тупые на вершине, с обеих сторон волосистые, короткочерешковые, нижние сидячие. Цветки по 5-13 в головчато-зонтиковидных соцветиях. Цветоносы длиной до 1,5 см, зелёные, прижатоспущенные. Венчик жёлтый. Плод-орешек заключённый в остающийся засохший околоцветник. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. В Ташкентской, Наманганской, Сурхандарьинской областях: Западный Тянь-Шань (Пскемский, Чаткальский, Кураминский хребты); Памиро-Алай (южный склон Гиссарского хребта, Байсунские горы). За пределами Узбекистана: Таджикистан, Кыргызстан.

Места обитания. Мягкие увлажнённые субстраты, в арчовниках.

Численность. Встречается редко, небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском биосферном заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [205, 239].

Р.И. Казакбаев

Rare species of the western Tien-Shan and Pamir-Alay. It is spread at the western Tien-Shan: the Pskem, the Chatkal, the Kurama ranges; the Pamir-Alay: the southern slopes of Hissar range, the Baysun mountains (Tashkent, Namangan, Surkhondarya regions). Inhabits soft wet substrates, in the juniper stands. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.



Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол давлат биосфера қўриқхонаси ва Угам-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [205, 239].

Р.И. Қозоқбоев

Статус 3. Редкий вид Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Кустарник высотой до 1,5 м. Старые побеги буро-серые, молодые прижатоспущенные. Листья ланцетные, длиной 1,5-3 см и

КОВУЛДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО КАПЕРЦЕВЫЕ –
CAPPARACEAE

119. РОЗАНОВ КОВУЛИ

Каперцы Розанова / *Capparis rosanowiana* B. Fedtsch.

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м га етадиган серпоя ва сертикан қўп йиллик ўт. Пояси ер бағирлаб ўсади. Барглари чўзқ, наштарсимон. Гуллари барг қўлтигида биттадан ўрнашган, тўғри, сариқ рангли, қўп чангчили. Меваси қўсақдай, наштарсимон, узунлиги 30 см га етади, қўнғир рангли, қўндаланг томирли. Май-июнь ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: фақат Боботоғда ўсади. Асосан, Жанубий Тожикистонда тарқалган. Мавжуд гербарийларга қараганда, бу тур илгари Оқтоғ ва Хўжақозиёнда ҳам ўсган.

Ўсиш шароити. Очилиб қолган ола жинсларда, баъзан оҳақтошларда ва нураган қум тошларда ўсади.

Сони. Табиатда онда-сонда якка-якка ҳолда учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу турнинг камайишига у ўсадиган ерларнинг ҳар хил мақсадлар учун ўзлаштирилиши сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстириш учун қилинган ҳаракат натижа бермаган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [159, 262].

Т.Т. Раҳимова

Численность. Встречается спорадически, одиночными растениями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение территорий под сельскохозяйству.

Культивирование. Попытки вырастить в Ботаническом саду АН РУз оказались неудачными.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 262].

Т.Т. Раҳимова

Rare endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Babatag range (Surkhandarya region). Inhabits the outcrops of variegated beds and gypsaceous slopes. The quantity is unknown. Limiting factors: reclamation of area under crops. Measures of protection: not protected.



Статус 1. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с многочисленными простертыми, колючими побегами длиной до 1 м. Листья продолговато-ланцетные. Цветки в пазухах листьев одиночные, правильные, жёлтые, многотычиночные. Плод – коробочка, ланцетной формы, длиной до 30 см, бурый, с продольными жилками. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: встречается только в горах Бабатаг. Основная часть ареала находится в Южном Таджикистане. Сборы свидетельствуют о том, что этот вид раньше произрастал также на Актау и Ходжа-Казиианне.

Места обитания. Обнажения пестроцветных толщ, изредка известняки и разрушенные песчанники.



120. ГОРДЯГИН КЛЕОМАСИ

Клеоме Гордягина / *Cleome gordjagini* Popov

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойнинг ўта камёб, реликт ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Поилари 50–120 см баландликдаги, сарғиш момик тукли бир йиллик ўт ўсимлик. Барглари тухумсимон, момик тукли, узунлиги 4–5 мм, эни 3–3,5 мм. Косачабарглари ланцетсимон, 3 таси бир хил, 4-си йирикрок, 7 мм гача. Чангчилари 6 та. Қўсаги 25–50 мм узунликда, эни 1,5–2 мм, ўткир бурунчали, безли туклари бор. Августда гуллаб, сентябрда мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё: Келиф-Шеробод тепаликлари. Ўзбекистондан ташқарида: Туркменистон (Копетдоғ).

Ўсиш шароити. Гипсли ёнбағирликлар.

Сони. 2009 йилда 20 тупи топилган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг қўп боқилиши, турнинг реликтлиги ва ола жинсли майдонларнинг қисқариб бориши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [262, 310].

Т.Т. Раҳимова

мм. Тычинок 6. Коробочка длиной 25–50 мм, шириной 1,5–2 мм, железистая, с острым носиком. Цветет в августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: Келиф-Шерабадская гряда. За пределами Узбекистана: Туркменистан (Копетдаг).

Места обитания. Гипсированные склоны.

Численность. В 2009 г. зарегистрировано 20 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота, реликтовость вида и сокращение пестроцветов.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [262, 310].

Т.Т. Раҳимова

Rarest relict endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Kelif-Sherabad range (Surkhandarya region). Inhabits the gypseous slopes. 20 plants were found in 2009. Limiting factors: relict species, decreasing of the gypseous habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



Статус 1. Редчайший реликтовый вид Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Однолетник с желтоватыми, войлочно-опушенными стеблями, высотой 50–120 см. Листья яйцевидные, войлочно-опушенные, длиной 4–5 см. Чашелистики ланцетные, 3 из них одинаковые, 4-й крупнее, до 7 мм длиной. Лепестки желтые, длиной 6–8 мм, шириной 3–3,5



ДОЛАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ЛИЛЕЙНЫЕ – LILIACEAE

121. ЛЮДМИЛА БОЙЧЕЧАГИ

Гусиный лук Людмилы / *Gagea ludmilae* Levichev

Мақоми 1. Чотқол тизмасидаги кичик майдонларда тарқалган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик пиёзли ўсимлик. Пиёзининг диаметри 6–8 мм, ёш пиёзчаларидан 4–6 та, узунлиги 1–5 см келадиган, учида биттадан пиёзчалар ўрнашган поячалар ўсиб чиқади. Илдизолди барги новсимон, учи ўткирлашган. Поядаги барглари тўпгулнинг пастки қисмида ҳалқа ҳосил қилиб жойлашган. Гулқўрғонининг узунлиги 10–15 мм. Уруғи ясси. Апрельда гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: фақат бир жой (Паркент шаҳрининг жануби-шарқий қисми)да ўсиши маълум.

Ўсиш шароити. Соз тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кичик майдонда тарқалган. Ёш ниҳоллар ҳисобига кўпдек туюлади. Гуллаб турган туплари ниҳоятда сийрак.

Кўпайиши. Асосан, вегетатив равишда кўпаяди, уруғидан кўпайиши кам кузатилади.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари.

Бу тур ўсиб турган ерлар (ади)да узлуксиз равишда деҳқончилик қилиниши ва чорва молларининг боқилиши оқибатида камайиб бормоқда. У, асосан, вегетатив усул билан кўпайиши ҳисобига сақланиб қолмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Унинг тарқалишини ва экма шароитда биологик хусусиятларини ўрганиш зарур.

Манбалар. [160].

И.Г. Левичев

Статус 1. Редкий, узкий эндемик Чаткальского хребта.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение. Луковица 6–8 мм в диаметре, у ювенильных особей от луковицы отходят 4–6 стволов длиной 1–5 см с одиночными вегетативными луковичками на конце. Прикорневой лист желобчато-угловатый, постепенно заостренный. Стеблевые листья собраны в мутовку у основания соцветия. Листочки околоцветника длиной 10–15 мм. Семена плоские. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Ташкентская область; отмечен в 1 точке к юго-востоку от города Паркента.

Места обитания. Глинистые травянистые склоны.

Численность. Встречается на небольшом участке, где довольно обилён за счёт множества ювенильных особей; генеративные растения очень редки.

Размножение. В основном – вегетативное, в меньшей степени – семенное.

Причины изменения численности и ареала. Произрастает в интенсивно эксплуатируемой адырной зоне (богарное земледелие и выпас). Сильно стравливается скотом. Только высокая эффективность вегетативного размножения спасает вид от уничтожения.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Необходимы уточнение распространения и изучение биологических особенностей в культуре.

Источники. [160].

И.Г. Левичев

Rare, endemic species of the Chatkal range. It is spread at the 1 point to the south-east from town Parkent (Tashkent region). Inhabits clayish grassy slopes. Grows on a small area. Limiting factors: grows in the intensively used foothill zone

rainfed crops and pastures. Damage caused by pasturing cattle. Measures of protection: not protected.



122. ХОЛМОН ИСИРҒАГУЛИ

Рибчик Эдуарда / *Fritillaria eduardii* Regel

Мақоми 1. Ўзбекистонда камайиб бораётган ва ареали ажралган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Пояси баргли, 40–80, баъзан 150 см га етадиган пиёзли, кўп йиллик ўт. Барглари ялтироқ, яшил, пастки барглари кенг чўзиқ, баъзан поёда халқа ҳосил қилиб жойлашади. Поянинг энг юқори қисмидагилари наштарсимон, халқа шаклида ўришган. Гуллари қўнғироқсимон, пастга қараб осилиб туради, қизғиш, қирмизин-қўнғир рангли, 2–8 тадан бўлиб, соябонсимон тўпгул ҳосил қилади. Меваси юқорига қараб тик турувчи, қисқа бандли, эни 4–5 см, энсиз қанотчали кутичага ўхшайди. Апрельда гуллаб, меваси май ойида етилади. Ажойиб, хушманзара ўсимлик,

халқ томонидан териб олинади, пиёзлари эса қазиб олиниб, истеъмол қилинади. Шу сабабли, кескин камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маданийлаштирилган. Қўплаб ботаника боғларида, жумладан, ЎзР ФА Ботаника боғида 1955 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. У кенг тарқалган жойларда буюртмаҳоналар ташкил этиш зарур. Манзарали боғдорчилик ҳужалкларида қўплаб экиб ўстирилиши лозим.

Манбалар. [187].

А.Х. Шарипов



Статус 1. Редкий в Узбекистане вид с разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение с облиственным стеблем высотой обычно 40–80 см, реже 150 см. Листья зеленые, блестящие; самые нижние иногда почти мутовчатые, широко-продолговатые; самые верхние мутовчатые, ланцетные. Цветки колокольчатые, поникшие, кирпично- или пурпурно-коричневые, собраны по 2–8 в зонтичковидное соцветие. Плод – вверх торчащая коробочка на короткой ножке, шириной 4–5 см, с узкими крыльями. Цветет в апреле, плодоносит в мае. Весьма декоративен.

Распространение. В Сурхандарьинской и Ферганской областях: хребты Бабатаг, Гиссарский, Алайский; долина реки Сох. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Среди кустарников под деревьями. Реже на каменистых, сырых россыпях известняка в среднем поясе гор, на высоте до 2 100 м.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор растений на букеты и заготовка населением луковиц для употребления в пищу.

Культивирование. Введен в культуру. Интродуцирован многими ботаническими садами. С 1955 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходимы организация заказников в местах массового распространения, массовое размножение в хозяйствах декоративного садоводства.

Источники. [187].

А.Х. Шарипов

Тарқалиши. Сурхондарё, Фарғона вилоятлари Боботог, Ҳисор, Олой (Сўх дарёсининг ҳавзаси) тизмаларида тарқалган. Тожикистонда, Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2 100 м баландликда дарахт ва буталар орасида, баъзан сернам тошли ҳамда оқактошли сурилмаларда ўсади.

Сони. Ўзбекистонда жуда кам учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари гоят чиройли, гуллаган пайтида маҳаллий



Rare endemic species of Uzbekistan with the disjunctive area. It is spread at the Babatag, the Hissar, the Alay ranges; the Sokh river valley (Surkhandarya and Fergana regions). Grows under shrubs and trees, woodlands rarely on the wet chalkstone fields in the middle belt of mountains, up to 2 100 m.s.l. The quantity is unknown. Limiting factors: picking of flowers and collecting of bulbs used in food. Measures of protection: it is necessary to create state reserves in places of mass distribution, mass reproduction in ornamental gardening.

123. ВВЕДЕНСКИЙ ЛОЛАСИ

Тюльпан Введенского / *Tulipa vvedenskyi* Botschantz.

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Тянь-Шанда ўсувчи кам-еб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–35 см га етадиган қўп йиллик, пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 2–3 см, тўқ-қўнгир рангли, қобиғи қоғозсимон. Барглари 3–4 та, эгри-бугри. Гуллари биттадан, қизил рангли. Гулининг туби сариқ, чапчи иплари сариқ ёки қўнгир, чапдонлари сариқ ёки қорамтир-бинафша рангли. Апрель-май ойларида гуллаб, июнь-июлда меvasи етилади.

Тарқалиши. Курама ва Чотқол тизмаларида, асосан, Ахангарон дарёси водийсида ўсади (Тошкент, Наманган вилоятлари).

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1 600–2 000 м баландликда тўб жинсларда, шўғалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда кичик гуруҳлар ҳосил қилган ҳолда тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан ва пиёзи орқали қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гул ва пиёзлари қўплаб йиғиб олиниши ҳамда чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1956 йилдан буён экиб келинади.

Муҳофаза чоралари. Айрим популяциялари Чотқол давлат биосфера қўриқхонаси ва Уғам-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади. Табиатда ўсиб турган тулпарини назорат остига олиш лозим.

Манбалар. [50, 60, 288, 291, 338].

К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 20–35 см. Луковичка яйцевидная, 2–3 см в диаметре, с темно-коричневыми бумагообразными чешуями. Листья в числе 3–4, зеленоватые, волнистые. Цветок одиночный, красный. Центр цветка желтый; тычиночные нити желтые или коричневые, пыльники желтые или черно-фиолетовые. Цветёт в апреле-мае, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Кураминский и Чаткальский хребты, главным образом, бассейн реки Ахангарон (в Ташкентской и Наманганской областях).

Места обитания. Выходы коренных пород и мало-мощные щебнистые почвы в среднем поясе гор, на высоте 1 600–2 000 м над уровнем моря.

Численность. Встречается спорадически, в виде небольших популяций.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветков и луковиц, выпас скота.



Культивирование. С 1956 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Некоторые популяции охраняются на территории Чаткальского биосферного заповедника и Угам-Чаткальского национального парка. Необходим контроль за численностью.

Источники. [50, 60, 288, 291, 338].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Kurama and Chatkal ranges, mainly in the Akhangaran river basin (Tashkent and Namangan regions). Inhabits outcrops of bed rocks and weak soils in the middle belt of mountains, at a height of 1 600–2 000 m. Single specimens and small populations occur sporadically. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.



124. МИХЕЛ ЛОЛАСИ, ДИЛБАНД ЛОЛА

Тюльпан Михелси / *Tulipa michelliana* T.M. Hoog

Мақоми 3. Ғарбий Помир-Олойга ҳос камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–30 см оралиғидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, қорақўнғир чармсимон қобилининг ички томони ётиқ туклар билан қопланган. Барглари 3–4 та. Йўл-йўл бинафша доғли. Гули яқка, йирик, диаметри 10 см гача бўлиб, қизил рангдан тўқ пушти ранггача. Ўзига ҳос қадаҳсимон шаклда. Гулининг туби қора, сариқ гардишли, баъзан гардишсиз. Чангчи иллари қора, чангдонлари бинафша рангли, баъзан сариқ. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Нурота тоғлари, Писталитог, Молгузар, Зарафшон, Қўхитанг, Ҳисор тизмаларида тарқалган (Жиззах, Навоий, Самарканд, Қашқадарё, Сурхондарё вилоятлари). Тожикистон ва Туркменистонда ҳам тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғолди текисликлари ва адирлардаги тошли ва саз тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кам, яқка ҳолда ва кичик туплар ҳолида учрайди. Бир гектар майдонда туплар сони бир нечадан 100–200 донагача етади.

Қўпайиши. Уруғидан ва пиёздан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқилиши ва ўсимлик гулининг териб олинishi сабабли камаймоқда.



Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника ботида 1956 йилдан бўён ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Нурота ва Сурхон давлат қўриқхоналарида муҳофиза қилинади. Табиатда ўсиб турган жойлари қатъий назорат остига олинishi лозим.

Манбалар. [50, 60, 291, 339, 357].

А.Х. Шарипов

Статус 3. Редкий вид Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 20–30 см. Луковица яйцевидная с кожистыми, чёрно-бурыми, с внутренней поверхности прижатоволосистыми покровными чешуями. Листья в количестве 3–4, сизые, с полосатыми жёлто-фиолетовыми пятнами. Цветок одиночный, от ярко-

красного до тёмно-малинового, очень крупный, до 10 см в диаметре, оригинальной бокаловидной формы. Центр цветка чёрный с жёлтым окаймлением, иногда без него. Тычиночные нити чёрные, пыльники фиолетовые, изредка жёлтые. Цветёт в марте–апреле, плод приносит в мае–июне.

Распространение. Нуратинские горы; хребты Писталитау, Мальгузар, Зеравшанский хребет; Қўхитанг, Ҳиссарский (Джизакская, Самаркандская, Навоийская, Қашқадарьинская, Сурхандарьинская области). За пределами Узбекистана: Таджикистан, Туркменистан.

Места обитания. Подгорные равнины, каменистые и глинистые склоны предгорий и нижнего пояса гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими популяциями. Обилие от нескольких растений до 100–200 на 1 гектар.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов, выпас скота.

Культивирование. С 1956 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском и Сурхонском заповедниках. Необходим строгий контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291, 339, 357].

А.Х. Шарипов

Rare species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Nuratau mountains, the Pisticaltau, the Malguzar, the Zerafshan, the Hissar, the Kughitang ranges (Jizzakh, Samarkand, Navoi, Kashkadarya, Surkhandarya regions). Inhabits stony and clayish slopes of the submontane zone and lower belt of mountains. Single specimens and small populations can be found. Limiting factors: picking of flowers, pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau and Surkhan state nature reserves. Monitoring of populations is necessary.



125. ФАРҒОНА ЛОЛАСИ, ЖАВҒАЗА ЛОЛА

Тюльпан ферганский / Tulipa ferganica Vved.

Мақоми 2. Фарғона водийсининг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–40 см га етадиган қўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, қобиғи қорамтир-қўнғир, қаттиқ-чармсмон, ички томонининг юқори қисми ва асоси ётиқ тукли. Барглари тукли, юқори қисмидагилари эгри-бугри. Гули якка, сариқ, ташқи томони қўқимтир-пушти рангли, гул туби сап-сарик, Чангчи иплари қизғиш-сарик, чангдонни қизғиш рангли. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Чотқол, Фарғона, Олой тизмаларининг пастки қисмида тарқалган (Фарғона, Наманган ва Андижон вилоятлари). Қирғизистонда ҳам учрайди.



Ўсиш шароити. Адир ва тоғлардаги тошли ва майда зарра тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка ҳолда тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гул ва пиёзлари йиғиб олинishi ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб бормокда. Илгари Фарғона шаҳри атрофларида ўсганлиги маълум.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1957 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди. Табиатда ўсиб турган туллариини қатъий назорат остига олиш лозим.

Манбалар. [50, 60, 291, 292, 340].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–50 см. Луковица яйцевидная, с черно-коричневыми, крепкими, кожистыми,

с внутренней стороны у вершины и при основании прижатоволосистыми покровными чешуями. Листья сизые, пушистые, верхние – курчавые. Цветки в числе 1–3, жёлтые, снаружи сизовато-розоватые, центр ярко-жёлтый. Тычиночные нити оранжево-жёлтые, пыльники оранжевые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Чаткальский, Ферганский и Алайский хребты (Наманганская, Андижанская и Ферганская области).

Места обитания. Каменистые и мелкоземистые склоны, от предгорий до среднего пояса гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов и луковиц, выпас скота. Ранее растение произрастало в окрестностях г. Ферганы.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз с 1957 года.

Меры охраны. Не охраняется. Необходим строгий контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291, 292, 340].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the Chatkal, Ferghana and Alay ranges (Namangan, Andijan and Fergana regions). Inhabits stony and fine earth slopes, from foothills to the middle belt of mountains. Single specimens can be found. Limiting factors: picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: not protected. Monitoring of populations is necessary.



126. ЛЕМАН ЛОЛАСИ, ЖОВҚОСИН ЛОЛА

Тюльпан Леманна / *Tulipa lehmanniana* Mercklin ex Bunge

Мақоми 3. Ўзбекистондаги камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–25 см орасидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 1,5–4 см. Қобиғи чармсимон, қорақўнғир, ер юзасигача давом этади. Барглари 3–4 та, эгри-бугри. Гули якка, сариқ, тўқ сариқ ёки қизил, туби қора, жигарранг доғли. Чангчи иплари, чангдонлари сариқ. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Бухоро, Навоий вилоятлари; Нурота тоғларининг тоғолди текисликлари; Қизилқумда: Конимех чўлида, Қулжуктоғ, Букантоғ, Оқтоғ, Томди ва Дарвоза қолдиқ тоғларида. Жануби-шарқий Қизилқумда тарқалган. Қозоғистон, Туркменистон, Тожикистон, Афғонистон, Покистон ҳамда Эронда учрайди.

Ўсиш шароити. Қумли чўлларда, қолдиқ тоғларда, қумли, тош-шағалли ёнбагирларда, ола жинслари ер юзасига чиқиб қолган жойларда ўсади.

Сони. 2014 йилда Қизилқум ҳудудидида қайд этилган 8 та популяциясида 4000 туп атрофида борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари териб олинishi ва чорва молларининг боқилиши сабабли қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1956 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди. Ўсиб турган жойлари назорат қилинмоғи лозим.

Манбалар. [50, 60, 291, 357].

К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Редкий вид в Узбекистане.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 15–25 см. Луковица яйцевидная, 1,5–4 см в диаметре, с крепкими, кожистыми, черно-бурыми, до поверхности земли продолженными покровными чешуями. Листья в количестве 3–4, курчавые. Цветок одиночный, желтый, оранжевый или красный, с черно-коричневым пятном в центре. Тычиночные нити и пыльники желтые. Цветёт в марте–апреле, плодоносит в мае–июне.



Распространение. В Джизакской, Бухарской, Навоийской областях: подгорная равнина Нуратинских гор; Кызылкум: Канимекхуль, горы Дарбаза, Тамдытау, Актау, Кульджуктау, Букантау, Юго-восточный Кызылкум. За пределами Узбекистана: Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Иран.

Места обитания. Опесчаненные каменисто-щебнистые склоны и выходы пестроцветных пород в останцовых низкогорьях, песчаные и супесчаные равнины.

Численность. В 2014 г. в Кызылкуме отмечено около 4 000 растений в 8 популяциях.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и выпас скота.

Культивирование. С 1956 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291, 357].

К.Ш. Тожибаев

Nuratau mountains, the Kyzylkum: the Kanimekhchul, the Darbaza, the Tamdytau, the Aktau, the Bukantau, the Kuldjuktai relict mountains (Jizzakh, Navoi and Bukhara regions). Inhabits sandy stony slopes and gypseous rocks in remnant hills, sand and sandy-loam deserts. Single specimens and small populations can be found. Reasons of decreasing: mass picking of flowers and pasturing. Measures of protection. Do not protected. Monitoring of populations is required.



Very rare species of Uzbekistan with the reducing area. It is spread at the piedmont plains of the



127. КОРОЛЬКОВ ЛОЛАСИ

Тюльпан Королькова / *Tulipa koroikowii* Regel

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Тянь-Шань ва Помир-Олойдаги ареали ажралган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–20 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 2,5 см. қобиги ички томонининг юқори қисми сертук. Барглари 3 та, эгри-бугри. Гули якка, қизил, туби қора. Чангчи ипларининг ластки қисми қора, юқори қисми эса қизил. Баъзан чангчи иплари қора ёки қизил. Чангдони сариқ. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Жиззах, Самарқанд, Навоий, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Курама тизмасида (Абжассой, Кендирдовон), Нурота тоғлари, Писталитог, Қўхитанг, Бойсун, Боботоғда, Туркистон, Молғузар, Зарафшон, Ҳисор тизмаларида тарқалган. Қозоғистон ва Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Қум-шағалли ҳамда тошли ёнбағирларда ва ола жинсли ерларда ўсади.

Сони. Табиатда тўп-тўп бўлиб ва якка-якка ҳолда тарқалган.

Қўпайиши. Уругидан ва пиёзидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари узиб ва пиёзлари қазиб оlinиши ҳамда чорва молларининг боқилиши сабабли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1956 йилдан буён экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Нурота, Зомни, Китоб, Ҳисор, Сурхон давлат қўриқхоналарида ва Зомни миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [50, 60, 291, 341, 357].

А.Х. Шарипов



Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая с разрозненным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–20 см. Луковица яйцевидная, до 2,5 см в диаметре, с внутренней стороны у верхушки с волосисто-шерстистыми покровными чешуями. Листья в количестве 3, очень курчавые. Цветок одиночный, красный, центр цветка черный. Тычиночные нити внизу черные, сверху ярко-красные, иногда все тычиночные нити целиком черные или красные. Пыльники желтые. Цветёт в марте–апреле, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Ташкентской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Кураминский хребет (Абжиссай, Кендырдаван), Нуратинские горы, хребты Писталитау, Байсунтау, Бабатаг, Кугитанг, Туркестанский, Зеравшанский, Гиссарский. За пределами Узбекистана: Казахстан и Таджикистан.

Места обитания. Щелнистые, каменные склоны и выходы пестроцветов.

Численность. Встречается немногочисленными популяциями и единичными растениями.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и луковиц, выпас.

Культивирование. С 1956 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском, Зааминском, Китабском, Гиссарском и Сурханском заповедниках, Зааминском национальном парке.

Источники. [50, 60, 291, 341, 357].

А.Х. Шарипов

Rare endemic species of the south-western Tien-Shan and Pamir-Alay with the disjunctive area. It is spread at the south-western Tien-Shan: Kurama range, the Pamir-Alay: the Nuratau, the Baysuntau and Babatag mountains, the Pistahtau, the Malguzar, the Turkestan, the Zeravshan, the Kughitang and Hissar ranges (Tashkent, Jizzakh, Samarkand, Navoi, Kashkadarya and Surkhandaarya regions). Inhabits stony slopes and outcrops of gypsaceous rocks. Not numerous populations, single specimens can be found. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: protected in the Zaamin, the Nuratau, the Kitab, the Hissar and Surkhan state reserves and the Zaamin national park. It is necessary to control number and to extend area of this cultivation.



128. КАРДОШ ЛОЛА, НУРОТА ЛОЛАСИ

Тюльпан родственный / *Tulipa affinis* Botschantz.

Мақоми 3. Ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–25 см оралигидаги қўл йиллик пиёзли ўт. Пиёзи чузиқ-тухумсимон, диаметри 2–4 см. Қобини қоғозсимон, узун, тўқ қўнгир рангли. Барглари 3 тагача, қўқимтир, сал эгри-бугри. Гули яқка, қизил, туби қора, оч сарик хошияли. Чангчиларининг ипи қора, чангдонлар билан бириккан жойи оқ. Чангдонлари қора би-нафша ранг. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Туркистон ва Молғузар тизмалари, Нурота тоғларида тарқалган. Қирғизистон ва Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шаронти. Майда зарра тупроқли, шағалли ва тошли ёнбағирларда, дараларда ва қояларнинг ёриқларида, бутазор ва арчазорлар орасида, тоғларнинг пастки ва ўрта қисмида ўсади.

Сони. Яқка-яқка ҳолда ва тўп-тўп бўлиб тарқалган. Баъзан бир неча юзлаб ўсимликдан иборат популяциялар ҳосил қилади.

Қўпайиши. Уругидан ва пиёзидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари қўплаб терилиши ва чорва моллари боқилиши ареалининг қисқариб кетишига олиб келган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1957 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Зомин ва Нурота қўриқхоналарида ҳамда Зомин миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [50, 60, 291, 357].

К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 15–25 см. Луковица продолговато-яйцевидная, 2–4 см в диаметре, с бумагообразными темно-коричневыми длинными чешуйками. Листья (3) сизые, слабоволнистые. Цветок одиночный, красный, центр цветка чёрный с ярко-жёлтым окаймлением. Тычиночные нити чёрные, в местах соединения с пыльниками белые. Пыльники черно-лиловые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Жиззакской, Самаркандской и Навоийской областях: хребты Туркестанский, Мальгузар; Нуратинские горы. За пределами Узбекистана: Кыргызстан и Таджикистан.

Места обитания. Произрастает на каменистых, щебнистых и мелкоземистых склонах нижнего и среднего пояса гор, в ущельях, на скальных карнизах, среди кустарников и арчовников.

Численность. Встречается единично или небольшими группами, иногда образует популяции по несколько сотен растений.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов, выпас скота.

Культивирование. С 1957 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Зааминском и Нуратинском заповедниках, Зааминском национальном парке.

Источники. [50, 60, 291, 357].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Turkestan and Malguzar ranges; the Nuratau mountains (Jizzakh, Samarkand and Navoi regions). Inhabits fine earth, gravelly and stony slopes, rock ledges, among shrubs and the juniper stands, in the lower and middle mountain belts. Single specimens and small populations can be found. Limiting factors: mass picking of flowers, pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau and Zaamin nature reserves, the Zaamin national park. It is necessary to control the state of populations and pasturing.



129. ФОСТЕР ДОЛАСИ

Тюльпан Фостера / *Tulipa fosteriana* Irving

Мақоми 2. Ғарбий Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10-50 см га етадиган кўп йиллик, пиёали ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 2-6 см, қобиги қорамтир-қўнғир, чармсимон, ички томони қалин, тўғри, қаттиқ, тилларанг туклар билан қопланган. Барглари 3-5 та, бироз эгри-бугри, қўқимтир ёки яшил рангли. Гуллари алтирок, қизил, якка, йирик, диаметри 10-12 см, туби қора, сариқ хошияли ёки сариқ. Чангчи иплари тўқ қизил ёки сариқ. Чангдони қорамтир-бинафша рангли. Апрель-май ойларида гуллаб, меваси июнь-июлда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмасидаги Омонқўтон ўрмон ҳўжалигида, Тахтақорача довоида, Ургут, Оталиқ қишлоқлари атрофларида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Усиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги майин тупроқли ёнбағирларда ва қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари ва пиёзларининг кўп миқдорда йиғиб олинishi ҳамда чорва молларининг боқилиши оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1957 йилдан буён ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Китоб давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади. Табиатда ўсиб турган тупларини назорат остига олиш лозим.

Манбалар. [50, 60, 291].

А.Х. Шарипов

Статус 2. Очень узкий редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10-50 см. Луковица яйцевидная, 2-6 см в диаметре. Покровные чешуи черно-бурые, кожистые, внутри покрыты густыми, прямыми, жесткими, золотистыми волосками. Листья (3-5) слабокурчавые, сизые или блестящие, зелёные. Цветок блестящий, красный, одиночный, очень крупный, 10-12 см в диаметре, центр цветка чёрный с жёлтым окаймлением или сплошь жёлтый. Тычиночные нити тёмно-красные или жёлтые. Пыльники черно-фиолетовые. Цветёт в апреле-мае, плодоносит в июне-июле.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях Зеравшанский хребет – Аманкутанское лесничество, перевалы Тахта-Карача, Ургут, Агалык. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны и карнизы скал в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и луковиц, выпас скота.

Культивирование. С 1957 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Китабского заповедника. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291].

А.Х. Шарипов



Very rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Zerafshan range; the forestry of Amankutan, the Takhta-Karacha pass, surroundings of the villages Urgut, Agalyk (Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits fine earth slopes and rocks in the middle belt of mountains. Single specimens can be found. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: protected in the Kitab nature reserve. Monitoring of populations is necessary.



130. ОҚ ЛОЛА, ОРИТИЯ ЛОЛА

Тюльпан орбитиевидный / *Tulipa orithyioides* Vved.

Мақоми 1. Ғарбий Помир-Олойдaги йўқолиш арафасида турган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 7–12 см га етадиган қўп йиллик, пиёзли ўсимлик. Пиёзи тухумсимон, диаметри 1,5 см, қобиғи қоғозсимон, қўнғир қулранг, ички томони тўрсимон момиқ тукли. Барглари 2 та, яқин жойлашган, эгри-бугри. Гуллари яқка, оқ, туби сариқ. Чангчи иплари сариқ, остки қисми узун киприсимон тукли. Чангдонни хира бинафша рангли. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Ҳисор тизмаси (Чўлбайир тоғи, Тупаланг ва Оби-Заранг дарёлари ҳавзаси)да тарқалган (Сурхондарё вилояти).

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2 500–3 000 м баландликда тош-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда яқка-яқка ҳолда тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан ва пиёздан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари узиб олиниши ҳамда чорва моллари боқилиши оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1975 йилдан буён экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Табиатда сақланиб қолган тупларини назорат остига олиш лозим.

Манбалар. [50, 60, 291].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Очень редкий эндемик Западного Памиро-Алая, находящийся на грани исчезновения.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 7–12 см. Луковица яйцевидная, до 1,5 см в диаметре, с бумагообразными буро-серыми, с внутренней стороны паутинисто-мохнатыми оболочками. Листья в количестве 2, сближенные, курчавые. Цветок одиночный, белый, центр желтый. Тычиночные нити желтые, внизу длиннореснитчатые. Пыльники грязно-фиолетовые. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Гиссарский хребет: горы Чульбаир, бассейн рек Тупаланг и Оби-Заранг (Сурхандарьинская область).

Места обитания. Каменно-щебнистые склоны в среднем и верхнем поясах гор, на высоте 2 500–3 000 м над уровнем моря.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и выпас скота.

Культивирование. С 1975 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.



Меры охраны. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291].

К.Ш. Тожибаев

Very rare endemic species of the western Pamir-Alay, it is on the verge of disappearance. It is spread at the Hissar range: the Chulbair mountains, the Tupalang and Obi-Zarang river basins (Surkhondarya region). Inhabits stony slopes in the middle and upper belts of mountains, at a height of 2 500–3 000 m. The quantity is unknown. Limiting factors: mass picking of flowers, pasturing. Measures of protection: not protected.



131. САРҒИШ ЛОЛА, ЧАНГЧИ ИЛИ ТУКЛИ ЛОЛА Тюльпан волосистотычиночный / *Tulipa dasystemon* (Regel) Regel

Мақоми 3. Ғарбий Тянь-Шань ва Помир-Олойдagi ареали акралган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–20 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 1,5 см гача. Қобиги қорғосимон, қора-қўнғир тусли ёки қўнғир, ички томонининг юқори қисми ётиқ тукли. Барги 2–3 та. Гули якка, оч сарик, баъзан оқ, туби сарик, Чангчи или ва чангдони сарик, Май-июнь ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Писком, Уғом, Чимён, Чотқол, Курама, Олой, Туркистон, Молғузар, Ҳисор тизмаларида тарқалган (Тошкент, Фарғона, Жиззах, Сурхондарё вилоятлари). Қозогистон, Қирғизистон ва Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2 500–3 000 м баландликдаги тошли ва ширалли тоғ ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кичик тўплар ҳосил қилиб ёки якка-якка ҳолда тарқалган.

Қўлайлиши. Уругидан ва пиёзидан қўлайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уругининг ёмон униши ва чорва молларининг боқилиши ареалининг қисқариб кетишига сабаб бўлган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника ботаника 1959 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол ва Зомин қўриқхоналарида, Уғом-Чотқол ва Зомин миллий табиат боғларида муҳофаза қилинади. Бу ўсимлик ўсадиган жойда мол боқилишини режалаштириш ва уни назорат остига олиш керак.

Манбалар. [50, 60, 291].

К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Редкий вид Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–25 см. Луковица яйцевидная, до 1,5 см в диаметре, с чёрно-бурыми или бурыми-бумагообразными, с немногими прижатыми волосистыми у самой верхушки оболочками. Листья в числе 2–3. Цветок бледно-жёлтый, редко белый, с жёлтым центром. Тычиночные нити жёлтые, пыльники жёл-

тые. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Пскемский, Угамский, Чимганский, Чаткальский, Кураминский, Алайский, Туркестанский, Мальгузарский, Гиссарский хребты (Ташкентская, Ферганская, Джизакская, Сурхандарьинская области). За пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны в верхнем поясе гор, на высоте 2 500–3 000 м над уровнем моря.

Численность. Встречается единичными экземплярами или небольшими группами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота, слабое семенное возобновление.

Культивирование. С 1959 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского и Зааминского заповедников, Угам-Чаткальского и Зааминского национальных парков. Необходимы регулирование выпаса и контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291].

К.Ш. Тожибаев



Rare species of the western Tien-Shan and Pamir-Alay with the reducing area. It is spread at the Pskem, the Ugam, the Chimgan, the Chatkal, the Kurama, the Malguzar, the Hissar ranges (Tashkent, Jizzakh, Samarkand and Surkhandarya regions). Inhabits stony and gravelly slopes in the upper belt of mountains (2 500–3 000 m.s.l.). Single specimens or small groups can be found. Limiting factors: pasturing, seed reproduction is absent. Measures of protection: protected in the Chatkal and Zaamin nature reserves, Ugam-Chatkal and Zaamin national parks. Control of pasturing and state of populations are necessary.



132. ТУКЛИ ДОЛА, СУРХОН ДОЛАСИ

Тюльпан шерстистый / *Tulipa lanata* Regel

Мақоми 3. Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–40 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 4 см гача, қобиғи юпқа-чармсимон, қўнғир рангли, ички томони қалин, узун туклар билан қопланган. Барглари 4 та гача, четлари эгри-бугри. Гули якка, диаметри 5–6 см, гулқўрғони қизил, асоси қўнғир ёки қора, оқ-сарик ҳошияли. Чангчи иплари қисқа, туби қора, учбурчак шаклда, чангдонлари қизғиш-қора, туб қисми оқ. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Ҳисор тизмаси, Қўхитанг, Байсунтоғ ва Боботоғда тарқалган (Сурхондарё вилояти). Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки қисмидаги соз тупроқли ва тошли ёнбағирлар ҳамда очик ола жинсли тупроқларда тарқалган.

Сони. Якка-якка ва кичик гуруҳлар ҳолида ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гул ва пиёзларининг кўп миқдорда йиғиб олиниши ҳамда чорва молларининг боқилиши туфайли қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1954 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади. Ўсимлиқнинг сони ва популяцияси ҳолатини назорат остига олиш ҳамда чорва моллари боқилишини тартибга солиш лозим.

Манбалар. [40, 50, 60, 291].

А.Х. Шарипов

Статус 3. Редкий эндемик Памиро-Алай.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 15–40 см. Луковица яйцевидная, до 4 см в диаметре, с нежными, тонкокожистыми покровными чешуями коричневого цвета, внутри обильно покрытыми длинными волосками. Листья в количестве 4, курчавые. Цветок одиночный, 5–6 см в диаметре, лепестки околоцветника красные, при основании бордовые или черные с бледно-желтым окаймлением. Тычиночные нити короткие, при основании в виде черных треугольников, под пыльниками белые. Пыльники бордово-черные. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне.

Распространение. Гиссарский хребет, Кугитанг, Байсунские горы, Бабатаг (Сурхандарьинская область). За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Глинистые, реже каменистые склоны и выходы пестроцветных толщ в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами и многочисленными группами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и луковиц, выпас скота.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз с 1954 года.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике. Необходим контроль за численностью и состоянием популяций, регулирование выпаса.

Источники. [40, 50, 60, 291],
А.Х. Шарипов

Rare endemic species of the Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range; the Beyrun mountains; the Kughitang, the Babatag ranges (Surkhandarya region). It inhabits clayish, rarely stony slopes, outcrops of gypseous layers in the lower belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve. It is necessary to control number and state of populations and pasturing.



133. КАУФМАН ДОЛАСИ, ТАРГИЛ ДОЛА

Тюльпан Кауфмана / *Tulipa kaufmanniana* Regel

Мақоми 3. Ғарбий Тянь-Шандаги камайиб бораётган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10-50 см орасидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, чузиқ ёки шолғомсимон, диаметри 1,5-6 см оралиғида. Қобиғи тўқ қўғир ёки тилларанг қўғир, нафис, қоғозсимон юпка. Барглари 3-5 та. Гули якка, оқ, сариқ, оч сариқ, оч қизил. Гулининг туби сариқ. Чангчи иплари ва чангдонлари сариқ. Март-апрель ойларида гуллаб, меваси май-июнда етилади.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Уғом, Писком, Қоржонтов, Чотқол, Қурама тизмаларида тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида: Қирғизистон, Қозғористон, Тожикистон.

Статус 3. Эндемик Западного Тянь-Шаня с сокращающимся ареалом и численностью.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10-50 см. Луковица яйцевидная, удлинённая или репчатая, 1,5-4 см в диаметре. Покровные чешуи черно-бурые или золотисто-коричневые, нежные, бумагообразные. Листья в количестве 3-5. Цветок одиночный, лепесточки околоцветника белые, желтые, кремоватые, огненно-красные; центр цветка желтый. Тычиночные нити и пыльники желтые. Цветёт в марте-апреле, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Хребты Угамский, Пскемский, Каржантау, Чаткальский, Кураминский: бассейны рек Угам, Пскем, Чаткал, Чирчик, Ахангаран, Чадаксай (Ташкентская, Наманганская области). За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан.

Места обитания. Каменистые местообитания от предгорий до субальпийского пояса.

Численность. Встречается небольшими популяциями и единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и хозяйственное освоение территории.

Культивирование. С 1951 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском биосферном заповеднике, Угам-Чаткальском биосферном резервате и Угам-Чаткальском национальном парке. Необходимы контроль за состоянием популяций, запрещение сбора цветков, выявление декоративных форм и размножение их в культуре.

Источники. [40, 50, 60, 291].

А.Х. Шарипов

Ўсиш шароити. Тоғ этакларида то юқори (яйловнинг пастки) қисмигача бўлган тошли ерларда ўсади.

Сони. Якка-якка ёки кичик туплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гулларининг кўп миқдорда териби олиниши ҳамда ўсиб турган ерларининг ўзлаштирилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1951 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида, Уғом-Чотқол биосфера резерватида ва Уғом-Чотқол миллий боғида муҳофаза қилинади. Табиатдаги тупларининг ҳолатини назорат қилиш, гулларини теришни тақиқлаш, улар орасидан манзарали шакллари эжратиб олиш ва экиб ўстириш зарур.

Манбалар. [40, 50, 60, 291].

А.Х. Шарипов

Endemic species of the western Tien-Shan with highly reducing area. It is spread at the Pskem, the Ugam, the Angren, the Chatkal river basins (the Tashkent region). Inhabits stony habitats from the submontane zone to subalpine belt. Small populations and single specimens can be found. Limiting factors: picking of flowers and economic use of territory. Measures of protection: protected in the Chatkal and Ugam-Chatkal state biosphere reserves and the Ugam-Chatkal national park. It is necessary to control the state of populations, to forbid picking of flowers, to search for ornamental forms and their reproduction in cultivation.



134. ТУБЕРГЕН ЛОЛАСИ

Тюльпан Тубергена / *Tulipa tubergeniana* T.M. Hoog

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–30 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 3–5 см, қобиғи жигарранг ёки қўнгир, ички томони тўрсимон-чалқаш, момик тукли. Барглари 3 та, гулидан узун. Гуллари якка, йирик, диаметри 6–7 см, қизил, туби қора, оч сарик, гардишсимон доғли. Чанг-чи иплари қора, чангдонлари бинафша рангли. Апрель-да гуллаб, меваси июнь–июль ойларида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасида (Бойсун тоғларида, Сина қишлоғи атрофи ва Тупаланг дарёси ҳавзасида), Қўхитанг ва Боботог тизмаларида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Адирларда ва тоғларнинг пастки қисмидаги ола жинсли ва соғ тупроқли ёнбағирларда, кўпинча, pistaзорларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари қўллаб ўзиб олинishi ва чорва моллари боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1955 йилдан бери экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Айрим популяциялари Сурхон давлат қўриқонасида муҳофаза қилинади. Табиатдан янги ўсиб турган ерларини қидириб топиш лозим.

Манбалар. [40, 50, 60, 291].

А.Х. Шарипов



Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет, Байсунские горы, окрестности кишлака Сина, бассейн реки Тупаланг; Кугитанг, Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Глинистые склоны в предгорьях и пестроцветных низкогорьях, часто среди фисташников.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и выпас скота.

Культивирование. С 1955 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Часть популяций охраняется на территории Сурханского государственного заповедника. Необходим поиск новых местонахождений.

Источники. [40, 50, 60, 291].

А.Х. Шарипов

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Baysun mountains, the surroundings of village Sina, the Tupalang river basin; the Kughitang and Babatag ranges (Surkhondarya region). Inhabits clayish slopes in gypseous low hills, often among the pistachio-woodlands. Single specimens can be found. Limiting factors: mass picking of flowers, pasturing. Measures of protection: some populations protected in the Surkhan state nature reserve. It is necessary to search new locations.



Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–30 см. Луковица яйцевидная, 3–5 см в диаметре. Покровные чешуи с бурыми или коричневыми, с внутренней поверхности паутино-сто-лохматыми оболочками. Листья (3) превышают цветок. Цветок одиночный, крупный, 6–7 см в диаметре. Листочки околоцветника красные, при основании с чёрным, бледно-желто-окаймленным пятном. Тычиночные нити черные, пыльники фиолетовые. Цветёт в апреле, плодоносит в июне-июле.



135. УЛУГВОР ЛОЛА

Тюльпан великий / *Tulipa ingens* T.M. Hoog

Мақоми 3. Гарбий Помир-Олойд кам тарқалган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 12–25 см орасидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзининг диаметри 2,5–4 см, қўзиқ-тухумсимон, устки қисми қора қўнғир ёки қўнғир юлқа чармсимон қобиқ билан ўралган. Барглари 3–4 та, тарвақайлаган, ўткир учли, наштартсимон, четлари эгри-бугри, қўжимтир рангли. Гули қизил, юлдузсимон, туби қора рангли. Чангчиси ва чангчи иплари қора, тим қўнғир ёки тўқ қизил рангли. Апрель–май ойида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Зарафшон, Кўхитанг ва Ҳисор тизмаларида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.



Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1 600–2 000 м баландликда тоғларнинг ўрта қисмидаги соз тупроқли ёнбағирларида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ва тўплар бўлиб учрайди.

Қўпайиши. Уругидан ва пиёзидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши, гуллари узилиб, ва пиёзлари қазиб олинishi сабабли сони камайган.

Маданийлаштирилиши. 1951 йилдан бошлаб ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор, Китоё ва Сурхон қўриқхоналарида муҳофаза қилинади. Ўсиб турган тўплари назорат остига олинishi лозим.

Манбалар. [40, 50, 60, 291].

А.Х. Шарипов

Статус 3. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 12–25 см. Луковица продолговато-яйцевидная, 2,5–4 см в диаметре, с черно-бурыми или бурыми тонкокожистыми покровными чешуями. Листья в количестве 3–4, расставленные, ланцетные, иногда по краю слабо-крупноволнистые, сизые. Цветок красный, в форме звезды, центр черный. Тычиночные нити черные, пыльники черные, коричневатые-черные или темно-бордовые. Цветет в апреле–мае, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Зеравшанский и Гиссарский хребты, Кугитанг (Самаркандская, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области). За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Глинистые склоны в среднем поясе гор, на высоте 1 600–2 000 м над уровнем моря.

Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими популяциями.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и луковиц, выпас скота.

Культивирование. С 1951 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Гиссарского, Китабского и Сурханского заповедников. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [40, 50, 60, 291].

А.Х. Шарипов

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Zerafshan, the Hissar and Kugitang ranges (Samarkand, Kashkadarya and Surkhondarya regions). Inhabits clayish slopes in the middle belt of mountains, at a height of 1600–2000 m.s.l. Single specimens and small populations can be found. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: protected in the Hissar, the Kitab and Surkhan state reserves. Control of the state of populations is necessary.



136. ШУБХАЛИ ЛОЛА, ЧИПОР ЛОЛА

Тюльпан сомнительный / *Tulipa dubia* Vved.

Мақоми 3. Ғарбий Тянь-Шандаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 7–25 см оралигидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи чўзиқ-тухумсимон, қобиғи тўқ жигарранг, ичи ётиқ тукли. Барглари учта, кўкимтир, четлари эгри-бугри. Гуллари ёпирма барглар орасида жойлашган. Гулбанди сертук, кўкимтир губорли. Гуллари яқка, сариқ, ташиқи томони кўкимтир-пушти йўл-йўл, гул туби тўқ сариқ. Чангчи иплари тўқ сариқ, чангдонлари сариқ. Май–июнь ойида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Уғам, Писком, Қоржонтов, Чотқол, Курама тизмаларида тарқалган. Қирғизистон ва Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта ва юқори қисмидаги майин зарра тупроқли, шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Яқка-яқка ҳолда тарқалган.

Қўпайиши. Уругидан ва пиёздан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари ва пиёзлари йиғиб олинishi сабабли қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1951 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида, Уғам-Чотқол биосфера резерватидан ва Уғам-Чотқол миллий боғида муҳофаза қилинади. Биологик хусусиятларини ўрганиш ва маданийлаштирилиши лозим.

Манбалар. [50, 60, 291].

К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 7–25 см. Луковица удлинённо-яйцевидная, с тёмно-коричневыми оболочками, внутри прижатоволосистая. Листья (3) сизые, по краю волнистые. Цветки сидячие в розетке листьев. Цветоножка очень пушистая, с сизым налётом. Цветок одиночный, жёлтый, снаружи с сизо-розовыми полосками, центр оранжевый. Тычиночные нити оранжевые. Пыльники жёлтые. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: хребты Каржантау, Угамский, Пскемский, Чаткальский и Курамский. За пределами Узбекистана: Казakhstan и Кыргызстан.

Места обитания. Мелкоземистые и щебнисто-мелкоземистые склоны среднего и верхнего пояса гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов и луковиц.

Культивирование. С 1951 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.



Меры охраны. Охраняется в Чаткальском биосферном заповеднике, Угам-Чаткальском биосферном резервате и Угам-Чаткальском национальном парке. Необходимо изучение биологических особенностей и введение в культуру.

Источники. [50, 60, 291].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Karzhantau, the Ugam, the Pskem, the Chatkal and Kurama ranges (Tashkent and Namangan regions). Inhabits fine earth and -fine earth slopes in the subalpine and alpine belts of mountains. Single specimens can be found. Limiting factors: picking of flowers and bulbs. Measures of protection: protected in the Chatkal and Ugam-Chatkal state biosphere reserves and the Ugam-Chatkal national park. It is necessary to study biological characteristic features and the introduction into cultivation.



137. ЧЎЛБАЙИР ДОЛАСИ, ПУШТАГЛИ ДОЛА

Тўлпалы қилебатый / *Tulipa carinata* Vved.

Мақоми 3. Помир-Олойнинг жануби-ғарбидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–50 см орасидаги қўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 1,5–4 см, қобиғи қармсимон қора қўнғир рангли, ички томони қалин тукли. Барглари 3–4 та. Гули яқка, қизил ёки пушти ранг. Гулининг туби сариқ ёки хирароқ сариқ. Чангчи иллари қора, чангдони

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқ-хонасида муҳофаза қилинади. Усиб турган жойлари назорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [40, 50, 60, 291].

А.Х. Шарипов

Статус 3. Редкий эндемик Юго-Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 15–50 см. Луковица яйцевидная, 1,5–4 см в диаметре, с черно-коричневыми, кожистыми, с внутренней стороны волосисто-шерстистыми покровными чешуями. Листья в количестве 3–4. Цветок одиночный, красный, центр цветка черный или грязновато-желтый. Тычиночные нити черные, пыльники черные с бордовым оттенком, изредка желтые. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Кугитанг, Байсунские горы, горы Чудьбаир, Гиссарский хребет: бассейн рек Сангардак и Тупаланг (Сурхандарьинская область). За пределами Узбекистана: Таджикистан, Туркменистан.

Места обитания. Каменистые и каменисто-мелкоземистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов.

Культивирование. С 1966 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [40, 50, 60, 291].

А.Х. Шарипов

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Kughitang, the Baysuntau and Chulbair mountains, the Hissar range: the Tupalang, the Sangardak river basins (Surkhandarya region). Inhabits stony and stony-fine earth slopes in the middle mountainous zone. Single specimens can be found. Limiting factors: mass picking of flowers. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve. Monitoring of populations is necessary.



қора ёки қизғиш, баъзан сариқ. Май–июнда гуллаб, меваси июль–август ойларида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Қўхитанг, Бойсун ва Чўлбайир тоғлари, Ҳисор тизмасида (Тупаланг, Сангардак дарёлари ҳавзаси) тарқалган. Тожикистон ва Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги тошли ва майда тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Яқка-яқка ҳолда тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Қўплаб гуллари териб олиниши сабабли ареали қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1966 йилдан буён экиб ўстирилади.

138. ЎЗБЕКИСТОН ДОЛАСИ

Тюльпан узбекистанский / *Tulipa uzbekistanica* Botschantz. et Sharipov

Мақоми 1. Йўқолиб кетиш арафасидаги Помир-Олойнинг жануби-ғарбидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–20 см оралиғидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 2,5 см, қобиғи чўзиқроқ, қаттиқ, туксиз, фақат ичи сийрак ётиқ туклар билан қопланган. Барглари 3 та, яшил кўсимтир губорли, чети бироз эгри-бугри. Гули қизил, туби тўқ қўнғир доғли, сариқ гардишли. Чангчи иплари ва чангдонлари оч сариқ, баъзан тўқ қизил. Мартда гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Курукдаҳана тоғининг Талли довоида тарқалган.

Ўсиш шароити. Ола жинсли паст тоғлардаги кулранг шўрхоқ бўз тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ёки тўплар ҳосил қилиб тарқалган. Курукдаҳана тоғининг Талли довоида 40–45 га майдонда 1 000 га яқин тупи аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гулларининг кўп миқдорда теририлиши ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1967 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Унинг ўсиб турган янги жойларини қидириб топиш лозим.

Манбалар. [41].

Ф.И. Каримов

Статус 1. Редкий эндемик Юго-Западного Памиро-Алая, находящийся на грани исчезновения.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–20 см. Луковица яйцевидная, до 2,5 см в диаметре, оболочки луковицы немного продолговатые, жесткие, голые, изнутри покрытые редкими короткими, прижатыми волосками. Листья (3) зелёные с сизым налётом, по краю крупноволни-

стые. Цветок красный, в центре тёмно-коричневое пятно с жёлтым окаймлением. Тычиночные нити и пыльники светло-жёлтые, реже бордовые. Цветёт в марте, плодоносит в мае.

Распространение. Горы Курукдагана, перевал Таллы (Кашкадарьинская область).

Места обитания. Серые солёные глины пестроцветных низкогорий.

Численность. Встречается одиночно или небольшими популяциями. На перевале Таллы на площади 40–45 га отмечено около 1 000 растений.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов, выпас скота.

Культивирование. С 1967 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим поиск новых местонахождений.

Источники. [41].

Ф.И. Каримов

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Kurukdagana mountains; the Tally pass (Kashkadarya region). Inhabits grey saliferous clay of gypseous low hills. Single specimens can be found. Limiting factors: mass picking of flowers, pasturing. Measures of protection: it is necessary to search new locations.



139. ҚИЗИЛ ЛОЛА (ГРЕЙГ ЛОЛАСИ)

Тюльпан Грейга / *Tulipa greigi* Regel

Мақоми 3. Ғарбий Тянь-Шандаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–45 см оралиғидаги қўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон ёки юмалоқ, қобити баъзан қалин чармсимон баъзан юпқа қоғозсимон. Барглари 3–4 тагача эгри-бугри, устки қисмида бинафша ранг доғлари бор. Гуллари якка, тўқ сариқ, баъзан тўқ қизил, сариқ, қизғиш доғли. Гулнинг туби сариқ тухумсимон қора доғли. Чангчи иллари қора ёки сариқ, чангдонлари сариқ, бинафшаранг, кулранг. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Ғарбий Тянь-Шаннинг барча тизмаларида тарқалган. Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки қисмидаги шағалли ва соя тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда, баъзан 5–10 тупдан иборат тўплар ҳосил қилиб тарқалган. Тошкент вилояти ҳудудида 100 000 тупга яқин ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан ёки қисман вегетатив йўл билан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гули ва пиёзларининг қўп миқдорда йиғиб олинishi ҳамда чорва моллари боқилиши ўсимликка салбий таъсир кўрсатмоқда.

Маданийлаштирилиши. Қўпгина ботаника боғларида муваффақиятли ўстирилади. Шу жумладан, ЎзР ФА Ботаника боғида 1956 йилдан буён экиб келинади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида, Уғам-Чотқол биосфера резерватиди ва Уғам-Чотқол миллий боғида муҳофаза қилинади. Унинг ўсиб турган тўплари назорат остига олинishi лозим.

Манбалар. [50, 60, 291].

А.Х. Шарипов

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–45 см. Луковица яйцевидная или округлая с грубыми кожистыми или нежными бумагообразными чешуями. Листья в числе 3–4, курчавые, с антоциановыми пятнами. Цветок одиночный, оранжево-красный; встречаются формы с темно-красными, оранжевыми, желтыми, кремовыми цветками, центр цветка желтый с яйцевидными черными пятнами. Тычиночные нити или черные, или желтые, пыльники желтые, фиолетовые, сероватые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне–июле.



Распространение. Все горные хребты Западного Тянь-Шаня (Ташкентская и Наманганская области). За пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Места обитания. Глинистые и щебнистые склоны нижнего пояса гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами, очень редко – небольшими (5–10 растений) группами. В Ташкентской области встречается около 100 000 экземпляров.

Размножение. Семенное, реже вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов, выкапывание луковиц, выпас скота.

Культивирование. Успешно выращивается во многих ботанических садах, в том числе с 1956 года в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника, Чаткальского биосферного резервата и Угам-Чаткальского национального парка. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291].

А.Х. Шарипов

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at all ranges of the western Tien-Shan (Tashkent and Namangan regions). Inhabits clayish and gravelly slopes in the lower belt of mountains. Single specimens, very rarely small (5–10 specimens) groups can be found. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: protected in Chatkal and Ugam-Chatkal state biosphere reserves and the Ugam-Chatkal national park. It is necessary to control the state of populations.



140. ШАРИПОВ ЛОЛАСИ, ГУЛБАРРА

Тюльпан Шарипова / *Tulipa sharipovii* Tojibaev

Мақоми 2. Фарғона водийсининг шимолий адирларида тарқалган эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–20 см га етадиган, пиёзи кўп йиллик ўт ўсимлик. Пиёзи тухумсимон, қобиғи каттиқ, жигарранг тусли, ички томонидаги туклари зич жойлашган, қобиқнинг туби ва юқорисида жамланган. Юқоридаги туклари қобиқдан ташқарига чиқиб туради. Барглари 3 та, ланцетсимон, бир-бирига жуда яқин жойлашган, 7–10 см. Гули сариқ, тубида сариқ ранг қуюқлашади. Гул баргчаларининг учини кесилган ёки чуқурчали. Чанг иплари ва чангдонлари сариқ. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси майда пишади.

Тарқалиши. Наманган вилояти: Чотқол ва Курама тизмаларининг тоғ олди текисликлари ва адирларида тарқалган (Турақўрғондан Резаксой қишлоғигача).

Ўсиш шароити. Қўйи адирлардаги бироз шўрлашган майин тупроқларда, юқори адирлардаги тошли-шағалли ёнбағирликларда ўсади.

Сони. Якка-якка ва кичик тўплар ҳосил қилган ҳолда учрайди. Популяцияларда 100 × 100 м майдонда 50–80 та тупи учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гули ва пиёзларининг кўп миқдорда йиғиб олинishi ҳамда чорва молларининг боқилиши.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 2009 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Унинг ўсиб турган туплари назорат остига олинishi лозим.

Манбалар. [291, 292, 369]

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Эндемичное растение северных предгорий Ферганской долины.

Краткое описание. Луковица яйцевидная, черно-коричневая, коричневая, крепкая, кожистая. Оболочки луковицы не продолженные, длиной 3–3,5 см и шириной 2–2,5 см. Изнутри на основании и сверху волосисто-шерстистые. Густое опушение оболочки выступает наружу. Стебель высотой (10)15–20 см, вместе с цветоножкой голый. Листьев 3, ланцетные, сильно сближенные, образуют ложные мутовки, у живых растений эмеевидно лежат на земле. По краю курчавые, голые, длиной 7–10 см. Цветок одиночный, в бутоне поникающий, желтый, на основании без пятна. Листочки околоцветника на верхушке выемчатые, глубина выемки достигает 1 мм. Тычинки длиной 9–10 мм, в 2–2,5 раза короче околоцветника. Нити тычинок голые, темно-желтые. Пыльники желтые, вдоль всей длины одновременно открывающиеся. Цветёт марте–апреле, плодоносит в апреле–мае.

Распространение. Наманганская область: подгорные равнины и предгорья Чаткальского и Кураминского хребтов (от Туракургона до Резаксай).

Места обитания. Слегка засоленные лессовые почвы подгорных равнин, каменисто-щебнистые склоны высоких адиров.

Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими группами. В популяциях на 100 × 100 м встречается по 50–80 растений.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов, выкапывание луковиц, выпас скота.

Культивирование. С 2009 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [291, 292, 369].

К.Ш. Тожибаев



Endemic species of the northern foothills of Ferghana valley. It is spread at the foothills and piedmont zone of the Chatkal and Kurama ranges: from Turakurgan to Rezaksay. Inhabits foothills with loess and saline soils and stony slopes. Single specimens and small groups can be found. Population consists of 50–80 plants on 100 square meter. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: it is necessary to control the state of populations.



141. ОРАЛИҚ ЛОЛА

Тюльпан промежуточный / *Tulipa intermedia* Tojibayev et J.J. de Groot

Мақоми 2. Фарғона водийсининг шимолий адирларида тарқalgан камёб ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Пиези тухумсимон, диаметри 1,5–3,0 см, қобиғи энсиз, чармсимон, тўқ жигарранг тусли, бирмунча узун, баъзан ҳатто тупроқ юзасига чиқиб қолиши мумкин. Ички томонидаги туклари зич жойлашган ва асосан қобиғининг пастки қисми ҳамда юқорисидда жамланган. Барги 3 та, улар бир-бирига жуда яқин ўрнашган, 5–7 см узунликда, наштартсимон қиррали, четлари буралган, тўлқинсимон. Яккагулли, гули сариқ, тўқ сариқ ёки қизил (*var. korolkowiioides*), гул туби жигарранг ёки тўқ сариқ ранг. Гул баргчаларининг учини ўткир ёки бироз кемтиклашган. Чангчи иллари 1,0 – 1,3 см, сариқ, баъзан пастки қисми қора, юқориси алвон ранг (*var. korolkowiioides*), четлари бир-бирига параллель, ўрта қисми бироз кенгайган. Чангдонлари сариқ, Тугунчаси бутилкасимон, ранги оч-сариқ, Март

ойининг охири – апрель ойининг бошларида гуллаб, уруғи апрель охири – май ойларида етилади.

Тарқалиши. Наманган вилояти (Чуст ва Поп туманлари): Қурама тизмасида тарқалган.

Ўсиши. Адирларнинг қуйи ва ўрта қисмидаги тошли-шағалли ёнбағирликларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг бетартиб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Тўшкент ботаника боғида экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Чорва молларини тизимли равишда ўтлатиш ҳамда ўсиш майдонларида доимий кузатув тадқиқотларини амалга ошириш лозим.

К.Ш. Тожибаев





Статус 2. Редкий вид адыров северной части Ферганской долины.

Краткое описание. Луковица яйцевидная 1,5–3,0 см в диаметре; покровные чешуи тонкокожистые, темновато-коричневые, продолженные, иногда выступающие на поверхность почвы, внутри у основания и на верху густо покрыты прижатыми волосками. Стебли высотой 8–12 см, гладкие. Листья в количестве 3, почти мутовчатые, длиной 5–7 см, ланцетные, скрученные с волнистыми краями. Цветок одиночный, с желтыми, оранжевыми или красными (*var. korolkowoides*), иногда небольшими коричневатыми пятнами или темно-желтым цветом у основания, острым или с небольшим острием на верхушке. Тычинки длиной 1,0–1,3 см, желтые, внизу черные, вверху пурпурные (*var. korolkowoides*), от основания с почти параллельными краями, несколько расширенные в средней части. Пыльники желтые. Завязи бутылкообразные, бледно-желтые. Цветет в конце марта и начале апреля, плодоносит в конце апреля и мае.

Распространение. Наманганская область (Чустские и Папские районы); Кураминский хребет.

Места обитания. Каменисто-щебнистые почвы низких и средних адыров.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Размножается семенами.

Причины изменения численности и ареала. Безсистемный выпас скота.

Культивирование. Выращивается в Ташкентском ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходимо обеспечить системный выпас скота и постоянный контроль за состоянием популяций.

К.Ш. Тожибаев

Endemic species of the northern foothills of the Fergana valley. It is spread at the Namangan region (the Chust and Pap regions); the Kurama range. Inhabits stony slopes of low and middle foothills. Single specimens can be found. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: it is necessary to manage grazing and permanent control of the populations.



НАВРЎЗГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ПЕРВОЦВЕТНЫЕ –
PRIMULACEAE

142. ХИСОР ДИОНИСИЯСИ

Дионисия гиссарская / *Diomysia hissarica* Lipsky

Мақоми 2. Помир-Олойнинг жануби-гарбидаги кичик майдонларда сақланиб қолган кам-ёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Қояларнинг ёриқларида осилиб ўсадиган ёстиқсимон, намчил ярим бутача. Илдиз бўғизидан ўсиб чиққан бир тутам пояларидаги барглари кетма-кет жойлашган. Эски ёпирма барглари сақланиб қолади. Барглари юмшоқ, юпқа, тишчали, безчали туклар билан қопланган, ўзига хос ҳидга эга. Гуллари сариқ, 2-3 та, гулдан баргчалари билан ўралган, пастга эгилиб турувчи гулпояларда ўрнашган. Июнь-июль ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Хисор тизмасининг жанубий ёнбағирлари (Сангардак дарёсининг ўрта оқими)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги сернам жойларда, шаршаралар яқинидаги кумтош қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. 2013 йилда 1 250 тупи аниқланган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уруғ маҳсулдорлигининг пастлиги ва табиий ўсиш шароитининг чекланганлиги (стенобионт тур).

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида қўчат қилиб ўтқазиш ва уруғи орқали қўпайтиришга қаратилган уринишлар натижа бермаган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [88, 269, 368].

О.Т. Тургинов

Статус 2. Редкий узлокальный эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Подушковидный мезофильный полукустарник. Образует компактные подушки, свисающие из расщелин скал. От корневой шейки отходит пучок хрупких стеблей с очередными листьями. Старые розетки сохраняются. Листья мягкие, тонкие, зубчатые, с железистым опушением и нежным ароматом. Цветки на поникающих цветоносах, жёлтые, собраны по 2-3 и окружены прицветниками. Цветёт и плодоносит в июне-июле.

Распространение. Сурхондарьинская область: южные склоны Гиссарского хребта – среднее течение реки Сангардак.

Места обитания. Влажные ниши и под карнизами, расщелины отвесных скал вблизи водопадов в среднем поясе гор.

Численность. В 2013 году зарегистрировано 1 250 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Стенобионтность и низкая семенная продуктивность вида.

Культивирование. Посадка взрослых экземпляров и высев семян в Ботаническом саду АН РУз окончилась неудачей.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [88, 269, 368].

О.Т. Тургинов

Rare and endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Sangardak valley (Surkhondarya region). Inhabits the wet niches, clefts of sheer rocks near waterfalls in the middle belt of mountains. In 2013, about 1 250 plants were revealed. Limiting factors: narrow ecological position and low seed production. Measures of protection: not protected.



ПИСТАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО СУМАХОВЫЕ – ANACARDIACEAE

143 ОШЛОВЧИ ТОТИМ (СИРКА ДАРАХТИ)

Сумах дубильный / *Rhus coriaria* L.

Мақоми 1. Ҳисор тизмаси ва Ғарбий Тянь-Шанга ҳос камёб тур.

Қисқача тавсифи. Баландлиги 3–4 м, баъзан 6–10 м га етадиган паст бўйли дарахт. Ноқулай шароитда ўсганда бута шаклида ҳам учрайди. Бир йиллик новдалари кулранг-қўнғир, қўп йиллик повлари эса жигарранг. Барглари мураккаб, тоқ латсимон, 7–9 жуфт, узунлиги 30 см га етади. Барг банди қанотчали. Гуллари яшил-оқш, поянинг учида чўзиқ урчқисимон тўпгул ҳосил қилади. Меvasи йирик, тигиз, юмалоқ, тўқ қизил рангли, нордон. Уруғи (данаги) овал шаклида, қаттиқ.

Тарқалиши. Сурхондарё, Тошкент вилоятлари: Ҳисор тизмаси (Тупаланг ва Хондиза дарёлари ва хавзалари) ва Ғарбий Тянь-Шанда. Чотқол тизмаси (Қоронкулсой)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1 200–1 400 м баландликда қуруқ шагалли ва тошли ёнбағирларда ўсади. Оқш жойларда ўсувчи ёруғсевар ўсимлик.

Сони. Кам учрайди, онда-сонда кичик туплар ҳосил қилади.

Ўлпайиши. Уруғидан ва бачкисидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Утин сифатида ишлатилади ва ёш нўҳоллари қорва моллари томонидан оёқости қилинади.

Маданийлаштирилиши. Андижон ва Тошкент вилоятларида экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [156–159, 139].

Р.И. Қозоқбоев

Статус 1. Редкий вид Гиссарского хребта и Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Невысокое (3–4, реже 6–10 м) листопадное дерево. В неблагоприятных условиях проявляет себя как кустарник. Однолетние побеги серо-коричневые, многолетние – коричневые. Листья

сложные, непарноперистые, 7–9-парные, длиной до 30 см, с крылатым черешком. Цветки зеленовато-белые, образуют на верхушках побегов вытянутое, веретеновидное соцветие. Плоды шаровидные, темно-бордовые, кислые, собраны в плотные крупные соплодия. Семена (косточки) овальные, твердые.

Распространение. В Сурхандарьинской и Ташкентской областях: Гиссарский хребет: бассейн рек Тупаланг и Хондиза; Западный Тянь-Шань (вероятно занесен и интродуцирован) – Чаткальский хребет – урочище Каранкуль.

Места обитания. Сухие каменистые горные склоны с мелкоземистыми маломощными почвами в нижнем поясе гор. Светолюбивое растение обитает на открытых местах на высоте 1 200–1 400 м.

Численность. Образует небольшие, часто разреженные рощицы.

Размножение. Семенное и вегетативное. Легко размножается корневыми отпрысками.

Причины изменения численности и ареала. Вырубается на топливо, страдает от вытаптывания скотом, особенно молодые всходы и ювенильные растения.

Культивирование. Культивируется в Андижанской и Ташкентской областях.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [156–159, 139].

Р.И. Казакбаев

Rare species of the Hissar range and the western Tien-Shan. It is spread at the Hissar range: the Tupalang and Khandiza river basins; the western Tien-Shan (probably introduced); the Chatkal range; Karankul (Surkhandarya and Tashkent regions). Inhabits dry stony slopes of mountains in the mountainous zone. Photophilous plant inhabits open places at 1 200–1 400 m.s.l. The quantity is unknown. Limiting factors: felled as firing, suffers from trampling down by cattle, especially young seedlings and juvenile plants. Measures of protection: not protected.



РАЎНОГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ –
ROSACEAE

144. ЎРТА ОСИЁ НОКИ

Груша среднеазиатская / *Pyrus asia-medicae* (Popov) Maleev

Мақоми 0. Ғарбий Тянь-Шанга хос йўқолиб кетган тур.

Қисқача тавсифи. Шох-шаббали йирик дарахт. Барглари йирик, кенг тухумсимон ёки деярли юмалоқ, четлари йирик аррасимон, баргининг пастки томони яшил, устки томони эса тўқ яшил, барг банди япроғидан қисқароқ. Гуллари майда. Меваси йирик, юмалоқ, қўкиш ёки сарғиш рангли, кечпишар, серсув, ширин. Май ойида гуллаб, меваси октябрда пишади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Фақатгина Писком дарёси бўйидаги Испай ва Муллали қишлоқларида ўстанлиги маълум.

Ўсиш шароити. Боғларда ўстан.

Сони. Фақатгина бир марта М. Г. Попов томонидан йирилган. Кейинги изланишлар натижасиз тугаган.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Қариган туплари ўтин сифатида ишлатиб юборилган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойлари Угом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида жойлашган. Махсус муҳофаза чоралари кўрилмаган.

Манбалар. [159, 164, 189, 256].

Ў.П. Пратов

Статус 0. Исчезнувший вид Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Крупное дерево с раскидистой кроной. Листья крупные, широкояйцевидные или почти округлые, по краю крупнопильчатые, сверху тёмно-зелёные, снизу более светлые, черешки короче пластинок. Цветки мелкие. Плоды крупные, зеленоватые или желтоватые, чаще округлые, позднеспелые, сочные, сладкие. Цветёт в мае, плодоносит в октябре.

Распространение. Ташкентская область: известна только одна точка – долина реки Пскем в окрестностях кишлаков Испай и Муллали.

Места обитания. Сады.

Численность. Один раз собрана М. Г. Поповым в указанном пункте. Дальнейшие поиски оказались безрезультатными.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены. Возможно, старые деревья были использованы на топливо.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Места произрастания расположены в пределах Угом-Чаткальского национального парка. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159, 164, 189, 256].

У.П. Пратов

Disappeared endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Pskem valley in the surroundings of the village Ispai and Mullali (Tashkent region). Inhabits gardens. Once it was collected by M.G. Popov in the mentioned place. Recent collecting missions had no success. Limiting factors: probably old trees were used as wood. Measures of protection: not protected.



РЎЯНДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО МАРЕНОВЫЕ - RUBIACEAE

145. СИЛЛИҚ РЎЯН

Марена гладкая / *Rubia laevissima* Tschernaevea

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Тянь-Шанга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м га етадиган ярим бута. Пояси силлиқ, юмалоқ, баъзан тўрт қиррали, оч кулранг. Барглари қисқа бандли, туксиз, пояда 6 тадан ҳалқа ҳосил қилиб ўрнашган. Гули яшил-сарик, барг қўлтигида ярим соябон шаклида ўрнашган. Меваси қора, ялтироқ, узунлиги 0,5 мм. Май-июнь ойида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол дарёси хавзасида тарқалган. Қирғизистонда ҳам учрайди (Бешорол қўриқхонаси).



Статус 3. Редкий узкий эндемик Юго-западно-го Тянь-Шаня.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 1 м, с гладкими, округлыми, реже слегка четырёхгранными стеблями светло-серого цвета. Листья в мутовках по 6, на коротких черешках, голые. Цветки зеленовато-жёлтые, в пазушных простых полузонтиках. Плоды чёрные, блестящие, длиной 0,5 мм. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Ташкентская область: Бассейн реки Чаткал. За пределами Узбекистана: Кыргызстан (заповедник Бешарал).

Места обитания. Крупнообломочные каменные осыпи нижнего пояса гор, на высоте 1 000–1 100 м.

Численность. Очень редок. Достоверно известно 12 местонахождений с общей численностью не более 800 экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены. Возможно, влияют камнепады, оползни и лавины.

Культивирование. Предприняты неоднократные и неудачные попытки интродукции в условиях Ботанического сада АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Угам-Чаткальского национального парка. Необходимы сохранение местобитаний, поиск путей введения в культуру.

Источники. [159, 323].

К.Ш. Тожибаев

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1 000–1 100 м баландликдаги йирик тошли сурилмаларда ўсади.

Сони. Жуда кам сақланиб қолган. Ҳозирча 12 жойда ўсиши аниқланган, умумий сони 800 га яқин тупни ташкил қилади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Эҳтимол, тошларнинг сурилиши ва қўчкилар туфайли камайиб кетган бўлса керак.

Маданийлаштирилиши. ЎЭР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилганда ижобий натижага эришилмаган.

Муҳофаза чоралари. Угам-Чотқол миллий табиат боғида сақланади. Табиий ҳолда тарқалган тупларини сақлаш ва экиб ўстириш ишларини йўлга қўйиш керак.

Манбалар. [159, 323].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the south-western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal river basin (Tashkent region). Inhabits stony mounds with large segments in the lower belt of mountains at a height of 1 000–1 100 m. There are 12 population with about 800 specimens recorded. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park. It is necessary to reserve locations, to work out methods of introduction into cultivation.



146. БОЧАНЦЕВ ПЛОКАМАСИ

Плокама Бочанцева / *Plocama botschantzevii* (Lincx.) M. Backlund et Thulin

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Яримбутача, қалин, оқиш, бўғимли, шохлари туксиз. Барглари ясси, нашта-симон, туксиз, юпқа пардасимон ёнбаргчалари нов ҳосил қилади. Гуллари йирик гулёнбаргчали, косачаси бокалсимон, сал ғадир-будур, узунлиги 4 мм, 3–4 та киприксимон тишчали. Гултожи оқишкулранг; узунлиги 7–9 мм, 5 бўлакли, дағал тукли. Меваси цилиндрсимон, узунлиги 5–6 мм, қалин, дағал тукли. Қўшалоқ мевалари бир-бирига маҳкам ўрнашган.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Шеробод тепаликлари (Оқтош қишлоғи атрофи)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Олажинсли паст тоғлардаги соз тупроқларда ўсади.

Сони. 70 тупи борлиги аниқланган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Олажинсли майдонларнинг қисқариши ва молларнинг қўлаб боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [356, 367]

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 1. Редчайший эндемик Южного Памиро-Алаи.

Краткое описание. Полукустарник с многочисленными беловатыми, членистыми, голыми ветвями. Листья плоские, ланцетные, голые с пленчатыми прилистниками, образующими влагалища. Цветы с крупными прицветниками. Чашечка бокаловидная, слегка шероховатая, длиной 4 мм, с 3–4 реснитчатыми зубцами. Венчик беловато-серый, длиной 7–9 мм, 5-лопастный, щетинистый. Плод цилиндрический, длиной 5–6 мм, сильно щетинистый, полуплодники плотно соединены друг с другом. Цветет в июле, плодоносит в сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: эндемик Келиф-Шерабадской гряды (кишлак Акташ).

Места обитания. Серые глины пестроцветных низкогорий.

Численность. Зарегистрировано 70 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение площади пестроцветов и выпас скота.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [356, 367].

Ф.О. Ҳасанов

Rare endemic species of the southern Pamir-Alay. Endemic of the Kelif-Sherabad range, nearby the village Aktash (the Surkhandarya region). Inhabits grey salty soils. 70 plants were found. Limiting factors: decreasing of gypseous slopes and pasturing. Measures of protection: not protected.



147. АЛ-ШАҲБОЗ ПЛОКАМАСИ

Плокама Аль-Шехбаз / *Plocama alshehbazii* F.O. Khass., Khamraeva, Khazhan, et Achilova.

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқачатавсифи. Бўйи 20–45 см ярим буга. Илдизи қўнғир рангли. Пойси силлиқ, тўқ яшил. Барглари силлиқ, узунлиги 2–4 см, эни 1–1,5 мм, новдада қарама-қарши жойлашган, ёнбаргчасиз. Тўпгули монохазналли, гули гулбандсиз. Гулёнбарги яшил, силлиқ, узунлиги 5–6 мм, эни 0,5 мм. Косачаси қорамтир, узунлиги 2,5–3 мм, 5 та бирига тенг бўлмаган тишчали. Гулқўрғонининг узунлиги 25–30 мм, у дастлаб сарғиш, кейинчалик пушти рангли, туксиз 5 қисмли. Чангчиси 5 та, тумшукчаси билан бирга бўртиб чиққан. Тугунчаси силлиқ, Мерикарпийси силлиқ, жигарранг, узунлиги 4–5 мм, эни 1,5 мм. Июлда гуллаб, сентябрда мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Шеробод тепаликлари (Бойсун атрофида тарқалган).

Ўсиш шаронти. Олажинсли қолдиқ тоғлардаги соз тупроқларда ўсади.

Сони. 100 туп ўсимлик борлиги аниқланган.

Қўпайиши. Уругидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Олажинсли майдонларнинг қисқариши ва молларнинг қўлаб боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [356, 367].

У. Хўжаназаров

Статус 1. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Полукустарник высотой 20–45 см. Корни черно-коричневые. Стебли гладкие, темно-зеленоватые. Листья гладкие, длиной 2–4 см, шириной 1–1,5 мм, супротивные, без прилистников. Соцветие монохазнальное, цветки без цветоножек. Прицветники зеленоватые, гладкие, длиной 5–6 мм, шириной 0,5 мм, без желтого острия. Чашечка черноватая, длиной 2,5–3 мм, с 5 неравными зубчиками. Околоцветник длиной 25–30 мм, сначала желтоватый, позже розовый, голый, 5-раздельный. Тычинок 5, выставленных вместе с рыльцем. Завязь гладкая. Мерикарпии гладкие, коричневые, длиной 4–5 мм, шириной 1,5 мм. Цветет в июле, плодоносит в сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: эндемик Келиф-Шерабадской гряды (возле г. Байсун).

Места обитания. Серые глины пестроцветных низкогорий.

Численность. Зарегистрировано 100 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение площади пестроцветов, выпас скота.



Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [356, 367].

У. Хўжаназаров

Rare endemic species of the southern Pamir-Alay. Endemic of the Kelif-Sherabad range, nearby town Baysun (Surkhandarya region). Inhabits grey salty soils. 100 plants were found. Limiting factors: decreasing of gypseous slopes and pasturing. Measures of protection: not protected.



САВРИНЖОН ДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО БЕЗВРЕМЕННИКОВЫЕ
(МЕЛАНТОВЫЕ) - COLCHICACEAE (MELANTHIACEAE)

148. КЕССЕЛРИНГ САВРИНЖОНИ

Безвременник Кесселринга / Colchicum kesselringii Regel

Мақоми 3. Марказий Осиёда камайиб бораётган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик туғунак пиезли ўт. Туғунак пиези чўзиқ туҳумсимон, диаметри 1–3,5 см, қобиғи дағал, қора қўнғир рангли. Барглари 3–6 та, чизикли. Гуллари 1–4 та, оқ рангли. Тожбаргчаларининг ташқи томони тўқ бинафшаранг чизикли, наштартсимон, тўмтоқ. Чангчилари қайтақисидан 2 марта қисқа, чангдонни ингичка. Февраль ойида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Навоий, Самарқанд, Кашкадарё, Жиззах, Сурхондарё вилоятлари: Ғарбий Тянь-Шань (Курама, Чотқол тизмалари)да, Помир-Олой (Туркистон, Зарафшон, Ҳисор, Нурота, Қўхитанг тизмалари ва Чўлбайр тоғлари)да тарқалган. Қозоғистон, Тожикистон, Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидан то тоғнинг юқори қисмигача бўлган жойларда майда жинс тупроқли ва шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда яска-яска ҳолда ва тўп-тўп бўлиб учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гулларининг кўп миқдорда йиғиб олиниши ва чорва молларининг кўплаб боқилиши оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎЭРФА Ботаника боғида 1967 йилдан буён экиб келинади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол, Зомин, Сурхон, Нурота, Китоб, Ҳисор қўриқхоналарида, Зомин ва Уғом-Чотқол миллий боғларида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [159, 221].

У.Х. Қодиров

Статус 3. Эндемик Центральной Азии с сокращающейся численностью.

Краткое описание. Клубнелуковичное многолетнее растение. Клубнелуковица яйцевидно-продолговатая, сплюснутая, 1–3,5 см в диаметре, с чёрно-бурыми кожистыми оболочками. Листьев 3–6, линейные. Цветки в количестве 1–4, белые. Листочки околоцветника снаружи по спинке с тёмно-фиолето-

выми полосками, линейно-ланцетные, тупые. Тычинки в 2 раза короче отгиба, с линейными пыльниками. Цветёт в феврале, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Ташкентской, Самаркандской, Навоийской, Кашкадарьинской, Джизакской, Сурхандарьинской областях: Западный Тянь-Шань – Кураминский, Чаткальский хребты; Памиро-Алай – горы Чўлбайр. Туркестанский, Зеравшанский, Гиссарский хребты, Нуратау, Кугитанг. За пределами Узбекистана: Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан.

Места обитания. Мелкоземистые и щебнисто-мелкоземистые склоны от подгорных равнин до верхнего пояса гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими популяциями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и выпас скота.

Культивирование. С 1967 года культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском, Зааминском, Сурханском, Нуратинском, Китабском, Гиссарском заповедниках, Зааминском и Угам-Чаткальском национальных парках.

Источники. [159, 221].

У.Х. Кадыров

Endemic of Central Asia with the reducing populations. It is spread at the western Tien-Shan: the Kurama, the Chatkal ranges, the Pamir-Alay; the Chulhair Mountains; the Turkistan, the Zeravshan, the Hissar, the Nuratau, the Kughitang ranges (Tashkent, Samarkand, Navoi, Kashkadarya, Jizzakh, Surkhondarya regions). Inhabits fine earth slopes from piedmonts to the upper belt of mountains. Single specimens and small populations can be found. Limiting factors: picking of flowers, pasturing. Measures of protection: protected in the Chatkal, the Zaamin, the Surkhan, the Nuratau, the Kitab, the Hissar state reserves, the Zaamin and Ugam-Chatkal national parks.



СОЛАБДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ОРХИДНЫЕ -
ORCHIDACEAE

149. ТУРКИСТОН ЭУЛОФИЯСИ

Эулофия туркестанская / *Eulophia turkestanica* (L'v.) Schlecht.

Макоми 3. Марказий Осиёнинг жанубий қисмидаги ареали ажралган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 35-50 см орасидаги туksиз, сариқ-бинафша рангли, кўп йиллик ўт. Илдизпояси бугимли. Пояси 1-2 та. Барглари унча ривожланмаган. Ўткир учли, пәрдасимон, юқори қисми учбурчак шаклидаги новни эслатади, узунлиги 2-3 см. Кечроқ тараққий этадиган поялардаги барглари энси, узунчоқ, қаттиқ. Гуллари оч сариқ, пастга қараб эгилган. Қўсаги эллипссимон, узунлиги 2-2,5 см, эни 10-12 мм. Апрель ойида гуллаб, меваси май-июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий, Самарқанд, Сурхондарё вилоятлари: Зарафшон дарёси водийсида, Кармана, Конимех шаҳарчалари ва Муян қишлоғи атрофида, Сурхондарё хавзасида, Жарқўрғон шаҳри ва Сурхон шаҳарчаси ўртасида, Денов шаҳри атрофида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тукайларда, чийзорларда ҳамда ботқоқлашган ерларда ўсади.

Сони. Кам тарқалган, унча катта бўлмаган тўплар ҳосил қилади.

Қўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [337].

О.Қ. Хожиматов

Статус 3. Редкий эндемик южной части Центральной Азии с разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение, желтовато-фиолетовое, голое, высотой 35-50 см. Корневище узловатое. Стебли в количестве 1-2, с редуцированными листьями в виде заостренных, перепончатых на верхушке, треугольных влагалищ длиной 2-3 см. Листоносные побеги развиваются позднее, с узкими, линейными, жесткими листьями. Цветки ярко-желтые, поникающие. Коробочка эллиптическая длиной 2-2,5 см, шириной 10-12 мм. Цветет в апреле,



плодоносит в мае-июне.

Распространение. В Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Сурхандарьинской областях: долина реки Зеравшан у поселков Кармана, Канимех и кишлака Муян, долина реки Сурхандарья между городом Джаркурган и поселком Сурхан, в окрестностях города Денау.

Места обитания. Заболоченные участки, тугай и заросли чия.

Численность. Встречается редко, небольшими популяциями.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [337].

О.К. Хожиматов

Rare endemic species of the southern part of Central Asia with reducing area. It is spread at the Zerafshan river valley, nearby the villages Muyan, Karmine, Kanimekh, Surkhan and Djarkurgan, nearby Denau (Bukhara, Navoi, Samarkand, Surkhandarya regions). Inhabits wetlands. It grows rarely in a small populations. Measures of protection: not protected.



САЛЛАГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ПИОНОВЫЕ (ЛЮТИКОВЫЕ) –
РАЕОНАСЕАЕ (RANUNCULACEAE)150. ЁВВОЙИ САЛЛАГУЛ
Пион степной / *Paeonia hybrida* Pall.

Макоми 3. Ўзбекистондаги сони қисқариб бораётган камёб, манзарали тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–75 см оралигидаги кўп йиллик ўт. Илдизи урчуқсимон йўғонлашган. Барглари бандли, икки қарра уч бўлакли, бўлаклари қалами-наштарсимон. Гуллари йирик, диаметри 6–10 см. Меваси тарвақайлаган, қалин тукли. Уруғи ялтироқ, қора рангли. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Самарқанд, Сурхондарё, Қашқадарё вилоятлари: Чотқол, Курама, Зарафшон ва Ҳисор тизмаларида тарқалган. Қирғизистон, Қозоғистон, Ғарбий Сибирда ва Шинжон музофоти шимолидаги Жунгория ҳудудида ҳам учрайди.

Уси шароити. Денгиз сатҳидан 1 500–2 500 м баландликдаги чириндили, майда жинсли тупроқларда ва дарахтларнинг тагида ўсади.

Сони. Табиатда 200–250 популяцияси борлиги аниқланган бўлиб, улардан айримлари йўқолиб кетган. Улар фақат қўриқланадиган ва чиқиб бўлмайдиган жойларда сақланиб қолган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Усимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гулларининг узиб олиниши ва тупларининг илдизи билан қизиб олиниб, ҳовлиларга экилиши ҳамда чорва молларининг кўплаб боқилиши оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Қўпгина ботаника боғларида муваффақиятли равишда экиб келинмоқда.

Муҳофаза чоралари. Чотқол, Китоб ва Зомин қўриқхоналарида ва Уғам-Чотқол миллий табиат боғида қўриқланади.

Манбалар. [226].

О.Қ. Ҳожиматов

Статус 3. Редкий в Узбекистане декоративный вид с сокращающейся численностью.

Краткое описание. Травянистый многолетник высотой 25–75 см. Корни с веретенообразными утолщениями. Листья на черешках, дважды тройчаторасчепленные на ланцетно-линейные доли. Цветки 6–10 см в диаметре, пурпурно-розовые. Плоды отклоненные, густопушенные; семена блестящие, черные. Цветет в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Ташкентской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областях: Чаткальский, Кураминский, Гиссарский, Зеравшанский хребты. За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Казахстан, Западная Сибирь, Джунгария (Северная часть Синьцзян-Уйгурской автономии).

Места обитания. Мелкоземистые гумусированные почвы, реже под пологом деревьев на высоте 1 500–2 500 м.

Численность. Отмечен в 200–250 популяциях, некоторые из них уже не существуют. Очень редко на охраняемых территориях и в труднодоступных местах образует заросли.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветков на букеты, пересадка растений на приусадебные участки, бессистемный выпас скота.

Культивирование. Успешно культивируется многими ботаническими садами.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском, Китабском и Зааминском государственных заповедниках, Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [226].

О.К. Ҳожиматов

Rare in Uzbekistan ornamental species with the reducing quantity. It is spread at the Chatkal, the Kurama, the Hissar, the Zerafshan ranges (Tashkent, Samarkand, Surkhondarya, Kashkadarya regions). Inhabits fine earth humus soils, rarely under trees at a height of 1 500–2 500 m.s.l. There are 200–250 populations, some of them do not exist by this time. Very rare on the protected territories and in almost inaccessible places it forms tickets. Limiting factors: picking flowers and replantation of plants into personal plots, unsystematic pasturing. Measures of protection: protected in the Chatkal, the Kitab and Zaamin state reserves and the Ugam-Chatkal national park.



САНТАЛДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО САНТАЛОВЫЕ - SANTALACEAE

151. МИНКВИЦ ТЕЗИУМИ

Ленец Минквица / *Thesium minkwitzianum* B. Fedtsch.

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шанга ҳос йўқолиб кетиш арафасида турган ғоят қамбғ реликт Усимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган қўп йиллик ўт. Илдизи қўп бошчали, ундан тик поялар ўсиб чиқади. Барглари кенг наштасимон, чармсимон. Гуллари яқса-яқса, сариқ, деярли бандсиз. Гулқўргони узун найсимон, учи 5 бўлакли. Уруғи (енчаси) эллипс шаклида, томирлари шохланиб каттақчалар ҳосил қилади. Май-июнь ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Ғарбий Тянь-Шанда тўртта ўсиш жойи маълум – Бошқизилсой (Ўзбекистон), Боролдойтоғ, Талас Олтоғи (Қозғистон) ва Бешорол атрофлари (Қирғизистон).

кожистыми листьями. Цветки одиночные, желтоватые, почти сидячие, околоцветник в виде длинной трубки, наверху неглубоко рассечен на 5 лопастей. Орешек эллиптический, ячеистый от густой сети ветвящихся жилок. Цветёт и плодоносит в мае-июне.

Распространение. Ташкентская область: две близко расположенные популяции имеются в западных отрогах Чаткальского хребта в бассейне реки Башкызылсай. За пределами Узбекистана: Казахстан (Боролдайтау, Таласский Алатау), Кыргызстан (Бешарал).

Места обитания. Мелкоземистые почвы в среднегорье (1 400 м).

Численность. Более 50 разновозрастных растений в Башкызылсае.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Естественно редкий реликтовый вид. Застройка и интенсивное хозяйственное использование территории.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Угам-Чаткальском биосферном резервате.

Источники. [160, 302].

О.К. Хожиматов



Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1 400 м баландликда майда жинс тупроқларда ўсади.

Сони. Ҳар хил ёшдаги 50 дан ортиқ тупи маълум.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Усимлик сони ва ареалининг ўзгариши сабаблари. Табиатда қамбғ, реликт тур. Усимлик ўсиб турган жойларда қўрилиш ишларининг олиб борилиши ва ерларнинг ҳўжалик мақсадида ўзлаштирилиши бу турнинг қирилиб кетишига сабаб бўлган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Угам-Чотқол биосфера резерватида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [160, 302].

О.Қ. Хожиматов

Статус 1. Редчайший, находящийся на грани исчезновения реликтовый вид Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Травянистый многолетник высотой до 50 см, с многоглавым корнем, многочисленными прямыми стеблями, широко ланцетными

ern part of the Chatkal range in the Boshkzylylsay basin (Tashkent region). Inhabits fine earth soils in the middle belt of mountains (1 400 m.s.l.). More than 50 plants were found. Limiting factors: relict species, distribution area and numbers decreasing under anthropogenic pressure. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal biosphere reserve.



СЕМИЗАҚДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ТОЛСТЯНКОВЫЕ -
CRASSULACEAE

152. ҚҰНҒИРОҚГУЛЛИ СОХТАСЕМИЗАҚ

Ложноочиток колокольничкоцветный / *Pseudosedum campanuliflorum* Boriss.

Мақоми 2. Туркистон ва Курама тоғ тизмаларининг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–15 см, тик илдизли, поялари сербарг қўп йиллик ўсимлик. Барглари қалами, узунлиги 1–1.5 см, эни 1–1.5 мм. Гулгўдаси соябонли тўпгул. Гулёнбарглари чўзиқ - тухумсимон. Гуллари қисқа бандли, узунлиги 8–9 мм. Гултожи қўнғироқсимон, пуштиранг. Апрель–май ойларида гуллаб, май ойида уруғ ҳосил қилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Туркистон тизмаси, Жиззах шаҳри атрофлари (Малгузар тизмасининг "Темур дарвоза" дараси) ва Курама тизмалари (Қашқасой)да тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида: Тожикистон (Курама тизмаси ва Мўғилтоғ).

Ўсиш шароити. Тошли ёнбағирлар, тоғнинг пастки қисмидаги қоялар.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Чорва молларининг мунтазам боқилиши, йўл қурилиши оқибатида камайиб кетган бўлиши мумкин.

Маданийлаштирилиши. Маданийлаштирилмаган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [254, 289].

О.Қ. Ҳожиматов

Статус 2. Редкий эндемик Туркестанского и Кураминского хребтов.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 10–15 см, с мощным вертикальным корнем, густо облиственными многочисленными стеблями. Листья линейные, длиной 1–1.5 см, шириной 1–1.5 мм. Соцветие зонтиковидно-щитковидное. Прицветники продолговато-яйцевидные. Цветы длиной 8–9 мм, на коротких цветоножках. Венчик колокольчатый, розовый. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае.

Распространение.

Джизакская область: Мальгузарский хребет (ущелье Темирлановы ворота). Ташкентская область: Кураминский хребет (Кашкасай). За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Каменные склоны, скалы в нижнем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведений нет.

Культивирование. Не культивировался.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [254, 289].

О.Қ. Ҳожиматов

Rare endemic species of the Turkestan and Kurama ranges. It is spread at the Malguzar range: the Timur's gate gorge (Jizzakh region) and the Kurama range (Tashkent region). Inhabits stony slopes and rocks. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



СИГИРҚУЙРУҚДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ПОРИЧНИКОВЫЕ - SCROPHULARIACEAE

153. БУХОРО СПИРОСТЕГИЯСИ

Спиростегия бухарская / *Spirostegia bucharica* (B. Fedtsch.) Ivanina

Мақоми 2. Жануби-ғарбий Памир-Олойдаги камёб эндемик усимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–60 см оралигидаги пахмоқ туклар билан қопланган икки йиллик ўт. Поялари 1–4 та, оддий, баъзан шохланган. Барглари тухумсимон-қўзиқ, кетма-кет жойлашган, четлари ай-рисимон тишли. Гуллари якка-якка, поянинг юқори қисмидаги баргларининг қўлтиғида жойлашган. Косачаси найсимон-қўнғироқсимон, узунлиги 12–15 мм, учбурчак наштаарсимон тишли. Гултожи сап-сарик, воронкасимон, узунлиги 25–45 мм. Қўсақ меваси қўзиқ тухумсимон, узунлиги 15 мм. Уруғи майда. Июль–август ойларида гуллаб, меваси сентябрь–октябрда етилади.

Тарқалиши. Кашкадарё, Сурхондарё вилоятлари: Ғузор, Деҳқонобод, Қизилча, Оқрабод, Шўраб, Оқтош, Қораил, Чарқуқ ва Озод қишлоқлари атрофида тарқалган. Туркменистонда (Қухитанг) ҳам учрайди.

Усиш шароити. Гипсли оҳақтошларда, оҳақ-гилларда, гипсли қояларда, баъзан майда жинсели тупроқларда ўсади.

Сони. Тупларининг умумий сони 15 мингдан ошмайди.

Қўлайиши. Уруғидан қўпаяди.

Усимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ерларнинг қишлоқ ҳўжалиги учун ўзлаштирилганлиги ва чорва молларининг узлуксиз боқилиши ўсимлиқнинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстириш устида олиб борилган қўп йиллик тажрибалар натижасиз тугади.

Муҳофаза чоралари. Сурхон даялат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [101, 156–159, 310].

Ф.У. Ҳасанов

Статус 2. Редкий узкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Двухлетнее травянистое растение высотой 20–60 см, густо мохнато опушенное, клейкое от железистых выделений. Стебли в количестве 1–4, простые, реже ветвистые. Листья очередные, яйцевидно-продолговатые, по краю вильчато-зубчатые. Цветки одиночные в пазухах листьев верхней половины стебля. Чашечка колокольчато-трубчатая, длиной 12–15 мм, с тре-

угольно ланцетными цельными зубцами. Венчик ярко-жёлтый, воронковидный, длиной 25–45 мм. Коробочка удлинённо-яйцевидная длиной 15 мм. Семена мелкие. Цветёт в июле–августе, плодоносит в сентябре–октябре.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: окрестности Гузара, Дехканабада, Кызылчи, Акрабада, Шураба, Караили, Чаркяук, Акташ, Азада. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Загипсованные известняки, скалы чистого гипса, реже мелкоземистые, сильно загипсованные субстраты.

Численность. Общая численность не превышает 15 тысяч экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Уменьшение площадей пестроцетов и выпас скота.

Культивирование. Многочисленные попытки вырастить в Ботаническом саду АН РУз оказались неудачными.

Меры охраны. Охраняется на территории Сурханского государственного заповедника.


Источники. [101, 156–159, 310].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: nearby Gazar, Dekhanabad, Kyzylcha, Akraabad, Shurab, Karail, Charkauk, Oktash, Azad (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits gypseous slopes. Total number does not exceed 15 thousand specimens.

Limiting factors: decreasing of gypseous area and pasturing.

Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.



154. ЙИРИК ШЕРОЛЧИН

Мытник большой / *Pedicularis grandis* Popov ex Vved.

Мақоми 0. Ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Попук илдизли ўсимлик. Пояси якка-якка, тик, наматсимон тукли, баландлиги 50–80 см. Барглари навбат билан ўрнашган, чўзиқ, патсимон қирқилган. Тўпгули 20–40 см узунликда. Косачаси наматсимон тукли, узунлиги 30–33 мм, найчаси билан бўртиб туради. Қалпоқчаси ўроқсимон эгилган, узун тумшукчали. Лабчаси тишли, 3 бўлакли. Иккита чангчисининг ипи қалин тукли, бошқа иккитасиники туксиз.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмаси (Ғилон қишлоғи атрофида тарқалган) Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги дарёларнинг қирғоқларида жойлашган ўрмонларда ўсади.

Сони. 25 йил мобайнида бу турни топиш устида олиб борилган ишлар натижасиз тугади. У бу-

тунлай йўқолиб кетган бўлса керак.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайган бўлса керак.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [159, 176].

О.Қ. Ҳожиматов

Статус 0. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Корень мочковатый. Стебель одиночный, прямой, мохнато пушистый, высотой 50–80 см. Листья очередные, удлинённо продолговатые, перисто рассечённые. Соцветие длиной 20–40 см. Чашечка серо-мохнатая, длиной 12–14 мм. Венчик желтоватый, длиной 30–33 мм, с выступающей трубкой. Шлем серповидно согнутый с длинным носиком. Губа зазубренная, трехлопастная. Нити 2 тычинок мохнатые, 2 другие – голые. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарьинская область: Гиссарский хребет, окрестности кишлака Гилан. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Пойменные леса в среднем поясе гор.

Численность. Многочисленные попытки в течение 25 лет найти этот вид в классическом местонахождении не увенчались успехом. Вид, по-видимому, полностью исчез.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 176]

О.Қ. Ҳожиматов

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the western parts of the Hissar mountains, nearby the village Ghilan (Kashkadarya region). Inhabits river forests. Several collecting missions during last 25 years to find these species were unsuccessful. Probably, species disappeared. Measures of protection: not protected.



СУТЛАМАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО МОЛОЧАЙНЫЕ – EUPHORBIACEAE

155. ВВЕДЕНСКИЙ АНДРАХНАСИ

Андрохна Введенского / *Andrachne vvedenskii* Pazij

Мақоми 1. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларига хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см га етадиган ярим бута. Ёш поялари гадир-будур. Ёғочланган кулранг ва қўнғир шохлари қўплаб сақланиб қолади. Барги қалин этли, кенг эллипссимон, юмалоқ, баъзан тескари-тухумсимон, тўмтоқ ёки учли. Гуллари айрим жинсли, барг қўлтиқларида 1–2 тадан жойлашган. Чангчи гули ингичка, уруғчи гули йўғон гул бандда жойлашган. Қўсакчаси деярли юмалоқ, 3 бўлакли. Мева бандининг узунлиги 8–10 мм. Июль ойида гуллаб, меваси пишди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Сурхон-Ше-робод водийсида (Шакарли Остона) тарқалган.

Ўсиш шароити. Очиқ ола жинсларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ўсади. Бир жойдан 2 марта йиғилган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш саба-блари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [159, 212, 257].

Т. Насимова

Статус 1. Редкий эндемик Южного Узбекистана.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 40 см. Молодые стебли очень шероховатые. В изобилии сохраняются одревесневшие старые серые и буроватые ветви. Листья мясистые, широко-эллиптические, округлые или реже обратно-яйцевидные, тупые или заострённые. Цветки разнополые, в пазухах листьев по 1–2. Мужские цветки на тонких цветоножках, женские – на толстых. Коробочка почти шаровидная, трёхлопастная. Плодоножка длиной 8–10 мм. Цветёт и плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Сурхан-Шерабадская долина – Шакарлык-Астана.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород.



Численность. Встречается единично. Собран два раза.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 212, 257].

Т. Насимова

Rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Surkhan-Sherabad valley: Shakarlik-Astana (the Surkhandarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks. Single specimens were collected two times. Measures of protection: not protected.



156. АЙРИШОХ СУТЛАМА

Молочай густоватый / *Euphorbia densiuscula* Popov

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 5–10 см орасидаги бир йиллик ўт. Понси қисқа, қатин баргли, шохланган, хурпайган қисқа тукли. Барглари этли, тескари тухумсимон, асосига қараб ингичкалашиб боради ва барг бандига айланади. Тўнгули қалқонсимон, кўп марта айри бўлиб шохланган. Қўсаги тухумсимон, уч бўлакли, етилмагани қисқа тукли, пишгани деярли туксиз. Май–июнь ойларида гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмасида – Боғлидара довоида, Оқтош қишлоғи атрофида, Ҳисор тизмасида – Бойсун яқинидаги Каттақамиш қишлоғи атрофларида учрайди. Туркменистонда ҳам учрайди (Келиф атрофида).

Ўсиш шароити. Гипсли, ола жинсларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [159, 212, 257].

Т. Насимова

Статус 1. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Однолетнее растение высотой 5–10 см. Стебель укороченный, густо облиственный, ветвистый, коротко оттопырено волосистый. Листья мисистые, обратнойцевидные, к основанию постепенно суженные в черешках. Соцветие щитковидное, многократно дихотомически-ветвящееся. Коробочка яйцевидно-трёхлопастная, молодая – коротко опушенная, зрелая – почти голая. Цветёт и плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – окрестности Байсуна у селения Каттакамыш; хребет Кугитанг (ущелье Боғлидара, окрестности кишлака Акташ). За пределами Узбекистана: Туркменистан (окрестности Келифа).

Места обитания. Гипсированные пестроцветы.



Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Часть популяций охраняется на территории Сурханского государственного заповедника.

Источники. [159, 212, 257].

Т. Насимова

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: around Baysun town near the settlement of Kattakamysh; the Kughitang range: the Boglidara gorge, around the Aktash village (Surkhondarya region). Inhabits gypseous soils. Single specimens can be found. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



157. КУДРЯШЕВ СУТЛАМАСИ

Молочай Кудряшева / *Euphorbia kudrjashewii* (Pavlov) Prokh.

Мақоми 0. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см га етадиган, жингалак туклар билан қопланган қўп йиллик ўт. Пояси тик, оддий, барглари қўп. Поянинг пастки барглари тангачасимон, қўнғир рангли, чўзиқ, пойдаги барглари эса чўзиқ қалами, узунлиги 2-4,5 см, эни 2-4 мм, асоси юмалоқ, учли, текис қиррали. Соябони 3-6 та, оддий нурли. Қўсакчаси юмалоқ, узунлиги 6 мм, жингалак тукли. Июнь-июль ойларида гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмасининг Бешнов тоғида тарқалган.

Ўсиш шаронти. Тоғларнинг юқори (ийлов) қисмида ўсади.

Сони. 1937 йили бир марта йиғилган. Ўсимлиكنи топиш учун сўнгги йилларда олиб борилган изланишлар натижа бермаган. Тур бутунлай йўқолиб кетган бўлиши мумкин.

Қўпайиши. Уругдан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уругининг яхши уммаслиги, тоғнинг юқори қисмида учраши унинг кам тарқалишига сабаб бўлса керак.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [159, 212, 257].

Т. Насимова

Причины изменения численности и ареала. Пассивный способ распространения семенного материала, выпас скота и изоляция.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [159, 212, 257].

Т. Насимова

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Beshnau mountain (Kashkadarya region). Inhabits subalpine zone. The quantity is unknown. It was collected only once in 1937. Several attempts to find out these species had no success. Limiting factors: passive way of seed material distribution, pasturing and isolation. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



Статус 0. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 20 см, курчаво пушистое. Стеблей несколько, они прямостоячие, простые, густо облиственные. Нижние листья чешуевидные, бурые, продолговатые; стеблевые – продолговато-линейные, длиной 2-4,5 см, шириной 2-4 мм; в основании округлые, острые, цельнокрайные. Зонтик 3-6-лучевой, с простыми лучами. Коробочка шаровидная, длиной 6 мм, курчаво пушистая. Цветёт и плодоносит в июне-июле.

Распространение. Кашкадарьинская область: Гиссарский хребет – горы Бешнау.

Места обитания. Субальпийский пояс гор.

Численность. Собран один раз в 1937 г. Многократные попытки найти вид не увенчались успехом. Вид, по видимому, исчез.

Размножение. Семенное.



158. ТИҒИЗ СУТЛАМА

Молочай ложногустоветый / *Euphorbia densiusculiformis* (Fazil) Botsch.

Мақоми 1. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудига хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 8 см га етадиган бир йиллик ўт. Понси қисқа, шохланган. Барглари эгли, кураксимон ёки чузиқ-тухумсимон, қисқа бандли. Қалқонсимон тўпгули барг қўлтигидаги гулли шохлар билан ўралган. Қўсакчаси, одатда, узун бандли, тухумсимон, уч бўлакли, силлиқ. Апрель–май ойларида гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Бойсун ва Шеробод атрофларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Ола жинсли қолдиқ тоғларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 212, 257].

Т. Насимова

Статус 1. Редкий эндемик Южного Узбекистана.

Краткое описание. Однолетнее травянистое растение высотой до 8 см. Стебель укороченный, ветвистый. Листья мясистые, лопатчатые или продолговато-яйцевидные, короткочерешковые. Соцветие щитковидное, окруженное пазушными цветоносными ветвями. Коробочка обычно на длинной ножке, яйцевидно-трёхлопастная, гладкая. Цветёт и плодоносит в апреле–мае.

Распространение. Сурхандарьинская область: окрестности Байсуна и Шерабада.

Места обитания. Пестроцветные низкогорья.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 212, 257].

Т. Насимова

Rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the surroundings of Baysun and Sherabad towns (Surkhondarya region). Inhabits gypseous low mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



159. УЧТИШЛИ СУТЛАМА

Молочай трёхзубчатый / *Euphorbia triodonta* Prokh.

Мақоми 1. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудига ҳос жуда камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 6–15 см, туксиз, кўк-яшил рангли, бир йиллик ўт. Пояси қисқа, деярли асосидан шохланган. Поядаги барглари бандсиз, текис қиррали, пастки 2 жуфт барглари қарама-қарши, қолганлари навбат билан жойлашган, узунлиги 4,5–5 мм, эни 1–1,5 мм. Гуллариди барглари қарама-қарши жойлашган, қалами, узунлиги 10–15 мм, эни 1,5–4 мм, учта томирли. Тўпгули айри бўлиб шохланган, тарвақайлаган. Қўсақчасининг узунлиги 3–3,5 мм, эни 2–2,5 мм. Уруғи чўзиқ, олти қиррали, узунлиги 1,5–2 мм, оқиш ёки қулаган: Апрель ойида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Сурхон-Шеробод водийси (Шеробод атрофлари)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Гипсли ва шўр тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 212, 257].

Т. Насимова

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159, 212, 257].

Т. Насимова

Rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Surkhan-Sherabad valley (Surkhandarya region). Inhabits saline and gypsum slopes of low mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.




Статус 1. Редкий узкий эндемик Южного Узбекистана.

Краткое описание. Однолетнее растение, голое, сизоватое, высотой 6–15 см. Стебель укороченный, почти от основания ветвящийся. Стеблевые листья сидячие, цельнокрайные, 2 нижние пары супротивные, остальные – очередные, длиной 4,5–5 мм, шириной 1–1,5 мм. Прицветные листья супротивные, линейные, длиной 10–15 мм, шириной 1,5–4 мм, 3-нервные. Соцветие дихотомически ветвистое, растопыренное. Коробочка длиной 3–3,5 мм, шириной 2–2,5 мм. Семена продолговато-шестигранные, длиной 1,5–2 мм, беловатые или серые. Цветёт в апреле, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Сурхон-Шерабадская долина – окрестности г. Шерабада.

Места обитания. Засоленные и гипсовые склоны низких гор.



160. ҚАДАҲСИМОН СУТЛАМА

Молочай твёрдобокалычатый / *Euphorbia sclerocyathium* Korovin et Popov

Мақоми 1. Орол ва Каспий атрофидаги чўлларда учрайдиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–40 см оралигидаги туksиз, қўқ-яшил, қўп йиллик ўт. Пойси қўп, тик, асосидан шохланган. Барглари этли, бандсиз, текис қиррали, наштарсимон, эллипс шаклда, баъзан қалами-наштарсимон. Қўсакчаси 4,5 мм узунликда, юмалоқ-тухумсимон, силлиқ. Уруғи тухумсимон, 2–3 мм узунликда, оч қулранг. Май–август ойларида гуллаб, меваси июнь–сентябрда етилади.



Тарқалиши. Қорақалпоғистон: Устюртда, Қоринёриқ, Шахбаҳта ва Борсакелмас қишлоқлари ҳамда Табансу, Қорабаҳур қудуқлари атрофларида тарқалган. Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тошли ва қумли чўлларда, шўрхок, шўрланган қулранг-қўнғир тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши ва ҳудудда нефть-газ саноатининг ривожланиши сабабли камайиб кетмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.
Манбалар. [159, 212, 257].

Х.Ф. Шомуродов

Статус 1. Редкий эндемик Приаральских и Прикаспийских пустынь.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 20–40 см, сизое, голое. Стебли многочисленные, прямостоячие, от основания сильно ветвистые. Листья мясистые, сидячие, цельнокрайные, ланцетовидно-эллиптические, реже линейно-ланцетовидные. Коробочка длиной 4,5 мм, шаровидно-яйцевидная, гладкая. Семена яйцевидные, длиной 2–3 мм, бледно-серые. Цветёт в мае–августе, плодоносит в июне–сентябре.

Распространение. Каракалпакстан: Устюрт, окрестности колодца Табансу, Карабаур, посёлок Карын-Ярык, селение Барсакельмас. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Каменистые и песчаные пустыни, солончаки, засоленные серо-бурые и гипсоносные почвы.

Численность. Встречается спорадически единично и небольшими группами.

Размножение. Семенное и вегетативное (за счёт корневища).

Причины изменения численности и ареала. Развитие нефте-газового сектора в регионе и выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 212]

Х.Ф. Шомуродов

Rare endemic species of the Aral and Caspian deserts. It is spread at the Ustyurt Plateau, nearby Tabansu, Karyn-Yaryk, Barsakelmas (Karakalpakstan). Inhabits stony and sandy deserts, saline soils, saline grey-brown soils. Sporadically isolated or small groups can be found. Limiting factors: pasturing and increasing of oil-gaz operational infrastructures. Measures of protection: not protected.



ТАЛОҚДОРИДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО НАСТОЯЩИЕ ПАПОРОТНИКИ – ASPLENIACEAE

161. ҚОЯ ҚОРҒИ

Листовик сколопендровый / *Phyllitis scolopendrum* (L.) Newman

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шанга хос камёб тур.
Қисқача тавсифи. Қирққулоқ (папоротник). Барглари йирик, узунлиги 40 см га етади, эни 6 см, узун бандли. Япроғи наштар-тасмасимон, четлари тўлқинсимон, асоси юраксимон. Соруслари қалами, узунлиги 2.5 см, асосий томирнинг икки томонида сал қийшиқ жойлашган, пардали. Июль-августда спораляйди.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Уғам тизмаси (Сиджаксой)да тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Туркменистон (Копетдоғ) ва Ўрта Ер денгизи атрофларида учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қояларнинг сояларида ўсади.

Сони. Яқка-яқка ва кичик гуруҳлар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Споралари билан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Уғам-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [63, 159].

Ф.Ў Ҳасанов



Статус 1. Редкий вид в Западном Тянь-Шане.

Краткое описание. Папоротник. Листья крупные, длиной до 40 см и шириной до 6 см, длинночерешковые; пластинка листа ланцетно-ремневидная, с волнистым краем, в основании сердцевидная; сорусы линейные, длиной до 2.5 см, косо расположенные по обе стороны главной жилки, имеются покрывальца. Спороношение в июле-августе.

Распространение. Ташкентская область: Угамский хребет (Сиджаксай). За пределами Узбекистана: Копетдаг, Средиземноморье.

Места обитания. В тени скал среднего пояса гор.

Численность. Встречается спорадически, одиночно и небольшими группами.

Размножение. Спорами.

Причины изменения численности и ареала. Не известны.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [63, 159].

Ф.О. Хасанов

Rare relict species of the western Tien-Shan. It is spread at the Tashkent region: the Ugam range, Sidjaksay. Inhabits shadows of rocks. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



ТОРОНДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ГРЕЧИШНЫЕ -
POLYGONACEAE

162. МАЙИН ТУКЛИ ҚАНДИМ

Қандим майкий / *Calligonum molle* Litv.

Мақоми 2. Қизилқумда кичик майдонларда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50-100 см баландликдаги бироз тирсаксимон шохланган бута. Гули оч пушти. Гулқўрғони мевалаётганда пастга қараб эгилади. Меваси юмалоқ-тухумсимон, узунлиги 25-30 мм, эни 20-25 мм, қизғиш. Қанотчаларинингичка, эни 2-3 мм. Ёнғоқчаси тўғри, узунлиги 10-13 мм. Апрель-май ойларида гуллаб, май-июнда мевалайди.



Тарқалиши. Бухоро вилояти: Қизилқумда (Денгизкўл атрофлари) тарқалган. Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Мустаҳкамланган қум уюмларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган. Баъзан кичик-кичик тўплар ҳосил қилади.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу тур тарқалган ерларда муттасил чорва моллари боқилади. Шунингдек, ундан ўтин сифатида фойдаланилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 204, 270].

М.М. Набиев

Статус 2. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Кустарник высотой 50-100 см со слабоколенчато-извилистыми ветвями. Цветки светло-розовые. Околоцветник при плодах отогнут вниз. Плод округло-яйцевидный, длиной 25-30 мм и шириной 20-25 мм, красноватый. Крылья узкие, 2-3 мм шириной. Щетинки сидячие в 2 ряда, трижды-четырежды

ветвящиеся на нитевидные доли. Орешек прямой, длиной 10-13 мм. Цветет в апреле-мае, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Бухарская область: Кызылкумы - окрестности озера Денгизкуль. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Закрепленные грядово-бугристые пески.

Численность. Не установлена, редко образует небольшие популяции.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Использование массива под выпас скота. Заготовка на топливо.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 204, 270].

М.М. Набиев

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: around the Dengizkul Lake (Bukhara region). Inhabits fixed ridge-hilly sands. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing and use as wood. Measures of protection: not protected.



163. МАТТЕЙ КАНДИМИ

Кандим Маттея / *Calligonum matteianum* Drobow

Мақоми 1. Қизилқумдаги кичик майдонларда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70–150 см, бироз эгри-тирсаксимон шохланган бута. Гуллари пушти. Гулқўрғони мевалаётганда пастга қараб эгилади. Меваси деярли шарсимон, эни 15–20 мм, очсариқ ёки қизғиш. Дағал тукларининг узунлиги 5–7 мм, 8 қатор бўлиб ўрнашган, ингичка, юмшоқ, эгилувчан. Ёнғоқчаси дағал туклар орасида жойлашганлиги учун деярли кўринмайди, узунлиги 7–12 мм, 90 даража буралган. Апрель–май ойларида гуллаб, май–июнда мевалайди.

Тарқалиши. Бухоро вилояти: Қизилқумда (Денгизкўл атрофида) тарқалган. Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Мустаҳкамланган қум тепаликларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган. Кичик майдонларда жуда кам миқдорда тарқалган.

Қўпайиши. Маълумотлар йўқ. Об-ҳаво қулай келган йиллари уруғидан чиққан ниҳолларни учратиш мумкин.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Ўсимлик тарқалган жойларда қўлаб чорва моллари боқилади. Шунингдек, ўтин сифатида ишлатилиши ўсимлик қўпайишига салбий таъсир қилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 204, 270].

М.М. Набиев



Статус 1. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Кустарник высотой 70–150 см со слабоколенчато-извилистыми ветвями. Цветки розовые. Околоцветник при плодах отогнут вниз.

Плод почти шаровидный, шириной 15–20 мм, светло-желтый или красноватый. Щетинки расположены в 8 рядов, тонкие, мягкие, гибкие, длиной 5–7 мм. Орешек почти скрытый щетинками, длиной 7–12 мм, повернутый на 90 градусов. Цветет в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Бухарская область: Кызылкумы – озеро Денгизкүль. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Грядово-бугристые закрепленные пески.

Численность. Не установлена.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 204, 270].

М.М. Набиев

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum; around the Dengizkul Lake (Bukhara region). Inhabits fixed ridge-hilly sands. The quantity is unknown. Measures of protection; not protected.



164. НОЗИК ҚАНДИМ

Қандым изящный / *Calligonum elegans* Drobow

Мақоми 2. Фарғона водийсидаги туб ола жинсларда тарқалган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50–100 см, тирсаксимон шохланган бута. Гулфарғони мевалаётганда пастга қараб эгилган. Меваси овалсимон ёки шарсимон, узунлиги 10–15 мм, сариқ ёки қизил. Қанотчалари юпқа, ясси, четлари нотекис майда тишчали, қирралари майда тишли. Ёнгоқчаси 10 мм узунликда, 90 даража буралган. Апрельда гуллаб, май ойида мевалайди.

Тарқалиши. Фарғона водийси: Фарғона вилояти Гумхона, Оққўп, Оқбел, Супатау ва Қорақалпоқ ҳўлида тарқалган. Тожикистон (Вахш водийси)да ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Туб ола жинсли тупроқларда, туб жинслари ер юзига яқин жойлашган қумларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган. Кичик майдонларда сийрак ҳолда учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг мутғасил боқилиши ўсимликка салбий таъсир қўрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 204, 270].

М.М. Набиев

Култивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 204, 270].

М.М. Набиев

Rare endemic species of the gypseous rocks in the Ferghana valley. It is spread at the Ferghana valley: Gulkhona, the Karakalpak Steppe, Akchop, Akbel, Supatau (Ferghana region). Inhabits outcrops of gypseous rocks and sands with not deep bed of primary rocks. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



Статус 2. Редкий вид пестроцветных толщ Ферганской долины.

Краткое описание. Кустарник высотой 50–100 см с коленчато-извилистыми ветвями. Околоцветник при плодах отогнут вниз. Плод овальный или слегка шаровидный, длиной 10–15 мм, жёлтый или красный. Крылья нежные, плоские, по краю неравно-мелкозубчатые. Орешек длиной 10 мм, повернут на 90 градусов. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Ферганская долина: Ферганская область – Гумхона, Акчоп, Акбель, Супатау и Каракалпакская степь. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород и пески с неглубоким залеганием коренных пород.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.



165. ОХАКТОШ ҚАНДИМИ

Қандим известковый / *Calligonum calcareum* Pavlov

Мақоми 1. Туркистон тизмасида кичик майдончаларда ўсадиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–40 см баландликдаги тирсаксимон эгри-бугри шохланган бута. Гуллари оқ. Гулкўрғони мевалаётганида пастга эгилади. Меваси чузиқ-овал шаклида, узунлиги 10–15 мм, эни 7–10 мм, сариқ ёки қизил. Қанотчалари кенг-наштарсимон, асоси ўйилган, юқори қисми ўткир учли, қирраси нотекис ўткир тишчали, устки қисми (сирти) оддий ёки айрисимон тиканли. Ёнгоқчаси тўғри, узунлиги 7–10 мм. Апрельда гуллаб, май ойида мевалайди.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Сўх ва Исфара дарёлари ҳавзаларида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Очиқ оҳактошли ёнбағирларда ва дарё қирғоқларидаги гипсли кум-шағалли жойларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Абрим об-ҳаво қулай келган йиллари уругидан чиққан ниҳолларини кузатиш мумкин.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши ўсимлиكنинг қўпайишига салбий таъсир кўрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайд.

Манбалар. [159, 204, 270].

М.М. Набиев

Статус 1. Редкий эндемик Туркестанского хребта.

Краткое описание. Кустарник высотой 30–40 см с коленчато-извилистыми ветвями. Цветки белые. Околоцветник при плодах отогнут вниз. Плод продолговато-овальный, длиной 10–15 мм, шириной 7–10 мм, жёлтый или светло-красный. Крылья широко ланцетные, при основании с выемкой, наверху заострённые (не закруглённые). Края крыльев неравно-острозубчатые, на поверхности у края с простыми, реже вильчатыми щетинками. Орешек длиной 7–10 мм, прямой. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Ферганская область: Бассейны рек Сох и Исфара. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Открытые известняковые склоны и гипсированные песчано-галечниковые берега рек.

Численность. Не установлена.

Размножение. В отдельные благоприятные годы наблюдаются семенные всходы.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 204, 270].

М.М. Набиев



Rare endemic species of the Turkestan range. It is spread at the Sokh and Isfara river basins (Ferghana region). Inhabits open limestony slopes and gypseous sandy-pebble river banks. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



166. ПАЛЕЦКИЙ КАНДИМИ

Кандим Палецкого / *Calligonum paleczkianum* Litv.

Мақоми 3. Қизилқумдаги кичик майдонларда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 100–200 см баландликдаги эгри-бугри тирсаксимон шохланган бута. Гули оқ. Гулқўрғони меваляётганда пастга қараб эгилган. Меваси эллипс-шарсимон ёки деярли шарсимон, эни 40–50 мм, қизил. Қанотчалари ту-



хумсимон, эни 3–5 мм, туксиз. Четлари 1,5–3 мм ўйилган. Ёнгоқчаси 12–15 мм узунликда, тўғри, ҳар томонидан кўриниб туради. Апрель–май ойларида гуллайди, май–июнда мевалайди.

Тарқалиши. Бухоро вилояти: Қизилқумда (Денгизкул атрофларида) тарқалган. Туркменистон ва Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Мустаҳкамланган қум уюмларида ўсади.

Сони. Кам учрайди. Кичик-кичик тўплар ҳосил қилади.

Қўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик ўсиб турган майдонлардан чорвачиликда муттасил фойдаланилади, шунингдек, ўтин сифатида ишлатилади.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстиришга уриниб кўрилган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 204, 270].

М.М. Набиев

Статус 3. Редкий вид Кызылкума.

Краткое описание. Кустарник высотой 100–200 см с коленчато-извилистыми ветвями. Цветки белые. Околоцветник при плодах отогнут книзу. Плод эллиптически-шаровидный или почти шаровидный, шириной 40–50 мм, красный. Крылья овальные, шириной 3–5 мм, голые. Края крыльев до 1,5–3 мм надрезанные. Орешек длиной 12–15 мм, прямой, видимый со всех сторон. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Бухарская область: Кызылкумы – озеро Денгизкуль. За пределами Узбекистана: Туркменистан, Таджикистан.

Места обитания. Закреплённые грядово-бугристые пески.

Численность. Встречается очень редко, образуя небольшие популяции.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Усиленный выпас скота, заготовка на топливо.

Культивирование. Были попытки культивировать в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 204, 270].

М.М. Набиев



Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: around the Dengizkul Lake (Bukhara region). Inhabits fixed ridge-hilly sands. Very rarely forming small populations can be found. Limiting factors: over-pasturing. Measures of protection: not protected.

167. ЗОКИРОВ ҚАНДИМИ

Қандым Закирова / *Calligonum zakirovii* (Khalk.) F.O. Khass.

Мақоми 1. Қизилқумдаги кичик майдонларда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70–150 см, бироз эгри-гирсаксимон шохланган бута. Гуллари оқ, Гулқўрғони мевалаетганда пастга қараб эгилади. Меваси деярли шарсимон, эни 10–12 мм. Апрель–май ойларида гуллаб, май–июнда мевалайди.

Тарқалиши. Бухоро вилояти: Қизилқум чўл станцияси атрофида тарқалган.

Ўсиш шароити. Мустаҳкамлашган гипсли тепаликларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган. Кичик майдонларда жуда кам миқдорда тарқалган.

Қўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Ўсимлик тарқалган жойларда қўлаб чорва моллари боқилади. Шунингдек, ўтин сифатида ишлатилиши ўсимлик қўпайишига салбий таъсир қилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 204, 270].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 1. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Кустарник высотой 70–150 см со слабоколенчато-извилистыми ветвями. Цветки белые. Околоцветник при плодах отогнут вниз. Плод почти яйцевидный, розоватый, с плоскими чешуйками, 10–12 мм. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Бухарская область: Кызылкум – окрестности Кызылкумской пустынной станции.

Места обитания. Гипсы.

Численность. Не установлена.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 204, 270].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: nearby the Kyzylkum biostation. Inhabits gypseous slopes. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



ТОШБАҚАТОЛДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО РУТОВЫЕ -
RUTACEAE

168. БУХОРО ТОШБАҚАТОЛИ

Цельнолистник бухарский / *Harplophyllum bucharicum* Litv.

Мақоми 2. Жанубий Помир-Олойдати камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп поянли ярим бута, бўйи 15–35 см, шохлари туксиз. Барглари сал этли, наштасимон, бутун, деярли бандсиз. Тўпгули рўвасимон, ясси, камгулли. Қосача барглари тўқилмайди, чуқик-тухумсимон, тўмтоқроқ, узунлиги 1–1,5 мм. Гултожи сариқ, туксиз, кенг тухумсимон, тўмтоқ, қисқа 6–8 мм узунлидаги қайтақили. Чангчи иплари қўшилмаган, деярли тенг, безчали туклари йўқ, туксиз, асоси тўп тукли. Тугунчаси бандли, туксиз, бўртмали. Қўсаги бандли, очилмаган, туксиз, бўртмали, эни 4–5 мм. Май–июнда гуллаб, меваси июнь–августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқлари (Дехқонабод, Оқравоғ, Тойчи, Шўроб атрофлари) ҳамда Қўхитанг тоғолди худудларида тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Қизил қумтошли тупроқларда ўсади.

Сони. Шўробатрофида 120, Келиф-Шеробод (Зарабоғ) тепаликларида 200 га яқин туп борлиги аниқланган. Ареалининг бошқа қисмида сони аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиий майдонларнинг ўзлаштирилиши ва молларнинг қўплаб боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Мухофаза қилинмайди.

Манбалар. [159, 310].

Н.К. Раҳимова

Статус 2. Узколокальный эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многостебельный полукустарник высотой 15–35 см, с травянистыми голыми веточками. Листья чуть мясистые, ланцетные, цельнокрайные, почти сидячие. Соцветие метельчато-щитковидное, малоцветковое. Чашелистики остающиеся, продолговато-яйцевидные, туповатые, длиной 1–1,5 мм. Лепестки желтые, голые, широко яйцевидные, тупые, выпуклые, с очень коротким ноготком, длиной 6–8 мм. Нити тычинок свободные, почти равные, без железок, голые, при основании бородавчатые. Столбик толстый, голый. Завязь на ножке, голая, бугорчатая. Коробочка открывающаяся на ножке, голая, бугорчатая с придатками, шириной 4–5 мм. Цветет в мае–июне, плодоносит в июне–августе.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: юго-западные отроги Гиссарского хребта (окрест-

ности поселков Дехканабад, Акрабад, Тойчи, Шуроб), предгорья Кугитанга. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Краснопесчанники.

Численность. 120 растений в окрестностях Шуроба, 200 растений на Келиф-Шерабадской гряде (Зарабог). На остальной части ареала численность не известна.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Дегradация естественных местообитаний и выпас скота.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 310].

Н.К. Раҳимова



Rare endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the south-western branches of the Hissar range (around Dehkanabad, Akraabad, Toychi, Shurab villages), the piedmonts of the Kughitang range (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits red sandstones. 120 plants were revealed nearby the village Shurab, and 200 plants nearby Zarabag village. The numbers of the other populations is unknown. Limiting factors: degradation of gypsiferous slopes and pasturing. Measures of protection: not protected.

ТОШЁРАДОНШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО КАМНЕЛОМКОВЫЕ – SAXIFRAGACEAE

169. УГОМ БАДАНИ

Бадан угамский / *Bergenia ugamica* V.N. Pavlov

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шанга хос камёб, реликт тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30 см гача етадиган қўп йиллик ўт. Илдизпояси ва пояси йўғон. Ёпирма барглари бандли, қалин, узунлиги 15 см гача, эни 13 см, четлари қунгурали ёки қўшалок тишли. Тўпгули зич рўвак-қалқонсимон, безчасимон тукли. Гуллари тўқ пушти рангли. Чангчилари 10 та. Устунчаси 2 та. Июль-август ойларида гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Угом ва Писком тизмаларида тарқалган. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2 300–2 500 м баландликда қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Табиатда кичик тўплар ҳосил қилиб учрайди.

Қўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Угом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [19, 27, 159].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий, узколокальный, реликтовый вид Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см. Стебель толстый, переходящий в толстое корневище. Прикорневые листья черешковые, толстые, длиной до 15 см и шириной до 13 см, по краю неясно городчатые или двоякозубчатые. Соцветие плотное, метельча-

то-щитковидное, железисто опушенное. Цветки ярко-малиново-розовые. Тычинок 10, столбиков 2. Цветёт в июле-августе, плодоносит в августе.

Распространение. Ташкентская область: Угамский и Пскемский хребты. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Трещины скал в субальпийском поясе гор (2 300–2 500 м).



Численность. Встречается небольшими группами.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [19, 27, 159].

К.Ш. Тожибаев

Rare, relict species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam range: the Ugam valley (Tashkent region). Inhabits cracks of rocks in the subalpine zone (2 300–2 500 m.s.l.). The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



170. ХИСОР БАДАНИ

Бадам гиссарский / *Bergenia hissarica* Boriss.

Мақоми 2. Хисор тизмасига хос камёб, реликт, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см гача етадиган қўп йиллик ўт. Епирма барглари йирик, тескари-тухумсимон, тўмтоқ, четлари қаттиқ киприксимон тукли. Илдиз-пояси йўғон. Понси ер бағирлаб ўсади, денгли баргсиз. Тўпгуллари ёйиқ. Тожбарглари оқ рангли, йирик, юмалоқ, Уруғи майда. Май-июнь ойларида гуллайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Хисор тизмасида Тупаланг дарёси хавзаси (Тамшуш)да, Муш ва Хурватан қишлоқлари оралиғида, Шотрут дарёсининг Тупаланг дарёсига қуйилиш ерида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғлардаги қояларнинг ериқларида ва тошли тик ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайса керак.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари томонидан истеъмол қилиниши, ўзинга хос шароитда ўсганлиги учун ҳам камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [19, 27, 159].



Статус 2. Редкий, реликтовый эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение, с крупными розеточными обратнойцевидными, тупыми, по краю жёстко реснитчатыми листьями, высотой около 20 см. Корневище мощное. Стебель приподнимающийся почти безлистный. Соцветие рыхлое. Лепестки белые, крупные, округлые. Семена мелкие. Цветёт в мае-июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – река Тупаланг (Тамшуш) – между кишлаками Муш и Хурватан и по реке Шатрут у слияния с рекой Тупаланг.

Места обитания. Трещины скал и каменные крутые склоны гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. По-видимому, семенное.

Причины изменения численности и ареала. Поедается животными. Приуроченность к местообитаниям.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [19, 27, 159].

К.Ш. Тожибаев

Rare relict endemic species of the Hissar range. It is spread at the Hissar range: the Tupalang valley (Tamshush); between the villages Mush and Khurvatan and along the Shatrut river up to joining with the Kshutut river (Surkhandarya region). Inhabits cracks of rocks and stony steep slopes of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: confinedness to habitat, eating by animals. Measures of protection: not protected.



К.Ш. Тожибаев



ТУТДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ТУТОВЫЕ – MORACEAE

171. ЁВВОЙИ АНЖИР

Инжир дикий / *Ficus carica* L.

Мақоми 2. Марказий Осиё ҳудудига ҳос ниҳоятда камёб, ареали ажралган тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 5–8 м га етадиган дарахт ёки бута. Барглари навбат билан жойлашган. 3–5 бўлакли, пастки томони тукли. Тўпгули барг қўлтигида биттадан жойлашган, қисқа бандли, меваси ноксимон. Бир йилда икки-уч мартагача ҳосил беради. Апрель ойида гуллаб, меваси июль-август ойларида пишади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасида Сангардак ва Тўпаланг дарёларининг ҳавзаларида тарқалган. Тожикистон ва Туркменистонда ҳам ўсади.

Статус 2. Крайне редкий вид в Центральной Азии.

Краткое описание. Небольшое дерево или кустарник высотой 5–8 м, с очередными 3–5-лопастными, снизу пушистыми листьями. Соцветия пазушные, на коротких ножках, одиночные, грушевидной формы. Плод грушевидный. В год плодоносит 2–3 раза. Цветёт в апреле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – бассейны рек Сангардак, Тупаланг. За пределами Узбекистана: Китай, Таджикистан и Туркменистан.

Места обитания. Каменисто-щебнистые субстраты в долинах рек.

Численность. Не установлена.

Размножение. Корневыми отпрысками, пневой порослью и черенками.

Причины изменения численности и ареала. Повреждение морозами, селевыми потоками, заготовка на топливо.

Культивирование. Используется для выведения новых сортов инжира.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [205, 225].

Р.И. Казакбаев

Extremely rare species in Central Asia. It is spread at the Hissar range: the Sangardak and Tupalang river basins (Surkhandarya region). Inhabits stony substrates in the river valleys. The quantity is unknown. Limiting factors: damage by frosts, mud-streams. Measures of protection: not protected.

Ўсиш шароити. Дарё ҳавзаларида тошшағалли тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади.

Қупайиши. Вегетатив йўл билан (қаламчасидан ва бачкисидан) қупаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Қишқи совуқ, баҳорги селлардан зарар кўради. Шунингдек, ўтин сифатида ишлатилади.

Маданийлаштирилиши. Анжир навларини етиштиришда фойдаланилади.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [205, 225].

Р.И. Қозоқбоев



ТУЯТОВОНДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ -
ZYGOPHYLLACEAE

172. БУХОРО ТУЯТОВОНИ

Парнолистник бухарский / *Zygophyllum bucharicum* B Fedtsch.

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги паст тоғларда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м га етадиган сершоҳ бута. Барглари 2 баргчали, 5–7 мм узунликдаги бандлари орқали шохларга ўрнашган. Япроқчалари қалами, серэт, узунлиги 5–7 мм, ёш япроқчалари майин тукли, вақт ўтиши билан туксизланади. Тожбарглари сариқ, 10–12 мм узунликда. Меваси деярли шарсимон, туксиз, 5 уячали қутича, уячалари кенг қанотчали. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмаси ва Сурхондарёнинг қуйи оқимида тарқалган. Туркменистон ва Жанубий Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Паст тоғлардаги гипсли ола жинсларда ўсади.

Сони. 4 популяцияси (60 туп ўсимлик) борлиги аниқланган.

Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Майдони қисқариб бораётган ола жинсли ёнбағирларда ўсадиган реликт тур.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [30, 159, 310].

З.З. Эргашев

Статус 1. Редкий реликтовый эндемик Южно-Памиро-Алая.

Краткое описание. Очень корявый кустарник высотой до 1 м. Листья с 2 листочками, на черешках длиной 5–7 мм, на коротких веточках. Листочки очень мясистые, линейные, длиной 5–7 мм, молодые – слегка пушистые, взрослые – голые. Цветки жёлтые, длиной 10–12 мм. Плод голая, почти шарообразная 5-гнездная, по гнездам ширококрылая выемчатая коробочка. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Келиф-Шерабадская гряда (найден впервые на территории Узбекистана в 2009 г. в 5 км восточнее кишлака Акташ). За пределами Узбекистана: Туркменистан, Таджикистан.

Викарный вид *Z. dumosum* Boiss. в Палестине.

Места обитания. Краснопесчанниковые породы.

Численность. Зарегистрировано 4 популяции (60 кустов).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Реликтовый вид на сокращающихся пестроцветных склонах.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [30, 159, 310].

З.З. Эргашев



Rare, relict endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Kelif-Sherabad range (found for the first time in Uzbekistan, in 2009, 5 km to the east of village Aktash) (Surkhondaryo region). Inhabits dry gypseous rocks in the low mountains. 4 populations with 60 plants can be found. Limiting factors: relict species growing on the decreasing gypseous slopes. Measures of protection: not protected.



ЎЗУМДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ВИНОГРАДНЫЕ – VITACEAE

173. ЁВВОЙИ ТОК (ЎЗУМ)

Виноград винный (дикий) / *Vitis vinifera* L.

Мақоми 3. Ўзбекистондаги ареали ажралган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Узунлиги 30 м гача етадиган ўралиб ўсувчи ўсимлик. Барглари оддий, деярли юмалоқ, 3–5 бўлакли ёки панжасимон қирқилган, асоси ўйилган, четлари ўткир тишли ёки кунгирли.



Тўпгули тигиз ёки ёйиқ рўзак. Меваси турли ранг ва шаклда. Май–июнь ойида гуллаб, июль–октябрда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Сурхондарё, Тошкент вилоятлари; Нурота тизмаси (Гурдара ва Болосой даралари), Ҳисор тизмаси (Сангардак ва Тупаланг дарёлари ҳавзалари)да; Ғарбий Тянь-Шань – Писком, Угом, Қоржонтов, Чотқол тизмаларида тарқалган. Тожикистон, Қирғизистон ва Қозғистонда ҳам учрайди.



Ўсиш шароити. Дарё ёқалари, дараларда, шағал, майда зарра жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ёки кичик тўплар ҳосил қилиб тарқалган.

Қўпайиши. Уругидан ҳамда вегетатив йўл билан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқилиши ҳамда ўтин сифатида ишлатилиши натижасида қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Марказий Осиёдаги барча ботаника боғларида, махсус боғдорчилик таъриба участкаларида, селекция станцияларида янги навлар етиштиришда фойдаланилади.

Муҳофаза чоралари. Нурота ва Чотқол давлат қўриқхоналарида ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [91, 159].

Р.И. Қозғқбоев

Статус 3. Редкий вид Узбекистана с разорванным ареалом.

Краткое описание. Стелющаяся лиана длиной до 30 м. Листья простые, почти округлые, 3–5-лопастные или пальчато рассечённые, при основании с выемкой, по краю с тупыми или заострёнными зубцами. Соцветие – густая или рыхлая метёлка. Плод различной формы, величины и цвета. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–октябре.

Распространение. В Ташкентской, Жиззахской и Сурхандарьинской областях: хребет Нуратау – ущелья Болосай и Гурдара; Гиссарский хребет – бассейны рек Сангардак и Тупаланг; Западный Тянь-Шань – хребты Пскемский, Угамский, Каржантау и Чаткальский. За пределами Узбекистана: от Средиземноморья до Китая и Японии.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые склоны и долины рек, ущелья.

Численность. Встречается единичными экземплярами или небольшими группами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Использование на топливо и выпас скота.

Культивирование. По всей территории Центральной Азии в ботанических садах, специализированных питомниках и на селекционных станциях; используется для выведения столовых, кишмишных и винных сортов винограда.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском и Чаткальском заповедниках и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [91, 159].

Р.И. Казакбаев

Rare species in Uzbekistan with reducing area. It is spread at the Hissar range: the Sangardak and Tupalang valleys; the Nuratau range (Gurdara, Bolosay); the western Tien-Shan; the Pskem, the Karzhantau and Chatkal ranges (Tashkent, Jizzakh and Surkhandarya regions). Inhabits fine earth-slopes, river valleys, defiles. Single specimens or small groups can be found. Limiting factors: used as fuel, pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau and Chatkal nature reserves, the Ugam-Chatkal national park.

ХУРМОДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ЭБЕНОВЫЕ –
EBENACEAE

174. САФСАН ХУРМО

Хурма кавказская / *Diospyros lotus* L.

Мақоми 2. Жуда камёб, ареали қисқариб бораётган реликт тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–20 м га етadиган қўнгир қора пўстлоқли дарахт. Барглари мустақкам, қайишсимон, чўзиқ, узунлиги 15 см. Гуллари сарғиш-қизил, қўнгироқсимон, икки уйли. Чангчили гуллари примсонбонга тўпланган, уругчи гуллари якка-якка ёки бир нечтадан ўрнашган. Меваси этли резавор, шарсимон, эввалига қизғиш, кейинчалик қўнгир-қорамтир рангга киради. Май-июнда гуллаб, меваси октябрь-ноябрда пишади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Хисор тизмаси (Тупаланг ва Сангардак дарёлари ҳавзалари, Қўштут, Тамшуш, Хандиза қишлоқлари атрофлари)да тарқалган. Тожикистон, Кавказ, Кичик Осиё, Эрон, Хитой ва Японияда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки ва ўрта қисмларидаги дараларнинг шағалли ёнбағирлари, булоқларнинг бўйларида ўсади.

Сони. Кам учрайди, баъзан 5–15 тупи бирга ўсади.

Қўпайиши. Уругидан ва вегетатив йўл билан (бачкисидан) қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ҳўжалик мақсадлари учун ерларнинг ўзлаштирилиши, қурилиш ҳамда ўтин учун ишлатилиши туфайли камайиб кетмоқда.

Маданийлаштирилиши. Қадим замонлардан бери ареали доирасида экиб келинади. ЎзР ФА Ботаника боғида 1948 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [82, 159].

Р.У. Қадиров

Статус 2. Редкий реликтовый вид с сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Дерево высотой до 15–20 м с темно-серой корой. Листья продолговатые, длиной до 15 см, кожистые. Цветки желтовато-красные, колокольчатые, двудомные. Мужские цветки собраны в полузонтики, одиночные или по несколько. Плод шаровидная, мисистая ягода, вначале красноватая, затем черно-бурая с сизым налетом. Цветёт в мае-июне, плодоносит в октябре-ноябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет: бассейны рек Сангардак и Тупаланг, окрестности кишлаков Куштут, Тамшуш и Хандиза. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Кавказ, Малая Азия, Иран, Китай, Япония.

Места обитания. Щебнистые склоны ущелий близ родников в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Встречается редко, небольшими (по 5–15 деревьев) группами.



Размножение. Семенное и вегетативное (отводками).

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение территории. Используется в качестве строительного материала и на топливо.

Культипирование. С древних времен культивируется в пределах ареала. С 1948 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [82, 159].

Р.У. Кадыров

Very rare relict species with the reducing area. It is spread at the Hissar range: the Sandargak and Tupalang river basins, nearby the villages Kshtut, Tamshush and Khandiza (Surkhondaryia region). Inhabits slopes of gorges near springs in the lower and middle belts mountains. Growing in small groups (5–15 trees). Limiting factors: economic reclamation of the territory. It is used as building material and firing. Measures of protection: not protected.



ЧИЛОНЖИЙДАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО КРУШИНОВЫЕ – RHAMNACEAE

175. ЁВВОЙИ ЧИЛОНЖИЙДА

Ўсиби обхушөөвеннан / *Ziziphus jujuba* Mill.

Мақоми 2. Ареали кескин қисқариб бораётган кам-ёб, реликт, субтропик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 12 м гача етадиган тарвақайлаган, мевасиз шоҳларида барглари икки қатор жойлашган, ёнбаргчалари йирик тиканлардан иборат дарахт. Барглари чуқик тухумсимон, уч томирли, четлари тишсимон ўйилган. Гуллари майда, яшилроқ, уткир ҳидли. Меваси чуқик-юмалоқ ёки юмалоқ, диаметри 1.5 см гача етади. Июнь–сентябрь ойларида гуллаб, мева беради.



Тарқалиши. Тошкент, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ғарбий Тянь-Шань (Уғам, Чотқол, Қоржонтов тизмалари), Қўхитанг тизмаси – Боғлидара сойи ва Ҳисор тизмалари (Ғузур дарёси ҳавзасида, Шўруб, Қўштутсой, Зинчоб, Зарчов, Дуоба ва Тамшутсой юшлуклари атрофлари)да тарқалган. Тожикистон, Туркменистон, Кавказортида ҳам тарқалган. Бу тур Урта Ер денгизидан Япониягача тарқалган.

Ўсиш шароити. Қуруқ, шаталли, тошли ва юмшоқ тупроқли ёнбағирларда ҳамда дарё ва сой бўйларида ўсади.

Сони. Табиатда яқка-яқка ҳолда ва кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Қўнайиши. Уруғидан ва илдиз бачкиларидан қўнаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Меваларининг териб олинishi, тупларининг ўтин учун кесилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Исуда қадимдан мевали ва доривор ўсимлик сифатида экиб келинган. ЎзР ФА Ботаника боғида 1958 йилдан буён экиб келинади.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида ва Уғам-Чотқол миллий табиат боғида сақланади.

Манбалар. [83, 159].

Р.И. Қозоқбаев

Статус 2. Редкий реликтовый субтропический вид с резко сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Дерево высотой до 12 м с простёртыми ветвями и двурядными листьями с крупными колючими прилистниками на стерильных побегах. Листья продолговато-яйцевидные, трёхнервные, по краю зубчатые. Цветки мелкие, зеленоватые, с сильным запахом. Плод удлинённо-шаровидный, до 1,5 см в диаметре. Цветёт и плодоносит в июне–сентябре.

Распространение. В Ташкентской, Қашқадарьинской и Сурхандарьинской областях: Западный Тянь-Шань: Угамский, Чаткальский, Қаржантау; хребет Қўхитанг; Боғлидарасай, Ҳиссарский хребты; долина реки Ғузур, окрестности кишлаков Шўруб, Қўштутсай, Зинчоб, Дуоба и Тамшут. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Туркменистан и Закавказье, от Средиземноморья до Японии.

Места обитания. Сухие, щебнистые, каменистые и мягкие склоны вдоль саев и рек.

Численность. Встречается единичными экземплярами, редко – небольшими группами.

Размножение. Семенное и корневыми отпрысками.

Причины изменения численности и ареала. Сбор плодов, заготовка на топливо.

Культивирование. В культуре с древних времен как плодое и ценное лекарственное растение. С 1958 года культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [83, 159].

Р.И. Қозоқбаев

Rare relict subtropical species with reducing area It is spread at the western Tien-Shan: the Ugam, the Chatkal, the Korzhantau ranges, the Hissar range: the Guzar river valley, nearby the villages Shurub, Kushtutsai, Zinchob, Duoba and Tamshut, the Kughitang range: the Boglidara valley (Tashkent, Kashkadarya and Surkhondarya regions). Inhabits dry, stony and soft slopes along the rivers. Single specimens, rarely small groups can be found. Limiting factors: picking of fruits, felling for fuel wood. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve and the Ugam-Chatkal national park.



ЧИННИГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ГВОЗДИЧНЫЕ – CARYOPHYLLACEAE

176. КАЧИМСИМОН ЕТМАК (БЕХ)

Аллохруза качимовидная / *Allochrysa gypsophiloides* (Regej) Schischk.

Мақоми 3. Марказий Осиё тоғларидаги ареали кескин қисқариб бораётган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–60 см орасидаги кўп йиллик ўт. Пояси ингичка, кўп. Барглари 10–25 мм узунликда, ясси, қалами, тикансиз. Гуллари пушти ранг, поянинг тепасида ёйиқ рўнаксимон тўнгул ҳосил қилади. Меваси – қўсаксимон. Май–август ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Наманган, Жиззах, Самарқанд, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Қурама, Чотқол, Молғузар, Нурота, Ҳисор, Қўхитанг ва Зарафшон тизмаларида тарқалган. Ўзбекистон, Қирғизистон ва Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Деңгиз сатҳидан 400–1400 м баландликда тошли ва шағалли ёнбағирларда ва баъзан ташландиқ ерларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ёки кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Листья длиной 10–25 мм, плоские, линейные, не колючие. Цветки бледно-розовые, собраны на концах веток в рыхлое, раскидистое, метельчатое соцветие. Плод – коробочка. Цветёт в мае–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Ташкентской, Наманганской, Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях: Кураминский, Чаткальский, Мальгузарский, Нуратинский, Кугитангский, Гиссарский и Зеравшанский хребты. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны на высоте 400–1400 м; иногда заброшенные пашни.

Численность. Встречается небольшими популяциями и единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Усиленная промышленная заготовка и сбор населением в качестве лекарственного сырья. Широкое использование в быту, в текстильной, меховой, кондитерской и фармакологической промышленности.

Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском, Китабском, Чаткальском заповедниках и Угам-Чаткальском национальном парке. Необходимо расширение промышленных плантаций. После восстановления запасов следует ввести строго лицензионный сбор.

Источники. [21].

Ф.О. Хасанов

Endemic of mountains of Central Asia with the strongly reducing area. It is spread at the Kurama, the Chatkal, the Malguzar, the Nuratau, the Hissar, the Kughitang and Zerafshan ranges (Tashkent, Namangan, Jiz-zakh, Samarkand, Kashkadarya, Surkhondarya regions). Inhabits stony slopes at a height of 400–1400 m; sometimes neglected arable lands. Small populations, single specimens can be found. Limiting factors: collecting as medicinal plant. Measures of protection: protected in the Surkhan, the Kitab and Chatkal nature reserves and the Ugam-Chatkal national park. It is necessary to enlarge the industrial plantation. After the restoration of stocks it is necessary to introduce strongly licensed picking.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан саноат хомашёси ва доривор ўсимлик сифатида кўплаб йиғиб олинади. Етмакдан тўқимачилик, мўйначилик, қандолатчилик саноатида, табобатда ва қўндалик ҳаётда кенг фойдаланилади. Шунинг учун у камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Сурхон, Китаб, Чотқол ҳўриқоналари ва Угам-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади. Саноат эҳтиёжи учун экиладиган майдонларни кенгайтириш керак. Табиатда етмакзорлар тикланганидан сўнг ҳам уни масъул идоралар иккзати билан йиғиш лозим.

Манбалар. [21].

Ф.Ў. Хасанов

Статус 3. Эндемик горных районов Центральной Азии с сильно сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30–60 см. Стебли тонкие, их несколько.

177. МИХЕЛЬСОН ЗҶҲАСИ

Смолевика Михельсона / *Silene michelsonii* Preobr.

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–30 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояларининг асоси жуда кўп қуриб қолган барг қолдиқлари билан ўралган. Барглари чўзиқроқ тескари тухумсимон, учи ўткир. Косачаси сал пуфаксимон, юпқа, цилиндр-қўнғироқсимон, 10 та томирли. Тожбарги оқ, туксиз. Июнда гуллаб, меваси июль ойида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Қояларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Мавбалар. [22, 310].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 1. Очень редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 25–30 см, с многочисленными сухими остатками листьев у основания. Листья продолговато-йцевидные, на верхушке внезапно оттянутые в короткое остроконечие. Чашечка слегка вздутая, перепончатая, цилиндрически-колокольчатая, с 10 жилками. Лепестки белые, голые. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет.

Места обитания. Скалы.

Численность. Встречается единично.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [22, 310].

Ф.О. Ҳасанов

Very rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range (Surkhandarya region). Inhabits rocks. Single specimens can be found. Measures of protection: not protected.



178. МОМИҚ ЗЎРЧА

Смолевка пушистая / *Silene tomentella* Schischk.

Мақоми 2. Қизилқумдаги қолдиқ тоғларда тарқалган жуда камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30-40 см оралигидаги қўп йиллик ўт. Поиси қўп, пастки қисми ёғочланувчи. Барглари ингичка наштартсимон, 4-6 см узунликда, эни 3-5 см, поининг пасткидагилари ингичкалашиб бориб, бандга айланган, юқорисидаги барглари анча майда. Тўпгули шингилсимон. Косачаси цилиндрсимон, тўгнагичсимон, узунлиги 18-20 мм. Тожбарги оқиш, косачадан бир ирим марта узун. Тожбаргининг 2/3 қисми қирқилган. Меваси қўсакча, тухумсимон, узунлиги 11 мм, эни 6 мм.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: Қизилқумдаги қолдиқ тоғлар (Оқтоғ ва Қулжуктоғ)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғларда, тошларнинг бўлаклари орасида ва тошли қуруқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. Умумий сони аниқланмаган.

Қўпайиши. Уругидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [22, 310].

Ф.Ў. Ҳасанов

Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведений нет.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [22, 310].

Ф.О. Хасанов

Very rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Aktau, the Kuldjuktai (Bukhara and Navoi regions). Inhabits fragments of stones, dry stony slopes of low mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



Статус 2. Очень редкий эндемик останцевых гор Кызылкумов.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30-40 см. Стебли многочисленные, при основании древеснеющие. Листья узколанцетные, длиной 4-6 см, шириной 3-5 см, нижние оттянутые в длинный черешок, верхние более мелкие. Соцветие кистевидное. Чашечка цилиндрическая, булавовидная, длиной 18-20 мм. Лепестки беловатые, в 1,5 раза длиннее чашечки. Пластика лепестка на две трети надрезанная. Коробочка яйцевидная, длиной 11 мм, шириной 6 мм. Цветёт в мае, плодоносит в июле.

Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: Кызылкумы – останцевые горы Актау, Кульджуктау.

Места обитания. Обломки камней, сухие каменистые склоны останцевых гор.

Численность. Не установлена.

Размножение.



179. ПОПОВ ЗҮРЧАСИ

Смолевка Попова / *Silene popovii* Schischk.

Мақоми 2. Зарафшон тизмасидаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Баландлиги 20–25 см га етадиган сершоҳ ва сербарг кўп йиллик ўт. Гул-пойсининг узунлиги 15–20 см. Мевасиз пояси ва поянинг пастки қисмидаги барглари ингичка чизикли, поянинг юқорисидагилари учли-наштарсимон. Гуллари поянинг учида 3–7 тадан жойлашган. Гулдан баргчалари ўтсимон, поянинг юқори қисмида жойлашган барглarga ўхшаш. Косачаси цилиндрсимон, узунлиги 13–15 мм. Тож-барглари оч пушти рангли. Қўсакчаси чўзиқ, узунлиги 10 мм. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.



Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмаси (Кўхи-Сурх, Жонқора тоғлари ва Тахта-Қорача доволари)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки қисмида ва тоғ этакларидаги шағалли ва оҳақтошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Умумий сони аниқланмаган.

Қўпайиши. Уругдан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [22, 97, 310].

Ф.Ў Ҳасанов

Статус 2. Очень редкий эндемик Зеравшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 20–25 см с многочисленными бесплодными густо-облиственными побегами. Цветоносные стебли высотой 15–20 см. Листья бесплодных побегов и нижние стеблевые узко-линейные, верхние стеблевые – линейно-ланцетовидные. Цветки на верхушке стебля в количестве 3–7. Прицветники травянистые, сходные с верхними листьями. Чашечка цилиндрическая, длиной 13–15 мм. Лепестки яркорозовые. Коробочка продолговатая, длиной 10 мм. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях; Зеравшанский хребет – Кухи-Сурх, Джан-Кара, перевал Тахта-Карача.

Места обитания. Щелнистые и известковые скалы в предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [22, 97, 310].

Ф.О. Ҳасанов

Very rare endemic species of the Zerafshan range. It is spread at the Zerafshan range; the Kukhi-Surkh, the Djan-Kara, the Takhta-Karacha pass (Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits calcareous rocks in the foothills and lower mountain belt. The quantity is unknown. Measures of protection; not protected.



180. ТОҒ ЗҶҮРЧАСИ

Смолевка горная / *Silene oreina* Schischk.

Мақоми 1. Зарафшон тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик, кўп бошчали (каудексли) ва кўп пояли, бўйи 10–15 см орасидаги ўт. Баргларининг учи чўзилган, жуда ўткир, безчасимон қалин туклар билан қопланган. Илдиз бўғизидagi барглари тескари наштасимон, асосига қараб ингичкалашиб боради. Поядаги барглари кенг чўзиқ, гуллари оқ, поянинг учида 1–3 тадан ўрнашган. Косачаси гулидан 2–3 марта узун, дастлаб цилиндрсимон, кейинроқ қуңғироқсимон шакли. Карпофори туксиз. Қўсаги тухумсимон. Май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари; Зарафшон тизмаси (Аллаиришан, Оқсой, Оғалик ва Тарағай қишлоқлари атрофлари) да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тошли, тошшағалли жойларда ва қояларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди. Якка-якка ҳолда тарқалган.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқиладиган ерларда ўсимлик жуда катта зарар кўради.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.



Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [22, 310].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 1. Редкий эндемик Зеравшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с многоглавым каудексом и многочисленными стеблями длиной до 10–15 см. Листья на верхушке оттянутые, очень острые, густоопушенные железистыми волосками. Прикорневые листья – обратноланцетные, к основанию суженные, стеблевые широко-продолговатые. Цветки белые, на верхушках стеблей, по 1–3. Чашечка в 2–3 раза длиннее цветков, вначале цилиндрическая, позднее колокольчатая. Карпофор голый. Коробочка яйцевидная. Цветёт в мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях: Зеравшанский хребет – Аллаиришан, Аксай, Агалык, Тарагай.

Места обитания. Каменистые, каменисто-щебнистые и скалистые субстраты.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. В культуре не известен.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [22, 310].

Ф.О. Ҳасанов

Rare endemic species of the Zerafshan range. It is spread at the Zerafshan range: Allairishan, Aksai, Agalyk, Taragay (Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits stony, stony and rocky substrates. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



181. НАТАЛИЯ ЗҶҶРЧАСИ

Смолевска Наталия / *Silene nataliae* F.O. Khass.

Мақоми 1. Қўхитанг тизмасидаги реликт эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Ярим бутача. Барглари илдиз бўғизидан жойлашган, бўлмали, узунлиги 3–5 см, иккала томони оддий ёки безчали туклар билан қопланган. Гуллари 3–6 та. Косачаси оддий ва безчали туклар билан қалин қопланган, кенг қўнғироқсимон, пуштиранг, узунлиги 12–14 мм, тишчаларининг узунлиги 2–4 мм, гултожи сариқ, юқори қисми пуштиранг, қайтақиси 5–6 мм узунликда, икки бўлакли, тишчасиз. Чангчи ва устунчаси туксиз. Карпофори 4–5 мм узунликда, туксиз. Қўсагининг узунлиги 6–7 мм, туксиз. Июлда гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Қўхитанг тизмаси (Сурхондарё вилояти)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2 200 м баландликдаги қояларнинг шимолий ёнбағирларида ўсади.

Сони. 60 туп ўсимликдан иборат 3 та популяцияси аниқланган.

Қўпайиши. Уругдан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Қисқа эреалга эга махсус жойдагина ўсишга мослашган (стенобионт) реликт ўсимлик.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалари. [309].

Ф.Ў Ҳасанов

Цветков 3–6. Чашечка густо покрыта простыми и железистыми волосками, широко колокольчатая, розоватая, длиной 12–14 мм с зубцами длиной 2–4 мм. Лепестки желтые, изверху фиолетово окрашенные. Тычинки и столбик голые. Карпофор длиной 4–5 мм, голый. Коробочка длиной 6–7 мм, голая. Цветет в июле, плодоносит в августе.

Распространение.

Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг (Мачайлы).

Места обитания.

Скалы северных экспозиций на высоте 2 200 м.

Численность. 3 популяции (60 растений).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Узколокальный реликтовый стенобионт.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [309].

Ф.О. Ҳасанов

Very rare relict endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang range; Machayli (the Surkhandarya region). Inhabits rocks (2 200 m.s.l.), 3 populations (60 plants) can be found. Limiting factors: relict stenobiont. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.

Статус 1.

Эндемичный реликтовый вид хребта Кугитанг.

Краткое

описание.

Полукустарничек с прикорневой розеткой лопатчатых листьев длиной 3–5 см, опушенных с обеих сторон простыми и железистыми волосками. Стебли длиной 15–30 см, густо железисто-волосистые.



182. БЕЗЧАЛИ ЗҶҶҶА

Смолетка почтижелтая / *Silene parviflora* Bondarenko et Vred.

Мақоми 2. Шимоли-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўт ўсимлик, баландлиги 30–50 см, поялари кўп, асосига яқин жойлари қаттиқ ёғочсимон. Барглари наштақсимон, узунлиги 3–6 см, эки 10–12 мм. Гуллари шохчаларининг учларида биттадан жойлашган. Яирик, узунлиги 30–32 мм. Гултожи оқ-пуштиранг, чуқур иккига бўлинган. Косачаси тўғнағичсимон цилиндр шаклида, шишмайди, узунлиги 22–25 мм, найчаси туксиз, тишчалари оқ тукли. Меваси кўсак, узунлиги 10–12 мм. Апрель–июнда гуллаб, меваси етилади.

Тарқалиши. Нурота ва Молгузар тизмаларида тарқалган (Жиззах, Навоий ва Самарқанд вилоятлари).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмларидаги майда чاغир тошли шимолий ёнбағирларда, бутазорлар орасида ўсади.

Сони. Кам тарқалган, яқка-яқка ёки кичик гуруҳлар ташқил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Молларнинг кўпдаб боқилиши ва табий муҳитнинг салбий таъсирида камайиб кетган бўлса керак.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаз чоралари. Нурота давлат қўриқонасида муҳофаз қилинади.

Манбалар. [17, 22, 310]

И.В. Белодипов

Статус 2. Редкий эндемик Северо-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30–50 см. Листья ланцетные, длиной 3–6 см и шириной 10–12 мм. Цветки на концах веточек одиночные, довольно крупные, длиной 30–32 мм, с бело-розовыми глубоко двураздельными лепестками. Чашечка булавовидно-цилиндрическая, невздувающаяся, длиной 22–25 мм, с голой трубкой и бело-войлочными зубцами. Плод – коробочка длиной 10–12 мм. Цветёт и плодоносит в апреле–июне.

Распространение. В Джизакской, Навоийской и Самаркандской областях: хребты Мальгузар и Нуратау.

Места обитания. Произрастает на мелкоземистых склонах преимущественно северной экспозиции в среднем поясе гор, среди кустарников.

Численность. Встречается спорадически, единично или группами по несколько растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нуратинского государственного заповедника.

Источники. [17, 22, 310].

И.В. Белодипов



Rare endemic species of the north-western Pamir-Alay. It is spread at the Malguzar and Nuratau ranges (Jiz-zakh, Navoi and Samarkand regions). Inhabits soil slopes of the northern exposition in the middle mountainous zone. Single specimens and small groups occur sporadically. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



183. БИГИЗСИМОН ОҚТИКАН

Колёчелистник белокатый / *Acanthophyllum albidum* Schischk.

Мақоми 3. Фарғона водийси адирларида сақланиб қолган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Баландлиги 30 см га етадиган, ёғочланувчи ярим бута. Барглари бигизсимон, понда қарама-қарши жойлашган, узунлиги 2–4 см, эни 1,5 см. Гуллари пояларининг учида, диаметри 5 см га етадиган қалқонсимон тўпгул ҳосил қилиб жойлашган. Косчаси найсимон, узунлиги 6–7 мм. Тожбарглари оқ, асоси сал пушти ранг, эни 1,5 мм.

Тарқалиши. Фарғона, Наманган вилоятлари: Фарғона водийсида денгиз сатҳидан 500–800 м баландликда тарқалган.

Ўсиш шароити. Тошли ва майда зарра жинс тупроқли адирларда ўсади.

Сони. Поп адирлари (Чодаксой ҳавзаси)да якка-якка ҳолда тарқалган, 10 м² да ўртача 3–4 тупи ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Оқтикан ўсиб турган ерларнинг қишлоқ хўжалик экинлари (ғалла ва бошқалар) учун ўзлаштирилиши ареалининг қисқариб кетишига сабаб бўлди.

Маданийлаштирилиши. Бу тур ЎЗР ФА Ботаника боғида маданий шароитда экиб ўстирилган. Уруғининг униб чиқиши 1 фойздан кам эканлиги аниқланган.

Муҳофаза чоралари. Мавжуд туплари қатъий назорат остига олиниши керак.

Манбалар. [21, 347].

Н.Ю. Бешко

Статус 3. Очень редкий узкий эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 30 см, сильно древеснеющий. Листья игловидные, супротивные, длиной 2–4 см, шириной 1,5 см. Цветки собраны из конце стебля в щитковидные, до 5 см в диаметре, соцветия. Чашечка трубчатая, длиной 6–7 мм. Лепестки белые, у основания чуть розовые, шириной 1,5 мм. Цветет в мае, плодоносит в июле.

Распространение. В Ферганской и Наманганской областях: растёт на адырах на высоте 500–800 м.

Места обитания. На каменистых, каменисто-мелкоземистых почвах.

Численность. В Папских адырах встречается одиночными экземплярами, по 3–4 на 10 м².

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение территорий под зерновые и другие культуры.

Культивирование. Выращивался в культуре в Ботаническом саду АН РУз. Полевая всхожесть семян очень низкая – менее 1 %.

Меры охраны. Необходим строгий контроль за состоянием популяций.

Источники. [21, 347].

Н.Ю. Бешко

Very rare endemic species of the Ferghana valley. It grows in foothills at the height of 500–800 m (Ferghana and Namangan regions). Inhabits stony, stony-fine earth soils. Populations are about 3–4 plants on 10 sq. m. in the Pap hills. Limiting factors: development of the territories for crops cultivation. Measures of protection: strict control of the state of populations is necessary.



184. НИНАСИМОН ОҚТИКАН

Колючелистник горбатоприцветниковый / *Acanthophyllum cyrtostegium* Vred.

Мақоми 3. Қизилқумдаги қолдиқ тепаликларда сақланиб қолган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–30 см га етадиган, поясининг пастки қисми ёғочланувчи, қўп пояли ирмбута. Барглари игнасимон, уч қиррали, тиканли. Гулларди баргчалари деярли қалами, тиканли, асоси бўрттикли. Гуллари учтадан поянинг учидаги қуббасимон тўпгулда, узун гулбандларда ўрнатишган. Косачаси цилиндрсимон. Тожбарги 15–16 мм узунликда, пушти рангли. Тугунчаси 4 уруғ куртакли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилиди.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари; Қизилқумдаги қолдиқ тоғлар (Қулжуктоғ, Овминза тоғи, Қингиртоғ ва Қўкчаттоғ)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Қумларда, тош-қумли ерларда ва ола жинсларда ўсади.

Сони. Сийрак ҳолда тарқалган, баъзан қумоқ ерларда 3–5 ўсимликдан ташкил топган кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ёш ниҳолларини қорва моллари тепкилаб ташлайди.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғи тажриба далаида 1979–1989 йиллари ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Мавжуд ўсимлик тўпларини назорат остига олиш ва ёш ниҳолларини қорва молларидан муҳофаза қилиш лозим.

Манбалар. [21].

Н.Ю. Бешко

Статус 3. Очень редкий эндемик останцевых возвышенностей Кызылкумов.

Краткое описание. Многолетний, у основания древеснеющий, с многочисленными стеблями полукустарник высотой до 20–30 см. Листья игловидные, трёхгранные, очень колючие. Прицветники почти линейные, колючие, при основании горбатые. Цветки в трёхцветковых дихазиях на довольно длинных цветоножках в шишковидных соцветиях на верхушках стеблей. Чашечка цилиндрическая. Лепестки розовые, длиной 15–16 мм. Завязь с 4 семяпочками. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Навоийской и Бухарской областях: Куджуктау, Ауминзатау, Кингиртау, Кокчатау.

Места обитания. Пески, каменисто-песчаные субстраты, выходы пестроцветных пород.

Численность. Встречается разрежено, единично, редко образует небольшие группы из 3–5 растений на песчаных местах.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Вытаптывание всходов скотом.

Культивирование. В 1978–1985 гг. культивировался на опытном участке Ботанического сада АН РУз.

Меры охраны. Необходимо ввести контроль за популяциями и охранять молодые всходы от вытаптывания.

Источники. [21].

Н.Ю. Бешко

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Kuldjuktai, the Auminzatau, the Kingirtai, the Kokchatau (Navoi and Bukhara region). Inhabits sands, stony-sandy substrates, outcrops of gypsaceous beds. Solitary specimens or small groups of 3-5 plants can be found sporadically in sandy places. Limiting factors: trampling down of seedlings by cattle. Measures of protection: it is necessary to control populations and protect young seedlings from trampling down.



185. ЎЗБЕКИСТОН ЧИННИГУЛИ

Гвоздика узбекистанская / *Dianthus uzbekistanicus* Link.

Мақоми 3. Помир-Олойнинг ғарбий қисмидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пойлари кўп, оддий, баъзан юқори қисмидан шохланган, туксиз, пастки қисми ғадирбудур, узунлиги 20–35 см. Барглари кўкимтиришил, ўткир учли. Гуллари яқка-яқка, асоси қалин тукли, пушти рангли. Меваси – кўсакча, кўп уруғли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд, Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмаси (Тахта Қорача довои, Қизилотма ва Тарагай қишлоқлари атрофлари) ва Ҳисор тизмаси (Боғча қишлоғи атрофи)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тош-шағалли жойларда, тош ва оҳақтош синиқлари ва ёриқлари орасида ўсади.

Сони. Бир гектар ерда 40–100 тагача тупдан иборат тўплар ҳосил қилади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари гулдасталар учун узиб олинад. Чорва моллари истеъмол қилади.

Маданийлаштирилиши. 1965 йилдан бошлаб ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофиза чоралари. Айрим популяциялари Китоб давлат қўриқхонасида муҳофиза қилинади. Гуллари юлинишининг олди олиниши лозим. Шунингдек, уруғи етилиб, тарқалиши учун гуллаган ва мевалаган пайтида чорва моллари боқилиши чеклаш тавсия этилади.

Манбалар. [23, 159].

Н.Ю. Бешко

Статус 3. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 40 см. Стебли длиной 20–35 см, многочислен-

ные, простые, в верхней части иногда ветвящиеся, голые, внизу шероховатые. Листья синевато-зелёные, острые. Цветки розовые, одиночные, у основания с обильными волосками. Плод – коробочка с многочисленными семенами. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях: Зеравшанский хребет – перевал Тахта-Карача, окрестности кишлака Кызыл-Алма, Тарагай; Гиссарский хребет – окрестности кишлака Бахча.

Места обитания. Каменисто-щебнистые субстраты, среди камней и известняковых обломков, трещины скал.

Численность. Образует небольшие популяции от 40 до 100 экземпляров на 1 га.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветков. Выпас скота.

Культивирование. С 1965 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Часть популяций охраняется на территории Китабского заповедника. Необходимо ограничить выпас в периоды цветения и плодоношения растений с целью сохранения семян для расселения вида; запретить сбор цветков.

Источники. [23, 159].

Н.Ю. Бешко

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Zerafshan range: the Takhta-Karacha passage, nearby the villages Kyzyl-Alma, Taragai; the Hissar range: nearby the village Bakhcha (Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits stony substrates, among stones and lime-stone fragments, clefts of rocks. Forms small populations containing from 40 to 100 specimens per 1 hectare. Limiting factors: picking of flowers, pasturing. Measures of protection: some populations protected in the Kitab state nature reserve. It is necessary to limit pasturing in the periods of plant flowering and fruiting to reserve seeds for the species distribution; to forbid picking of flowers.



ЧИНОРДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ПЛАТАНОВЫЕ –
PLATANACEAE

186. ШАРҚ ЧИНОРИ

Платан восточный / *Platanus orientalis* L.**Мақоми 3.** Ареали ажралган камёб, реликт тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30 м га етадиган кенг шох-шаббали дарахт. Барги панжасимон қирқилган, 5–7 бўлакли, эни 12–18 см. Бўлаклари чуқуқроқ, ўйилган, йирик тишчали. Гуллари бир жинсли, шарсимон тўпгулга йиғилган. Мевади каллакчаси 2–7 тадан, диаметри 2–5 см атрофида. Меваси ёнгоқчасимон, тумшукчали, ётиқ қалин туклар билан қопланган. Апрель ойида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

роидные соцветия. Плодовые головки по 2–7, около 2–5 см в диаметре. Плоды орешкообразные с носиком, по всей поверхности опушенные жесткими прижатыми волосками. Цветёт в апреле, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областях: Гиссарский хребет – бассейны рек Сангардак, Тупаланг, Обизаранг, Кашкадарья. Общее распространение: Средиземноморье – от Балканского полуострова до Гималаев.

Места обитания. Берега рек, у родников, на наносных легких галечниковых почвах в среднем поясе гор.

Численность. Одиночные деревья, небольшие группы деревьев и очень редко рощи, не образующие сплошных массивов.

Размножение. Семенное и вегетативное (корневыми отпрысками).

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственная деятельность, заготовка на топливо.

Культипирование. Очень популярная древесная порода, с давних времен используемая для озеленения поселений в Центральной Азии и других регионах.

Меры охраны. Большинство вековых деревьев и естественные рощи объявлены памятниками

природы.

Источники. [45, 159].

Р.И. Казакбаев

Тарқаллиши. Сурхондарё, Қашқадарё вилоятлари; Ҳисор тизмасида Сангардак, Тупаланг, Қашқадарё, Обизаранг дарёларининг ҳавзаларида ўсади. Ўрта Ер денгизи – Болқон яриморлидиган Ҳималайгача тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоёларнинг ўрта қисмида, дарё бўйларида, булоқлар атрофида, тошлоқларда ўсади.

Сони. Одатда яқка-яқка ҳолда ўсади. Баъзан кичик чинорзорлар ташкил қилади.

Қўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан (илдиз ва бачқисидан) қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Турли эҳтиёжлар учун кесиб кетилиши тобора камайиб кетишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Жуда қадимдан манзарали дарахт сифатида барча суғориладиган ерлар (Марказий Осиё ва бошқа жойлар)да экиб келинади.

Муҳофаза чоралари. Асрга тенгдош йирик чинорларнинг ҳар бири назорат остига олинган ва давлат томонидан қўриқланади.

Манбалар. [45, 159].

Р.И. Қозоқбоев

Статус 3. Редкий реликтовый вид с разорванным ареалом.

Краткое описание. Дерево высотой до 30 м, с широкой, раскидистой кроной. Листья 5–7-лопастные, шириной 12–18 см. Лопасты продолговатые, выемчато-крупнозубчатые. Цветки однополые, собраны в ша-

Rare relict species with the reducing area. It is spread at the Hissar range, the Sangardak, the Tupalang, the Obizarang, the Kashkadarya basins (Surkhondarya and Kashkadarya regions). Inhabits river banks, near springs, alluvial light pebble soils in the middle belt of mountains. Single trees, small groups of trees and rarely small groves. Limiting factors: antropogenic factor. Measures of protection: limiting the majority of venerable trees and natural groves are nature sanctuaries.



ЧУЧМОМАДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО АМАРИЛЛИСОВЫЕ - AMARYLLIDACEAE

187. АРАЛАШ ПИЁЗ

Лук смешанный / *Allium praemixtum* Vved.

Мақоми 1. Нурота ва Ғарбий Тянь-Шаннинг жануби-ғарбий қисмида жуда кам тарқалган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 150 см га етадиган куп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 5 см гача, қармсимон, қизил-қўнғир рангли қобик билан ўралган. Пояси ғовак, ярмидан паста пуфаксимон шишган, асоси баргларининг новлари билан ўралган. Барглари цилиндрсимон, найсимон, тўғри, учига қараб ингичкалашиб боради. Тупғули шарсимон, тигиз. Юлдузсимон гулқўрғон бўлакчалари оқ-яшил томирли. Июнда гуллаб, меваси июль ойида етилади.

Тарқалиши. Навоий, Самарқанд, Жиззах, Тошкент вилоятлари: Қурама, Нурота ва Октоғ тизмаларида тарқалган. Тожикистонда учрайди.

Ўсиш шароити. Деңиз сатҳидан 900–1 200 м баландликда қоя тошларнинг ёриқлари, тошли ёнбағирлар ва оҳактошли ерларда ўсади.

Сони. 1 000 га яқин тупи борлиги аниқланган.

Қўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан озуқа сифатида йиғиб олинади. Унинг табиий ҳолда қўпайишига ҳам салбий таъсир қилувчи омиллар бўлса керак.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника ботида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Нурота қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [18, 58, 362, 364].

Н.Ю. Бешко

Статус 1. Очень редкий эндемик Нуратинских гор и Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой до 150 см. Луковица яйцевид-

ная, до 5 см в диаметре, с красно-бурыми кожистыми оболочками. Стрелка полая, ниже середины вздутая, при основании одета расставленными влагалищами листьев. Листья цилиндрические, дудчатые, прямые, к верхушке утончающиеся. Соцветие густое, шаровидное. Листочки звездчатого околоцветника белые с зеленой жилкой. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Ташкентской областях: горы



Нуратау, Актау, Кураминский хребет. За пределами Узбекистана: Таджикистан (Моголтау).

Места обитания. Каменистые склоны и трещины известняковых скал в среднем поясе гор, на высоте 900–1 200 м.

Численность. Около 1 000 растений.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор населением.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [18, 58, 362, 364].

Н.Ю. Бешко

Very rare endemic species of the Nuratau mountains and the western Tien-Shan. It is spread at the Nuratau, the Aktau, the Mogoltau mountains and of the Kurama range (Samarkand, Navoi, Jiz-zakh, Tashkent regions). Inhabits stony slopes and clefts of limestone rocks in the middle belt of mountains, at the altitude of 900–1 200 m.s.l. 1 000 plants can be observed. Limiting factors: collecting by local people. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



188. АФЛОТУН ПИЁЗИ

Лукафлатунский / *Allium afbatunense* B. Fedtsch.

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шанга хос ареали ажралган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80–200 см оралигидаги қўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи йирик, диаметри 6 см гача етади. Қобиги қора-қулранг. Поясининг тубини эни 10 см келадиган тасмасимон барглари ўраб олган. Тўнгули шарсимон, гуллари қўп ва тигиз, юлдузсимон гулқўрғон бўлакчалари оч бинафша рангли. Май-июнь ойларида гуллаб, уруғи июнь-июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Писком, Угом, Чотқол тизмаларида тарқалган. Қирғизистонда, Чотқол ва Фарғона тизмаларида учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва юқори қисмларида ўтлар билан қопланган ёнбағирларда ва дарё бўйларидаги сизот сувлари унча қўп бўлмаган жойларда ўсади.

Сони. Бир-биридан ажралган ҳолда кичик-кичик тўғлар ташкил қилади.

Қўпайиши. Асосан уруғидан ва вегетатив йўл билан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Пиёзининг маҳаллий аҳоли томонидан озуқа сифатида ишлатиш ҳамда доривор ва манзарали ўсимлик сифатида томорқа ерларига экиш учун қазиб оlinиши, куз ва қишда турли ҳайвонлар томонидан пиёзларининг ейилиши камайиб кетишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [58, 362, 364].
Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 1. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня с разорванным ареалом.

Краткое описание.

Многолетнее луковичное растение высотой 80–200 см. Луковица крупная, до 6 см в диаметре, с черновато-серыми оболочками. Стрелка у основания невысоко охвачена влагалищами ремневидных листьев шириной до 10 см. Соцветие почти шаровидное, многоцветковое, густое, листочки звездчатого околоцветника светло-фиолетовые. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Ташкентская область: Пскемский, Угамский, Чаткальский хребты. За пределами Узбекистана: Кыргызстан (Чаткальский и Ферганский хребты).

Места обитания. Травянистые склоны и прирусловые террасы в среднем и верхнем поясе гор.

Численность. Произрастает небольшими, значительно удалёнными друг от друга популяциями.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор лукович местным населением как пищевое и лекарственное сырьё, для пересадки на приусадебные участки (декоративен).



Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника.

Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Ҳасанов

Rare, endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Pskem, the Ugam, the Chatkal ranges (Tashkent region). Inhabits grassy slopes and river valleys in the middle and upper belt of mountains. About 1000 plants can be found. Limiting factors: picking of bulbs for medicinal traits and food by local population. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve.



189. ПИСКОМ ПИЁЗИ

Лук пскемский / *Allium pskemense* B. Fedtsch.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шанга ҳос жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60–120 см оралиғидаги қўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзининг диаметри 6–7 см, усти қўнғир қобик билан қопланган. Пояси 3–7 та. Ўғон, шишган, узунлиги 40 см га етади. Тўнгули шарсимон, диаметри 7–10 см. Гулқўрғон бўлакчалари оқ рангли. Июлда гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Уғон, Писком, Чотқол ва Қурама тизмаларида тарқалган. Қозғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1 200–2 000 м баландликда оҳақтошли, чиқиб бўлмайдиган қояларнинг ёриқларида, баъзан сурилмаларда ўсади.

Сони. Умумий сони 60–100 минг туп атрофида бўлган 40 га яқин популяцияси борлиги маълум.

Қўпайиши. Уругидан ва вегетатив йўл билан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уругини турли ҳашаротлар зарарлаши ва ёш ниҳолларнинг бошида ўсимликлар орасида ўса олмаслиги, вояга етиш муддатининг қўпчилиги (3–7 йил) ҳамда маҳаллий аҳоли томонидан озик-овқат ва доринор ўсимлик сифатида йиғиб олинishi қамайиб кетишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маҳаллий аҳоли уни томорқа ерларида экиб ўстиради. Хориждаги ботаника боғларида, селекция билан шуғулланувчи институтларда экилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера заволат қўриқхонасида ва Уғон-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [58, 362, 168, 364].

И. Г. Левичев

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 60–120 см. Луковица небольшая, 6–7 см в диаметре, оболочка красно-бурого цвета. Стелки с 3–7 толстыми, дудчатыми листьями длиной до 40 см. Соцветие шаровидное, 7–10 см в диаметре, листочки околоцветника молочно-белые. Цветёт в июле, плодоносит в сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Угамский, Пскемский, Чаткальский, Кураминский хребты. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Известковые недоступные скалы (трещины и уступы), реже осыпи в среднем поясе гор на высоте 1 200–2 000 м.

Численность. Около 40 популяций общей численностью 60–100 тыс. экземпляров.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Высокий процент повреждения семян насекомыми, низкая всхожесть, малая конкурентоспособность семенных всходов и длительный (3–7 лет) период ювенильной стадии являются лимитирующими факторами. Антропогенный фактор: интенсивная заготовка



местным населением для использования в качестве пищевого и лекарственного растения.

Культивирование. В пределах ареала часто выращивается на огородах. Культивируется во многих ботанических садах, в некоторых селекционных институтах республики и за рубежом.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском биосферном государственном заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [58, 362, 168, 364].

И. Г. Левичев

*Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam, the Pskem, the Chatkal, the Kurama ranges (Tashkent region). Inhabits calcareous inaccessible rocks (cracks and ledges), rarely mounds in the middle belt of mountains at the height of 1 200–2 000 m.s.l. About 40 populations, total number 60–100 thousand of specimens can be found. Limiting factors: high percentage of seed damage by insects, low germinating capacity, low competition capacity of seedlings and long (3–7 years) juvenile stage are the also the anthropogenic factor: local people intensively use *Allium pskemense* as food and medicinal plant. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve and the Ugam-Chatkal national park.*



190. ОЛОЙ ПИЁЗИ

Лукалайский / *Allium alaicum* Vved.

Мақоми 1. Олой тиз-масидаги ғоят камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бош пиёзи 1-2 см кенгликда, қорамтир қорғоссимон қобиқли (пўстли). Пояси 30-60 см узунликда, пастки қисми пастга эгилган, тукли. Барглари 2-3 та, қалами-наштарсимон, эни 10-15 мм, пастга қараб эгилган туклар билан қалин қопланган, по-ясидан қисқа. Соябони кўп гулли, деярли шар-симон, диаметри 30-40 мм. Гул бандлари тенг, гулёнбаргчалари йўқ. Юлдузсимон гулкўрғон бўлаклари оқш, кирси-мон қип-қизил рангли, узунлиги 6 мм, қалами, тўмтоқроқ, кейинроқ пастга қараб эгилади. Чангчи или 6 мм узун-ликда, бигизсимон, Кўсаги (кутичаси) шар-симон, диаметри 4 мм. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Яқинда Андижон вилояти (Имом-ота қишлоғидан 10 км жануб)дан топил-ган. Ўзбекистондан ташқари Қирғизистон (Ўш вилояти)да ўсади.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғларнинг майин тупроқли ёнбағирларида ўсади.

Сони. 50 туп ўсимликдан иборат 2 та популя-цияси топилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Мол боқилиши сабабли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [58, 362, 364]

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 1. Редкий эндемик предгорий Алай-ского хребта.

Краткое описание. Луковица шириной 1-2 см, с черноватыми бумагообразными оболочка-ми. Стрелка высотой 30-60 см, в нижней части покрытая вниз отогнутыми волосками. Листья 2-3, линейно-ланцетные, шириной 10-15 мм,



густо опушенные вниз отогнутыми волосками, короче стебля. Зонтик многоцветковый, почти шаровидный, 30-40 мм в диаметре. Цветоножки почти равные без при-цветников. Листочки звездчатого околоцвет-ника беловатые с гриз-но-пурпуровой жилкой, длиной 6 мм, линейные, туповатые, позже вниз отогнутые. Нити тычинок длиной 6 мм, шиловид-ные. Коробочка шаро-видная 4 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. был Недавно обнаружен в Андижанской области (10 км южнее кишлака Имом-ата). За пределами Узбекистана: Кыргыз-стан (Ошская область).

Места обитания. Мягкие склоны в низко-горьях.

Численность. Об-наружено 2 популяции (около 50 растений).

Размножение. Се-менное.

Причины изменения численности и ареа-ла. Выпас.

Культивирование. Культивировался в Бота-ническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Ҳасанов

Very rare endemic species of the Alay range. The species was found nearby the village Imomata, the Alay range (the Andizhan region). Inhabits fine earth slopes with shrubs, 600 m. s. l. 2 populations with about 50 plants were found. Limiting factors: pastur- ing. Measures of protection: not protected.



191. БОЧАНЦЕВ ПИЁЗИ

Ўук Бочанцева / *Allium botschantzevii* Kamelin

Мақоми 1. Помир-Олойнинг жануби-ғарбидаги эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бош пиёзи 1–2 см кенгликда, кулранг, қоғозсимон қобик (пўст) билан ўралган. Пойси 65–70 см баландликда, туксиз. Барглари 4–5 та, кенг қалами, эни 20–35 мм, пастга эгилган, қалин туклар билан қопланган, пойсидан қисқа. Соябони қўнгулли, деярли шарсимон. Гулбандлари тенгсиз, гулолди баргчалари йўқ. Юлдузсимон гулкўрғон бўлакчалари пушти рангли, бинафшаранг томирли, узунлиги 5 мм, қалами, тўмтоқроқ, кейинроқ пастга қайрилади. Чангчи иплари учбурчак-бигизсимон, анча қисми ўзаро бирлашган. Кўсаги шарсимон, диаметри 6 мм.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти; Қашқадарёда – Дехқонободдан 20 км жанубда (Толли дово-ни) тарқалган.

Ўсиш шаронти. Бўз тупроқларда ўсади.

Сони. 20 га яқин ўсимлик топишган.

Қўпайиши. Уруғидан қўнайган.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаб-лари. Чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайд.

Манбалар. [58, 362, 364]

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 1. Редчайший эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковица шириной 1–2 см, с серыми бумагообразными оболочками. Стрелка высотой 65–70 см, голая. Листья в числе 4–5, широколинейные, шириной 20–35 мм, снизу густо опушенные отогнутыми назад волосками, короче стебля. Зонтик многоцветковый, почти шаровидный. Цветоножки неравные, без прицветников. Листочки звездчатого околоцветника розовые с фиолетовой жилкой, длиной 5 мм, линейные, ту-

поватые, позже вниз отогнутые. Нити тычинок треугольно-шиловидные, короче околоцветника, высоко между собой сросшиеся. Коробочка шаровидная 6 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарьинская область; 20 км южнее Дехканабада (перевал Таллы).

Места обитания. Серые глины.

Численность. Найдено около 20 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов



Very rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at 20 km southern of Dekhkanabad – the Tally pass (Kashkadarya region). Inhabits grey clays. 20 plants were found. Seed and vegetative. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



192. БАКХАУЗ ПИЁЗИ

Лук Баххауза / *Allium bakhousianum* Regel (= *A. gulczense* O. Fedtsch.)

Мақоми 1. Олой ва Фарғона тизмасида кичик майдонда сақланиб қолган қонт камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бош пиёзининг эни 3–5 см, қорамтир, қоғозсимон пусти (қобиқли). Понсининг бўйи 90–150 см, силлиқ, Барглари 5–6 та, қайишсимон, эни 4–8 см, силлиқ, Сонбони қўпгулли, деярли шарсимон, диаметри 5–10 см. Гулбанди деярли тенг, узунлиги 3–5 см, гулён-баргчалари йўқ, Гулкўрғон бўлаклари юлдузсимон, оқ, яшил томирли, узунлиги 10 мм, қалами, тўмтоқроқ, кейинчалик пастга қараб эгилади. Чангчи иллари 7–8 мм узунликда, бигизсимон, ичкаридагиларининг туби икки тишчали. Қўсаги шарсимон, диаметри 5–6 мм.

Тарқалиши. Фарғона вилояти (Шоҳимардон дарёси воҳаси)да тарқалган (Фарғона вилояти). Ўзбекистондан ташқарида Хитой ва Қирғизистонда учрайди.

Ўсиш шароити. Йирик тош бўлакларидан иборат сурилмаларда ўсади.

Сони. 2008 йили 30 тупи борлиги аниқланган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Камайиб кетишига уруғлари унвчанлигининг пастлиги сабаб бўлган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [58, 362, 364]

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 1. Редкий декоративный белоцветковый лук Алайского и Ферганского хребтов.

Краткое описание. Луковица шириной 3–5 см, с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка высотой 90–150 см, гладкая. Листья 5–6, ремневидные, шириной 4–8 см, гладкие. Зонтик многоцветковый, почти шаровидный, 5–10 см в диаметре. Цветоножки почти равные, без прицветников, длиной 3–5 см. Листочки звездчатого околоцветника белые с зеленой жилкой, длиной 10 мм, линейные, туповатые, позже вниз отогнутые. Нити тычинок длиной 7–8 мм, шиловидные, внутреннее при основании двузубые. Коробочка шаровидная 5–6 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Встречается только в Ферганской области в бассейне реки Шахимардан. За пределами Узбекистана: Китай и Кыргызстан.

Места обитания. Крупнообломочные осыпи.

Численность. В 2008 году зарегистрировано 30 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Низкая семенная всхожесть.

Культивирование. Культивировался в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов

Very rare decorative white-flowering species of the Alay and Ferghana ranges. It is spread at the Shakhi-mardan valley (Ferghana region). Inhabits stony slopes. In 2008, 30 plants were observed. Limiting factors: low seed germination. Measures of protection: not protected.



193. КАТТА ПИЁЗ

Лук большой / *Allium majus* Vved.

Мақоми 1. Помир-Олойдаги камёб, манзарали эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бош пиёзининг эни 3–5 см, қорамтир, қорғосимон пўст билан қопланган. Пояси 60–80 см узунликда, силлиқ. Барглари 4–5 та, қайишсимон, эни 4–8 см, силлиқ. Соябони қўлгулли, деирли шарсимон, диаметри 5–10 см. Гулбандлари деирли тенг, гулёнбаргчалари йўқ. Гулқўрғон бўлакчалари юлдузсимон, оч бинафшаранг, узунлиги 6–7 мм, қалами, тўмтоқроқ.



кейинроқ пастга қараб эгиләди. Чангчи иплари бигизсимон, узунлиги 4–5 мм. Кўсаги шарсимон, диаметри 5–6 мм.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Зарафшон ва Ҳисор тизмаларининг ёнбағирларида тарқалган эндемик тур.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларидаги тошли ва олажинсли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 30 тупи Китоб геология қўриқхонаси яқинида, 100 тупи Ҳисор қўриқхонаси атрофида ўсади.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан пиёзининг қовлаб олинishi ва чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Китоб ва Ҳисор қўриқхоналарида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [58, 362, 364].

Ф.Ў Ҳасанов

Статус 1. Высокодекоративный эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковица шириной 3–5 см, с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка высотой 60–180 см, гладкая. Листья 4–5, ремневидные, шириной 4–8 см, гладкие. Зонтик многоцветковый, почти шаровидный, 5–10 см в диаметре. цветоножки почти равные, без прицветников, длиной 3–5 см. Листочки звездчатого околоцветника светло фиолетовые, длиной 6–7 мм, линейные, туповатые, позже вниз отогнутые. Нити тычинок длиной 4–5 мм, шиловидные. Коробочка шаровидная 5–6 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарьинская область: эндемичный узбекистанский вид лука, произрастающий на каменистых склонах Зеравшанского и Гиссарского хребтов.

Места обитания. Каменистые и пестроцветные склоны в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Около 30 растений произрастают рядом с Китабским геологическим заповедником и около 100 растений в Гиссарском государственном заповеднике.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Заготовка луковиц населением и выпас скота.

Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Китабском и Гиссарском заповедниках.

Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов

Highly decorative endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the stony slopes of the Zerafshan and Hissar ranges (Kashkadarya region). Inhabits stony slopes and red sands. In the Kitab state reserve, there are about 30 plants and in the Hissar state reserve about 100 plants. Limiting factors: digging of bulbs by local population and pasturing. Measures of protection: protected in the Kitab (Geological) and Hissar state reserves.



194. ЙИРИК ПИЁЗ

Лук гигантский / *Allium giganteum* Regel

Мақоми 3. Жанубий Помир-Олой ва Копетдагдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бош пиёзнинг эни 3–5 см, қорамтир, қорғоссимон пўстли. Пояси 60–130 см узунликда, силлиқ. Барглари 4–5 та, силлиқ. Соябони қўпгулли, деярли шарсимон, диаметри 5–12 см. Гулбандлари деярли тенг, гул-ёнбаргчалари йўқ, узунлиги 3–6 см. Гулқўрғон бўлаклари юлдузсимон, оч бинафша рангли, узунлиги 5–6 мм, овалсимон, тўмтоқроқ, эгилмайдиган. Чангчи иллари бигизсимон, узунлиги 4–5 мм. Қўсаги шарсимон, диаметри 5–6 мм.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Қўхитанг тизмасида – Кампиртепа сойининг жанубий ёнбағри, Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий ёнбағирлари ва Боботоғ тизмасида тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида Эрон, Афғонистон, Тожикистон ва Туркменистонда учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 5–8 та тупдан иборат кичик тўплар ҳосил қилади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Мол боқилиши ва уруғининг паст унв-чанлиги туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқ-хонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [58, 362, 364].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 3. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая и Копетдага.

Краткое описание. Луковица шириной 3–5 см, с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка высотой 60–130 см, гладкая. Листья 4–5, ремневидные, шириной 4–8 см, гладкие. Зонтик многоцветковый, почти шаровидный, 5–12 см в диаметре. Цветоножки почти равные, без прицветников, длиной 3–6 см. Листочки звездчатого околоцветника светло фиолетовые, длиной 5–6 мм, овальные, туповатые, не отгибающиеся. Нити тычинок длиной 4–5 мм, шиловидные. Коробочка шаровидная, 5–6 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет и его юго-западные отроги, Бабатаг, Кугитанг; За пределами Узбекистана: Иран, Афганистан, Таджикистан и Туркменистан.

Места обитания. Каменистые склоны в низнем и среднем поясах гор.

Численность. Образует небольшие группы (по 5–8 растений).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота и низкая семенная всхожесть.

Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Ҳасанов

Rare endemic species of the southern Pamir-Alay and Kopetdag. It is spread at the Hissar range and its southern outskirts, the Kughitang, the Babatag (Surkhandarya region). Inhabits stony slopes in the low and middle mountainous zone. Small populations by 5–8 plants can be found sporadically. Limiting factors: low seed germination and pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.



195. ИСОҚҲҲ ПИЁЗИ

Луқ Исақула / *Allium isakulii* R. M. Fritsch et F. O. Khass.

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шань ва Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Пиёзининг эни 1-2 см, қорамтир, қоғозсимон пусти қўнғир рангда. Пояси 15-30 см узунликда, силлиқ. Барглари 2-3 та, тилсимон, 5-10 см узунликда, эни 2-4 см, силлиқ. Соябони қўпгулли, сийрак, деярли шарсимон, диаметри 10-15-35 см. Гулбандлари деярли тенг, гулбандчалари йўқ, узунлиги 5-10-17 см. Гулқўрғон бўлаклари юлдузсимон, қалин этли, оч сийёҳранг, узунлиги 10-12 мм, учбурчак-ланцетсимон, ўткирроқ, Чангчи ипларининг узунлиги 4-5 мм, учбурчак. Қўсаги шарсимон, диаметри 3-5 мм.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота, Молғузар, Оқтоғ, Қоратоғ тизмаларида тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида: Тожикистон (Муғилтоғ).

Ўсиш шароити. Қуёш тик тушадиган тоғ ёнбағирларининг сувайирғичларга яқин қисмидаги қоялар остида ва қуруқ тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Яқка-яқка ҳолда ва кичик тўплар ҳолида учрайди. Нурота тизмасида (100 та туп), Қоратоғ ва Оқтоғда (20-50 та туп) популяциялари маълум.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Мол боқилиши ва уруғининг паст унвучанлиги туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [58, 362, 364]

Ф.Ў Ҳасанов

Статус 1. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковица шириной 1-2 см, с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка высотой 15-30 см, гладкая. Листья 2-3, языковидные, длиной 5-10 см, шириной 2-4 см, гладкие. Зонтик многоцветковый, рыхлый, почти шаровидный, 10-15-35 см в диаметре. Цветоножки почти равные, без прицветников, длиной 5-10-17 см. Листочки звездчатого околоцветника мясистые, остающиеся, светло фиолетовые, длиной 10-12 мм, треугольно-ланцетные, островатые. Нити тычинок длиной 4-5 мм, треугольные, высоко между собой спаянные. Коробочка шаровидная, 3-5 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях: хребты Мальгузар, Нуратау, Актау, Каратау. За пределами Узбекистана: Таджикистан (Моголтау).

Места обитания. Солнечные экспозиции на щебнистых склонах под скальными породами в приводораздельных частях.

Численность. Встречается единично или небольшими группами. Известны 3 популяции (около 100 экземпляров) в Нуратау и около 20-50 экземпляров в Актау и Каратау.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Низкая семенная всхожесть и перевыпас скота.

Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов

Highly decorative endemic species of the western Tien-Shan and Pamir-Alay. It is spread at the Malguzar, the Nuratau, the Aktau, the Karatau ranges (Jizzakh, Samarkand, Navoi regions). Inhabits shiny slopes under the rocks in upper part of the low mountains. Single specimens and small groups occur sporadically. There are populations with about 100 plants known in the Nuratau and about 20-50 plants in the Aktau and Karatau. Limiting factors: low seed germination and pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



196. ПУШТИ ГУЛЛИ ПИЁЗ

Лук розовоцветный / *Allium rhodanthum* Vved.

Мақоми 0. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бош пиёзининг эни 2–3 см, қорамтир, қорғосимон пусти. Пояси 15–30 см узунликда, силлиқ. Барглари 1–2 та, кенг наштартсимон, узунлиги 5–10 см, эни 2–4 см, силлиқ. Соябони қўпгулли, сийрак, деярли шарсимон, диаметри 10–15 см. Гулбандлари тенг, гулбаргчалари йўқ, узунлиги 5–10 см. Гулқўрғон бўлаклари юлдузсимон, этли, пуштиранг, узунлиги 7–10 мм, чўзиқ-овалсимон, баъзи наштартсимон, тўмтоқ. Чангчи иплари пушти, узунлиги 16–13 мм, бигизсимон, анча қисми ўзаро бирлашган. Қўсаги шарсимон, диаметри 3–4 мм.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Хаудактоғ қумларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Қумларда ўсади.

Сони. 20 йил давомида уни топиш устида олиб борилган ишлар натижасиз тугади. Бу тур бутунлай йўқолган бўлса керак.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ҳаддан ташқари қўп мол боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [58, 362, 364].

Ф.Ў. Ҳасанов

Нити тычинок фиолетовые 10–13 мм длиной, шловидные, высоко между собой спаянные. Коробочка шаровидная 3–4 мм в диаметре. Цветет в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Сурхандарьинская область: пески Хаудактау.

Места обитания. Пески.

Численность. Многочисленные попытки в течение 20 лет найти этот вид в Хаудактау не увенчались успехом. Вид, по-видимому, полностью исчез.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Перевыпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic plant of the southern Pamir-Alay. It is spread at the sands Khaudaktau (Surkhandarya region). Inhabits sandy dunes. Over last 20 years,

several attempts to find this species were unsuccessful. Probably disappeared. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.

Статус 0. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковица шириной 2–3 см, с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка высотой 15–30 см, гладкая. Листья 1–2, широко ланцетные, длиной 5–10 см, шириной 2–4 см, гладкие. Зонтик многоцветковый, рыхлый, почти шаровидный, 10–15 см в диаметре. Цветоножки почти равные, без прицветников, длиной 5–10 см. Листочки звездчатого околоцветника мясистые, интенсивно розовые, длиной 7–10 мм, продолговато-овальные, реже ланцетные, тупые.



197. РАВЕН ПИЁЗИ

Лук Равеса / *Allium ravenii* E.O. Khass., Shomuradov et Kadyrov

Мақоми 1. Устюртдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Пиёзининг эни 1 см, қорамтир, қоғозсимон пўстли. Пойси 15–30 см узунликда, силлиқ. Барглари 1–2 та, узунлиги 5–20 см, эни 0,5 см, силлиқ. Соябони қўлгулли, сийрак, деярли шарсимон, диаметри 1–1,5 см. Гулбандлари тенг, гулёнбаргчалари йўқ, узунлиги 6 мм. Гулқўрғон бўлаклари юлдузсимон, этли, пуштиранг, узунлиги 5–7 мм, чўзиқ-овалсимон.

Тарқалиши. Қорақалпоғистон: Устюрт платоси (шарқий чинк атрофлари)да.

Ўсиш шароити. Чинк атрофидаги гипсли тупроқларда ўсади.

Сони. 20 га яқин туплари топилган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайиши мумкин.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ҳаддан ташқари қўп чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайд.

Манбалар. [365].

Ф.Ў Ҳасанов

Статус 1. Редкий эндемик плато Устюрт.

Краткое описание. Луковица шириной 1 см, с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка высотой 15–30 см, гладкая. Листья 1–2, цилиндрические, гладкие, длиной 5–20 см, шириной 0,5 см. Зонтик немногочетковый, рыхлый, 1–1,5 см в диаметре. Цветоножки почти равные, без прицветников, длиной 5–10 см. Листочки звездчатого околоцветника мясистые, интенсивно розовые, длиной 6 мм. Нити тычинок короче листочков. Цветет в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Каракалпакстан: плато Устюрт.

Места обитания. Гипсы наверху чинка.

Численность. Выявлено 20 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Перевыпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [365].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic plant of the Ustyurt Plateau. It is spread at Karakalpakstan (the Ustyurt Plateau). Inhabits gypseous slopes of the Ustyurt Plateau. 20 plants were found. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.



198. МАНЗАРАЛИ ПИЁЗ

Лук декоративный / *Allium decoratum* Turginov et Tojibaev

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Пиёзбоши 1,5–2 (3) см диаметрда, қоғозсимон қобик билан қопланган. Пояси 10–15 см баландликда, барглари 1–3 тадан, баъзан 4 тагача, узунлиги 9–10 см, эни 3–3,5 см. Тўпгули шарсимон, ҳар бир гулнинг узунлиги 2,5–3 см, гуллари юлдузсимон, оч қизил ва қизғиш рангда, узунлиги 6–6,5 мм, ўткир ланцетсимон. Чангчи иплари тўғри, гулқўрғондан чиқиб туради, чангчилари бигизсимон. Қўсаги шарсимон, нюнда гуллаб, уруғи июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Жануби-ғарбий Ҳисор тизмасида, Бойсун тоғининг Хўжа-Гургур-ота, Хўжа Қўчқор-ота, Санжар ва Чўлбайир тоғларида тарқалган.



Ўсиш шароити. Ўсиш минтақаси, денгиз сатҳидан 2 500–3 200 м баландликда майда тупроқли ва майда тошли ёнбағирликларда учрайди.

Сони. 1 000–1 500 та туп 4–5 га майдонда тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан.

Маданийлаштирилиши: ЎзР ФА Ботаника боғига экилганда, натижалар самарасиз бўлган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [371].

О.Т. Тургинов

Статус 1. Редкий эндемик юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковица шаровидная, толщиной 1,5–2(3) см, с бумагообразными беловатыми оболочками. Стебель толстый, высотой 10–15 см. Листья в числе (1)2–3 ланцетные, продолговатые или эллиптические, длиной 9–10 см, шириной 3–3,5 см. Зонтик шаровидный, многоцветковый. Цветоножки равные, длиной 2,5–3 см, при основании без

прицветников. Листочки звездчатого околоцветника бледно-красные, с красной жилкой, длиной 6–6,5 мм, ланцетные острые, после цветения вверх торчащие, жесткие. Нити тычинок короче равных, более длины листочков околоцветником, наружные шиловидные; внутренние в 1,5 раза шире, треугольно-шиловидные. Цветёт в июне–июле, коробочка шаровидная.

Распространение. Сурхандарьинская область: юго-западные отроги Гиссарского хребта – Байсун, Ходжа-Гургур-ата, Ходжа Кочкар-ата, Санжар и горы Чўлбайир.

Места обитания. Мелкоземистые, каменистые склоны в верхнем поясе гор на высоте 2 650–3 200 м.

Численность. Около 1 000–1 500 растений на площади 4,5–5 га.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Посадка взрослых экземпляров и высев семян в Ботаническом саду АН РУз окончилась неудачей.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [371].

О.Т. Тургинов

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the south-western spurs of the Hissar range – in the Baysun, the Khoja Gurgur-ata, the Khodja Kuchkor-ata, the Sanjar and in the Tschulbair mts. (Surkhandarya region). Inhabits subalpine and alpine zones (altitudes ca. 2 650–3 200 m) with stony and rocky fine earth soils. The total number of all populations is about 1 000–1 500 plants on the area of 4,5–5 hectares. Measures of protection: not protected.



199. САХРО ПИЁЗИ, ЧЎЛ ПИЁЗИ

Лук пустынный / *Allium echemporasum* Vved.

Мақоми 2. Помир-Олой ғарбий тармоқларининг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Пиёзи тухумсимон, эни 1 см га яқин, кулранг юпка терисимон буришган пўстлоқли. Пиёзчаларининг сирти чуқурчали. Пояси (10) 15–25 см, деярли яримгача барглarning новлари билан ўралган. Барглари 2 та, ипсимон, эни 1–2 мм, гуллаш пайтида қуриб кетади. Солябони камгулли, сийрак. Гулбандлари 3–4 см гача узунлиқда, тенгсиз, гулёнбаргчалари бор. Гуллари қўнғироқсимон. Гулқўрғон бўлаклари оқш ёки хира пушти ранг, қирмизи томирли, узунлиги (5) 6–7 мм, наштасимон. Чангчи иллари гулқўрғонидан 1,5 марта қисқа, учбурчак, яримга-

высотой (10) 15–25 см, примерно до $\frac{1}{2}$ одет влажлищами листьев. Листья в числе 2, нитевидные, шириной 1–2 мм, ко времени цветения увидающие. Зонтик немногочетковый, рыхлый. Цветоножки длиной до 3–4 см, неравные, с прицветниками. Листочки колокольчатого околоцветника грязно-розовые или беловатые, с грязно-пурпуровой жилкой, длиной (5) 6–7 мм, ланцетные. Нити тычинок в 1,5 раза короче околоцветника, до $\frac{1}{2}$ между собой и с околоцветником сросшиеся, треугольные, цельные, внутренние почти 3 раза шире наружных. Коробочка около 3 мм в диаметре. Цветет в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Самаркандской и Навоийской областях: хребет Актау, Зирабулак-Зиявуддинские горы.

Места обитания. Каменистые склоны и скалы в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается редко, спорадически, одиночно или небольшими группами по несколько растений.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Естественно редкий стенофитный петрофильный вид. Основную угрозу представляют горные разработки (добыча мрамора, строительного камня, щебня и других полезных ископаемых).

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 362, 364].

Н.Ю. Бешко

ча ўзаро ва гулқўрғон билан бирлашган, ичкаридагилари ташқилари деярли 3 марта кенг. Қўсаги юмалоқ, диаметри 3 мм га яқин.

Тарқалиши. Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Оқтоғ тизмасида ва Зирабулоқ-Зиявуддин тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмидаги тошли ёнбағирларда, қояларда ўсади.

Сони. Яқка ва кичик гуруҳлар ҳолида учрайди.

Қўпайиши. Уругидан ва вегетатив йўл билан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиатда камёб, ўсиш майдонлари чекланган стенобионт петрофит ўсимлик. Мармар қазиб олиш, тош майдалаш ва тоғ-кон ишлари туфайли камайиб кетади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайд.

Манбалар. [58, 362, 364]

Н.Ю. Бешко

Статус 2. Редкий эндемик западных отрогов Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковичный многолетник. Луковица яйцевидная, шириной около 1 см, с сероватыми, морщинистыми тонко кожистыми оболочками. Луковички ямчатые. Стебель тонкий,

Rare endemic species of the western branches of the Pamir-Alay. It is spread at the Aktau ridge, the Zirabulak and Ziyavuddin mountains (Samarkand and Navoiy regions). Inhabits stony slopes and rocks in the lower mountain belt. Single specimens or small populations occur sporadically. Limiting factors: marble, crushed stone and rubble quarrying, mining operations. Endemic stenotopic petrophyte species. Measures of protection: not protected.



200. ЯШИЛ ГУЛЛИ ПИЁЗ Лук зеленоцветый / *Allium viridiflorum* Pobed.

Мақоми 1. Чотқол тизмасидаги гоаят камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Пиёзбоши 1–2 см кенгликда, кулранг, юпқа қобиқли (пўстли). Пиёзчалари қисқарган, кам соғли. Поясининг узунлиги 20–23 см, эни 1,0 мм. Барглари бўлинган, 4 та, ипсимон, зич жойлашган, қалами новсимон булакли, қисқа пояли. Соябони сийрак, гуллаш даяридан сўнг 7–9 см кенгликда. Гулбандлари тенг, ипсимон, узунлиги 4–5 см, тубида гулбаргчалари йўқ, қуйидан юқорига букилган. Юлдузсимон гулқўрғон бўлакларининг узунлиги 4–5 мм, яшил, тенг, тўмтоқ, гуллагандан кейин буралиб қолмайди. Чангчи иплари гулқўрғондан калта, асосидан бошлаб бир-бири билан қўшилган, тишсиз. Қўсақча гулқўрғондан озгина узунроқ, деярли шарсимон. 3 уругли. Уруги юмалоқ, қора, чуқурчали.

Тарқалиши. 2013 йилда Наманган вилоятидан (Поромон қишлоғидан 2 км шимол томонда) топилган. Ўзбекистондан ташқари, Қирғизистонда ўсади.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг қуйи минтақасидаги юмшоқ енбағирларда ўсади.

Сони. 20 туп ўсимликдан иборат 1 та популяцияси топилган.

Қўпайиши. Уругидан ва вегетатив йўл билан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши сабабли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника ботида экиб ўстирилмоқда.

Муҳофазат чоралари. Муҳофазат қилинмайди.

Манбалар. [58, 362, 364, 371].

Ф. Каримов

Статус 1. Редкий эндемик Чаткальского хребта.

Краткое описание. Луковицы одиночные толщиной 1–2 см, с перепончатыми серыми цельными оболочками. Луковички удлиненные, немногочисленные. Стебли высотой 20–23 см, толщиной 1 мм. Листья, рассеченные на 4 нитевидные, скрученные, желобчатые доли, короче стебля. Чехол отстающийся, бело-перепончатый, короче зонтика. Зонтик рыхлый, после зацветания шириной 7–9 см, полусферический, немногочетковый. Цветоножки равные, нитевидные длиной 4–5 см, при основании без прицветников, нижние вверх изогнутые. Листочки звездчатого околоцветника длиной 4–5 мм, зеленые, равные, тупые, после цветения не скручивающиеся. Нити тычинок короче околоцветника, с ним и между собой при основании сросшиеся, без зубцов. Коробочка немного длиннее околоцветника, почти шаровидная, 3-х семенная. Семена круглые, черные, ямчатые. Цветет в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. В 2013 г. был обнаружен в Наманганской области (1 км к северу от кишлака Поромон). За пределами Узбекистана: Кыргызстан.



Места обитания. Каменистые склоны нижнего пояса гор.

Численность. Обнаружена 1 популяция (около 20 растений).

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас.

Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 362, 364, 371].

Ф. Каримов

Very rare endemic species of the Chatkal range. The species has been recently found nearby the village Poromon, the Chatkal range (Namangan region). Inhabits stony slopes in the lower mountain belt. Only 1 population (about 20 plants) was found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



201. ВИКТОР ОМОНҚОРАСИ

Ўзгирня Виктора / *Uzgeria victoris* Wed. ex Artjuschenko

Мақоми 2. Жануби-ғарбий Помир-Олой тизмасидаги ареали жуда қисқариб бораётган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–25 см га етадиган қўп йиллик, пиезали ўт. Пиезанинг эни 4–7 см, қорамтир-қўнғир рангли, қўп қаватли қобиклар билан ўралган. Барглари 7–10 та, қалами, қўқимтир, силлиқ. Гулдоиси август ойида барглари қуриб кетгандан сўнг ўсиб чиқади. Тўпгули соябонсимон, 4–7 гулли. Қўсакчаси кенг юраксимон паллали. Август ойида гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасида, Чўлбайр тоғларида, Хонақасув дарёсининг юқори қисмларида тарқалган. Ареалининг шимолий чегаралари Қўштут, Шура, Хонақа доvonлари, жанубда эса Боботоғнинг шимолий ёнбағирлари орқали ўтади. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмида майда зарра жинс тупроқли ёнбағирлар, даралар ва баъзан сурималарда ўсади.

Сони. Бир-биридан узок масофаларда жойлашган, унча катта бўлмаган (1–1,5 га) майдонларни эгаллайди. Умумий майдони тахминан 350 га етади.



Қўпайиши. Уруғидан ва пиезидан (уни бўлакларга ажратиб) қўпайди.

Ўсимлик сони на ареалининг ўзгариш сабаблари. Баргларининг ҳар йили узлуксиз доривор хом ашё сифатида йиғиб олиниши туфайли пиезлари майдалашиб, ўсимликининг ер усти қисми ҳам қуриб бошлаган.

Маданийлаштирилиши. 1970 йилдан табиий ареалига яқин жойларда экиб ўстирила бошланди.

Муҳофаза чоралари. Табиатда сақланиб қолган майдонлари назорат қилиниши, рухсатсиз йиғмаслик талаб этилади. Шунингдек, маданий шаронгда ўстириш бўйича илмий ишлар олиб борилиши лозим. Чўлбайр тоғида табиий ҳолда ўсувчи омонқораларни сақлаб қолиш ва уруғини териш учун буюртмахона ташкил қилиниши керак.

Манбалар. [155–159].

И.И. Мальцев

Статус 2. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая с сильно сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой до 20–25 см. Луковица толщиной 4–7 см с многочисленными чёрно-бурыми оболочками. Ли-

стья в количестве 7–10, линейные, сизоватые, гладкие. Цветок появляется в августе, после высыхания листьев. Соцветия зонтиковидные, 4–7-цветковые. Коробочка с широкосердцевидными створками. Цветёт в августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – горы Чўлбайр, бассейн реки Хонақасу. На севере граница ареала проходит вдоль перевалов Қўштут, Шура, Хонақа, на юге – по северным склонам Бабатага. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны, реже осыпи, ущелья среднего пояса гор.

Численность. На разобщённых участках образует небольшие (1–1,5 га) заросли. Общая площадь – примерно 350 га.

Размножение. Семенное и вегетативное – отпочковыванием луковиц.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивная заготовка листьев в качестве лекарственного сырья, в результате чего луковицы истощаются и заросли возобновляются медленно.

Культивирование. С 1970 года проводится посев вблизи естественных мест обитания.

Меры охраны. Необходимо усилить контроль за естественными местами обитания, ввести строгий лицензионный сбор, расширить изучение в культуре, организовать заказник в районе Чўлбайра для сохранения естественных зарослей и сбора семян.

Источники. [155–159].

И.И. Мальцев

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay with reducing area. It is spread at the Hissar range: the Chulbair mountains, the Khanakasu river basin. In the north, the area-line lies along the Kushtut, the Shura, the Khanaka passes, in the south - in the northern slopes of the Babatag (Surkhandarya region). Inhabits fine earth slopes, rarely mounds, gorges in the middle belt of mountains. Small isolated populations covering 1–1.5 hectares each. Total area is about 350 ha. Limiting factors: intensive use of leaves as medicinal raw material; as a result, bulbs become weak; and, brakes revegetate slowly. Limiting factors: it is necessary to enhance monitoring of the natural habitats, to introduce strict license tax, to integrate the study in cultivation, to organize the reserve in the Chulbair region for protection of natural populations and for seeds collection.



202. САРИҚ ШТЕРНБЕРГИЯ

Штернбергия жёлтая / *Sternbergia lutea* (L.) Spreng.



Мақоми 3. Ўзбекистоннинг жанубида жуда кам тарқалган тур.

Қисқача талсифи. Бўйи 20 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи йирик, деярли юмалок, эни 4 см га, узунлиги эса 5 см га етади. Барглари кенг наشتарсимон, тўмтоқ, тарновсимон, четлари ўткир майда тишчали. Варги гули билан бир вақтда – кузда ўсиб чиқади. Гуллари бандона, сариқ рангли. Гулпояси найзасимон, чузикроқ. Сентябрь-октябрь ойларида гуллайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси жанубий ёнбағирларида жойлашган Шаргун шаҳри атрофида тарқалган. Тожикистонда, Туркменистонда ва Кавказда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қояларда ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва зрезалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Эҳтимол, манзарали бўлганлиги учун пиёзи қазиб олинса керак.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Табиатда ўсиб турган жойлари назорат остига олинishi ва маданий шароитда экиб ўрганилиши лозим.

Манбалар. [79, 159].

И.И. Мальцев

Статус 3. Очень редкий спорадически встречающийся вид в южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой до 20 см. Луковица большая, почти округлая, шириной до 4 см и длиной 5 см. Листья широколанцетные, тупые, вогнутые, по краю мелкозубчато-островатые, появляются осенью одновременно с цветками. Цветки жёлтые, сидячие. Цветочная стрелка удлинённая. Цветёт в сентябре-октябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – окрестности города Шаргунь. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Туркменистан, Кавказ.

Места обитания. Карнизы скал, каменистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены. Вероятно, заготовка луковиц.

Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходимы контроль за состоянием естественных местообитаний и изучение в культуре.

Источники. [79, 159].

И.И. Мальцев

Very rare species sporadically found in the southern Uzbekistan. It is spread at the Hissar range: nearby the village Shargun (Surkhondarya region). Inhabits rock ledges, stony slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



203. ФИШЕР ШТЕРНБЕРГИЯСИ

Штернбергия Фишера / *Sternbergia fischeriana* (Herb.) M. Roem.

Мақоми 3. Ўзбекистоннинг жанубий минтақаларига ҳос жуда кам учрайдиган тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10 см га етадиган қўйиллик пиязли ўсимлик. Пояси ипаски. Барглари 4–8 та, туксиз, қалами. Гуллари 8–10 мм узунликдаги гулбандда жойлашган. Гулқўрғонининг ташқи баргчалари чўзиқ. Қўсакчаси очилмайди. Уруғи деярли юмалоқ, Март ойида гуллаб, меваси апрелда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмасида Китоб, Шахрисабз шаҳарлари атрофларида, Оқсув дарёси ҳавзасида ҳамда Зарафшон тизмасининг ғарбий қисмида тарқалган. Шарқий Кавказортида ва шимолий Эронда ҳам тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ олди ёнбағирларидаги соз тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиатда бу ўсимлик тарқалган ерларнинг қишлоқ ҳўжалиғи учун ўзлаштирилиши ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида синаб қўрилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Китоб давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади. Табиатдаги тўплари устидан қатъий назорат ўрнатиш ва маданий ҳолда экиб ўрганиш лозим.

Манбалар. [79, 159].

И.И. Мальцев

Статус 3. Очень редкий спорадически встречающийся вид в южной Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой до 10 см. Стебель сплюснутый. Листья в количестве 4–8, голые, линейные. Цветки на цветоножках длиной 8–10 мм. Наружные листочки околоцветника продолговатые. Коробочка нераскрывающаяся. Семена почти шаровидные. Цветёт в марте, плодоносит в апреле.

Распространение. Кашкадарьинская область: Гиссарский хребет – окрестности города Китаба, Шахрисабза, бассейн реки Аксу. Западная оконечность Зеравшанского хребта. За пределами Узбекистана: Восточное Закавказье, Северный Иран.

Места обитания. Лесовые склоны предгорий.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение территорий под сельхозкультуры. Выпас скота.

Культивирование. Испытывается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Китабском заповеднике. Необходимы строгий контроль за состоянием популяций и изучение в культуре.

Источники. [79, 159].

И.И. Мальцев

Very rare species sporadically found in the southern Uzbekistan. It is spread at the Hissar range; nearby Kitab and Shakhrisabz towns, the Aksu river basin; the western part of the Zeravshan range (Kashkadarya region). Inhabits loess slopes of the foothills. The quantity is unknown. Limiting factors: reclamation of lands under crops, Pasturing. Measures of protection: protected in the Kitab state reserve. The strict control of the state of populations and investigations in cultivation are required.



ШИЛВИДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ЖИМОЛОСТНЫЕ - CAPRIFOLIACEAE

204. ҒАЛАТИ УЧҚАТ

Жимолость странная / Lonicera paradoxa Pojark.

Мақоми 1. Помир-Олойдаги жуда камёб, ареали ажралган, реликт эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Тарвақалайган шох-шаббали бута. Барглари эллипсимон ёки тескари-тухумсимон, бўлакчи, узунлиги 20 мм, четлари қисқа киприксимон, ҳар икки томони қисқа тукли. Гуллари барг қўлтиғида жойлашган. Меваси юмшоқ, қизил рангли, майда. Уруғлари 4-5 та, оқич. Июль-августда гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Жиззах ва Фарғона вилоятлари: Олой тизмаси (Шоҳимардон қишлоғи атрофи) ва Туркистон тизмасида тарқалган. Тожикистон ва Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шаронти. Тоғларнинг ўрта ва юқори қисмларида тошли-шағалли ёнбағирларда ва сийрак арчазорларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди.

Қўпайиши. Уруғи ва илдиз бачкиларидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўтин сифатида ишлатилади. Чорва молларидан ҳам зарар қўради.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Буюртмаҳоналар ташкил қилиш ва ЎЗР ҒА Ботаника боғида биологик хусусиятларини ўрганиш лозим.

Манбалар. [20, 248].

Ғ.А. Лазьков

Статус 1. Очень редкий узкий реликтовый эндемик Памиро-Алая с разорванным ареалом.

Краткое описание. Кустарник с растопыренными ветвями. Листья эллиптические или обратнояйцевидные, лопастные, длиной до 20 мм, по краю короткореснитчатые, с обеих сторон коротковолокнистые. Цветки в пазухах листьев. Плоды ягодообразные, красные. Цветёт в июле-августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. В Джизакской и Ферганской областях: Алайский хребет – окрестности кишлака Шахмардан; Туркестанский хребет. За пределами Узбекистана: Таджикистан и Кыргызстан.

Места обитания. Щебнисто-каменистые склоны в верхнем и среднем поясах гор, среди разреженных зарослей арчи.

Численность. Встречается очень редко, единичными экземплярами.



Размножение. Семенное и корневыми отпрысками.

Причины изменения численности и ареала. Вырубка на топливо, выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Необходимы организации заказника, изучение биологических особенностей в условиях Ботанического сада АН РУз.

Источники. [20, 248].

Ғ.А. Лазьков

Very rare relict endemic species of the Pamir-Alay with the disjunctive area. It is spread at the Alay range: nearby the village Shakhimardan; the Turkestan range (Jizzakh and Fergana regions). Inhabits stony slopes in the upper and middle belt of mountains, among sparse juniper stands. Very rarely single specimens can be found. Limiting factors: cutting down as fuel, pasturing. Measures of protection: it is necessary to organize a state reserve, to study biological characteristic features under the conditions of the Botanical Garden (Tashkent).



ШИРАЧДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО АСФОДЕЛЕВЫЕ – ASPHODELACEAE

205. АЛЬБЕРТ ШИРАЧИ

Ширач Альберта / *Eremurus alberti* Regel

Мақоми 2. Ўзбекистонда кам учрайдиган тур.

Қисқача тавсифи. Вўйи 25–80 см га етадиган кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқарган, панжасимон, булаклари урчуқсимон йўғонлашган, қалинлиги 7–10 мм. Барглари кенг қалами, ташқи томонидагиларининг кенлиги 1,5–2 см. Шингиллари сийрак, кўп гулли, узунлиги 10–50 см. Гулдан баргчалари йирик, учбурчак наштасимон, Тупгулининг пастигаги гулбандлари гулкўрғонидан 2–2,5 марта узун. Гулкўрғон баргчалари бир томирли, оқиш-қизғиш рангли, асосига қараб чўзилган. Чангчилари гулкўрғонидан 1,5 марта қисқа. Қўсакчаси юмалоқ, уч уяли, силлиқ, эни 2–2,5 см. Апрельда гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Боботог, Шеробод водийсида. Деҳқонобод шаҳри атрофларида тарқалган. Тожикистон, Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 900–1 200 м баландликда паст тоғлардаги ола жинсларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган, баъзан 2–3 та тупи биргаликда учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллаш даврида кўп миқдорда гулдасталар учун ўзиб олинishi натижасида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1960 йилдан буён ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Табиатда ўсиб турган туплари назорат остига олинishi лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий в Узбекистане вид.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 25–80 см с укороченным корневищем и радиально расходящимися веретеновидными корнями толщиной 7–10 мм. Листья широколинейные, наружные, шириной 1,5–2 см. Кисть негустая, многоцветковая, длиной 10–50 см. Прицветники крупные, треугольно-ланцетные. Цветоножки нижние в 2–2,5 раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 1 жилкой, бледно-мясо-красные, к основанию оттянутые. Тычинки в 1,5 раза короче околоцветника. Коробочка шаровидная, с 3 гнездами, гладкая, шириной 2–2,5 см. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: горы Бабатаг, Шерабадская долина, окрестности города Дехканабада. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород в низкогорьях на высоте 900–1 200 м.



Численность. Встречается единично, редко по 2–3 растения.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор на букеты.

Культивирование. С 1960 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим контроль за состоянием популяции.

Источники. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев

Species rare in Uzbekistan. It is spread at the Babatag mountains, the Sherabad valley, nearby Dekhanabad (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits outcrops of gypseous rocks in the low mountains at the height of 900–1200 m. Single specimens, seldom 2–3 plants can be found. Limiting factors: mass picking of flowers. Measures of protection: control of the state of populations is required.



206. БЕШТОМИР ШИРАЧ

Ширач Ил / *Eremosurus ilae* Wed.

Мақоми 2. Жануби-ғарбий Помир-Олойга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60–80 см га етадиган қўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқа, нурсимон жойлашган, илдизлари қўп, йўғонлашган. Барги кенг қалами, 15–20 мм кенгликда, қўқимтир рангли. Шингили цилиндрсимон, узунлиги 20–30 см, сийрак, кам гулли. Гулолди баргчалари ингичка учбурчак шаклда. Шингилининг пастдаги гулбандлар гулқўрғонидан икки баробар узун. Гулқўрғон баргчалари 3–5 томирли. Чангчилари гулқўрғондан узунроқ. Меваси – кўсакча, юмалоқ, йирик (эни 1 см дан ортиқ), силлиқ. Май-июнда гуллаб, меваси июнь-июль ойларида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Хисор тизмасининг Чўлбайир тоғларида, Тўпаланг дарёси ҳавзасида. Байсунтоғнинг шимолий ёнбағирларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги шағалли, тошли-соз тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди. Якка-якка ҳолда ёки 2–3 тадан кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан, баъзан аса вегетатив йўл билан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан йиғилиши ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб кетмоқда.

Маданийлаштирилиши. 1962 йилдан буён ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Буюртмахоналар ташкил қилиш ҳамда уруғ олиш мақсадида экиб ўстириш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий узкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 60–80 см с укороченным корневищем и радиально расходящимися слабоутолщенными многочисленными корнями. Листья широколинейные, шириной до 15–20 мм, низкие. Кисть цилиндрическая, длиной 20–30 см, негустая, немногочетковая. Прицветники узкотреугольные. Нижние цветоножки в 2 раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 3–5 жилками. Тычинки длиннее околоцветника. Плод – коробочка шаровидная, гладкая, крупная (более 1 см). Цветёт в мае-июне, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – горы Чулбайир, бассейн реки Тупаланг, северный склон Байсунтау.

Места обитания. Каменисто-глинистые, преимущественно северные склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается крайне редко, единично или небольшими (по 2–3 растения) группами.

Размножение. Семенное, редко – вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор населением, выпас скота.

Культивирование. С 1962 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходима организация заказника, введение в культуру с целью размножения.

Источники. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев



Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Chulbair mountains, the Tupalang river basin, the north slope of the Baysuntau (Surkhondarya region). Inhabits stony-clayish, mainly the northern slopes in the middle belt of mountains. Single or small groups (2–3 plants) extremely rarely can be found. Limiting factors: collection by the local population, pasturing. Measures of protection: it necessary to organize a state reserve, to introduce into cultivation for the purpose of its reproduction.



207. БОЙСУН ШИРАЧИ

Ширач байсунский / *Eremurus baysunensis* O. Fedtsch.

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойга хос камайиб кетган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60–80 см оралигидаги қўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқа, урчқисмон йўғонлашган илдизларининг эни 4–6 мм. Барглари ингичка қалами, эни 4–6 мм. Шингилли сийрак, қўп гулли, узунлиги 25–45 см. Гулдан баргчалари йирик, учбурчак наштақсимон. Шингилнинг пастидаги гулларининг бандлари гулқўрғонидан 1,5 марта узун. Гуллари хидли. Гулқўрғон баргчалари оқ, битта томирли. Чангчилари нотекис ва гулқўрғонидан қисқа. Меваси – қўсакча, чўзқроқ силлиқ, эни 6–7 мм, узунлиги 15–20 мм, уруелари ингичка қанотчали. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё, Сурхондарё вилоятлари: Қўғитанг тизмаси, Деҳқонобод. Бойсун ҳамда Денов шаҳарлари оралигидаги пастида тарқалган. Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Ола жинсли ва гипсли ерларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда жуда кам учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлиكنинг алоҳида ўсиш шароитларини талаб этадиган субстрат турга мансублиги, шунингдек унинг одамлар ва chorva mollari томонидан пайҳон қилинаётганлигидир.

Маданийлаштирилиши. 1964 йилдан бошлаб ЎзР ФА Ботаника боғида ўстиришга ҳаракат қилинган, аммо бу уринишлар натижа бермаган.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади. Табиатдаги тупларининг ҳолатини ўрганиш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

Ф.Ў Хасанов

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 60–80 см с укороченным корневищем и веретеновидными корнями толщиной 4–6 мм. Листья узколинейные, шириной 4–6 мм. Кисть рыхлая, многоцветковая, длиной 25–45 см. Прицветники крупные, треугольно-ланцетные. Нижние цветоножки в 1,5 раза длиннее околоцветника. Цветки душистые. Листочки околоцветника с 1 жилкой, белые. Тычинки неравные, короче около-

цветника. Плод – удлинённая, гладкая коробочка шириной 6–7 мм, длиной 15–20 мм. Семена узкокрылатые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: хребет Кугитанг, низкотгорья между городами Дехканабад, Байсун, Денау. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород и гипса.

Численность. Встречается крайне редко единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Требовательность растения к субстрату, сбор населением, выпас скота.

Культивирование. С 1964 года неоднократно предпринимались попытки интродуцировать вид в Ботаническом саду АН РУз. Через 2–3 года растения выпадали.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике. Требуются тщательные наблюдения и регулярная оценка состояния популяций.

Источники. [261, 279–282, 358].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the low mountains between Dekhanabad, Baysun, Denau (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits outcrops of gypseous rocks. Single specimens extremely rarely can be found. Limiting factors: demand of plant to the substrate, picking by the local population, pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan nature reserve. Observations and estimation of the state of populations are required.



208. КОРОВИН ШИРАЧИ

Ширач Коровина / *Eremurus korovinii* B. Fedtsch.

Мақоми 0. Ғарбий Тинь-Шанга хос ўта камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80 см га етадиган қўп йиллик ўт. Илдизпоysi қисқарган, нурсимон жойлашган бўлаклари бироз йўғонлашган. Барглари 30 см узунликда, эни 2 см, ингичка қилами, тарновсимон, қўқимтир, қиррали, қисқа тукли. Тўпгули кенг цилиндрсимон шингилдан иборат: Гуллари кенг қўнғироқсимон, оч пушти рангли, тубида сарик доғи бор. Гулқўрғон баргчалари 15–18 мм узунликда. Меваси – қўсасча, юмалоқ, силлиқ, диаметри 10–15 мм. Июль ойида гуллаб, уруғ беради.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Курама тоғида ўсган. Бир марта 1880 йилда Махмуд Мусо томонидан Кандирдовондан йиғилган. Кейинги қидиришлар натижасиз тугаган.

Ўсиш шаронти. Тоғнинг тошли ёнбағирларида ўсган.

Сони. Аниқланмаган. Йўқолиб кетган бўлиши мумкин.

Қўпайиши. Аниқ маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Кандирдовон, асосан, чорва моллари ҳайдаб ўтиладиган йўл бўлганлиги сабабли, ўсимлик оёқ остида қолиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсимлигини Курама ва Чотқол тизмаларидан излашни давом эттириш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 293, 358].

К.Ш. Тожибаев

Статус 0. Очень редкий эндемик Западного Тинь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см с укороченным корневищем, радиально расходящимися слабоутолщенными корнями. Листья длиной до 80 см и шириной 2 см, узколинейные, желобчатые, килеватые, сизые, коротко-опушенные. Соцветие в виде рыхлой цилиндрической кисти. Цветки ширококолокольчатые, светло-розовые, с жёлтым пятном у основания. Листочки околоцветника длиной 15–18 мм. Плод – гладкая шаровидная коробочка 10–15 мм в диаметре. Цветёт и плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: Кураминский хребет. Известен только по одному сбору. В 1880 году был собран Махмудом Мусой на перевале Кендырдаван. Дальнейшие попытки найти растение оказались безуспешными.

Места обитания. Каменистые склоны гор.

Численность. Не установлена. По-видимому, вид исчез.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Перевал Кендырдаван используется как скотопрогон, что могло явиться причиной исчезновения вида.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Необходимо продолжить поиски этого вида на Кураминском хребте и прилегающих склонах Чаткальского хребта.

Источники. [261, 279–282, 293, 358].

К.Ш. Тожибаев

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Kurama range (Tashkent region). It is known only by one specimen. In

1880, Makhmud Musa collected it in the Kendyrdavan pass. Further attempts to find this plant were unsuccessful. Inhabits stony slopes of mountains. Specimens has probably disappeared. Limiting factors: the Kendyrdavan pass is used as a pasture that could be the reason of the species disappearance. Measures of protection: it is necessary to go on searching of these species in the Kurama range and adjacent slopes of the Chatkal range.



209. МОМИҚ ШИРАЧ

Ширач пушистый / *Eremurus pubescens* Vved.

Мақоми 2. Жануби-ғарбий Помир-Олойга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80–100 см келадиган қўп йиллик ўт. Илдизлояси қисқа, нурсимон жойлашган, бўлаклари урчуқсимон йўғонлашган, эни 5–7 мм. Барги қалами, эни 2 см атрофида. Шингил сийрак, қўп гулли, узунлиги 40–55 см. Гулолди баргчалари ингичка учбурчак шаклда, момик тукли. Шингилдаги пастки гулларининг гулбанди гулкўрғонидан 2–2,5 марта узун. Гулкўрғон баргчалари оқиш-қизғиш рангда. Чангчилари гулкўрғон баргчаларидан қисқа. Қўсакчаси юмалоқ, эни 1,5 см, юпқа қобиқли. Май ойида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Тупаланг, Сангардак дарёлари ҳавзасида, Бойсунтоғда ва Чўлбайир тоғларида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги шалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кичик тулпар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аҳоли томонидан териб кетилиши ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. 1961 йилдан бошлаб ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Чўлбайир ёки Бойсунтоғда буюртмахона ташкил қилиниши лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 2. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое густопушное растение, высотой 80–100 см, с укороченными и радиально расходящимися веретеновидно-утолщенными (5–7 мм) корнями. Листья линейные, шириной около 2 см. Кисть рыхловатая, многоцветковая, длиной 40–55 см. Прицветники узкотреугольные, мохнатые. Нижние цветоножки в 2–2,5 раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника белые с розовым оттенком. Тычинки короче

листочков околоцветника. Коробочка шаровидная, тонкокожистая, шириной около 1,5 см. Цветёт в мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Бассейн рек Тупаланг и Сангардак, горы Чўлбайир и Байсунтау. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается небольшими группами.



Размножение. Семенное, редко – вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор населением и выпас скота.

Культивирование. С 1961 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходимо организация заказника Чўлбайирских или Байсунских гор.

Источники. [261, 279–282, 358].

Ф.О. Ҳасанов



Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Tupalang and Sangardak river basins, the Chulhair and Baysuntau mountains (Surkhandarya region). Inhabits slopes in the middle belt of mountains. Small groups of specimens can be found. Limiting factors: picking by population, cattle pasturing. Measures of protection: it is necessary to organize a protected area on the Chulhair or Baysun mountains.

210. НОР ШИРАЧ (ХУЛКА БОЛА)

Ширач мощный / *Eremurus robustus* Regel

Мақоми 3. Тянь-Шань ва Помир-Олойдаги ареали ажралган ва қисқариб бораётган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 100–250 см га етadиган қўп йиллик йирик ўт. Илдизпояси қисқа, нурсимон жойлашган, бўлақлари урмқисмон йўғонлашган. Барглари кенг қалами, эни 4–8 см, силлиқ. Шингилли тўғиз, қўп гулли, цилиндр шаклда, узунлиги 35–120 см. Гулдан баргчалари учбурчак шаклда. Шингилнинг пастки қисмидаги гулларнинг банди гулқўрғонидан 1,5–2 марта узун. Гулқўрғон баргчалари яқка томирли, оч пушти рангли. Чангчилари гулқўрғонидан бироз қисқа. Меваси – юмалоқ, силлиқ қўсакка ўхшайди, эни 1,5–2,5 см. Май-июлда гуллайдди, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Наманган, Жиззах, Самарқанд, Фарғона, Сурхондарё, Қашқадарё вилоятлари: Ғарбий Тянь-Шань ва Помир-Олоининг барча тизмалари, Тожикистон, Қозоғистон, Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги майда-жонс тупроқли ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Яқка-яқка ва кичик туплар ҳосил қилиб ўсади. Тошкент вилояти ҳудуди бўйича 100 000 атрофида тури бор.

Қўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ахри томонидан териб олинishi ва чорва молларининг қўлаб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. 1954 йилдан буён ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол, Зомин, Ҳисор, Китоб, Нурота, Сурхон қўриқхоналарида, Уғам-Чотқол ва Зомин миллий табиат боғларида муҳофаза қилинади. Ботаника боғларида қўпайтириш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

Ф.И. Каримов

Статус 3. Сокращающийся эндемик Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое мощное растение высотой 100–250 см с укороченным корневищем и радиальнорасходящимися веретеновидными утолщёнными корнями. Листья широколинейные, наружные шириной 4–8 см, гладкие. Кисть очень густая, многоцветковая, цилиндрическая, длиной 35–120 см. Прицветники треугольные. Нижние цветоножки в 1,5–2 раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 1 жилкой, светло-розовые. Тычинки немного короче околоцветника. Плод – шаровидная, гладкая коробочка шириной 1,5–2,5 см. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле-августе.

Распространение. В Ташкентской, Наманганской, Джиззакской, Самаркандской, Ферганской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях: все горные хребты западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая. За пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземистые и мелкоземисто-каменистые склоны в среднем поясе гор.



Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими группами. В Ташкентской области произрастает около 100 000 растений.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор населением.



Культивирование. С 1954 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского, Зааминского, Гиссарского, Китабского, Нуратинского, Сурханского заповедников, Угам-Чаткальского и Зааминского национальных парков. Необходимо размножение в ботанических садах.

Источники. [261, 279–282, 358].

Ф.И. Каримов

Endemic species of the Tien-Shan and Pamir-Alay with reducing area and population. It is spread at all mountain ranges of the western Tien-Shan and western Pamir-Alay (Tashkent, Jizzakh, Samarkand, Ferghana, Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits fine earth and fine «earth-stony» slopes in the middle belt of mountains. Single specimens and small populations can be found sporadically. Limiting factors: mass picking by the local population. Measures of protection: protected in the territory of the Chatkal, the Zaamin, the Hissar, the Kitab, the Nuratau, the Surkhan state nature reserves and the Ugam-Chatkal and Zaamin national parks. Reproduction in botanical gardens is required.

211. НУРОТА ШИРАЧИ

Ширач нуратинский / *Eremurus nuratavicus* A.P. Khokhr.

Мақоми 1. Нурота тизмасидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40–120 см га етадиган кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқа, бўлаклари урчуқсимон йўғонлашган. Барглари ингичка қалами, эни 10–30 мм. Шингил сийрак, узунлиги 15–25 см. Гулдан баргчалари оқ, узунлиги 12–14 мм. Гулбандларининг узунлиги 10–15 мм, гулқўрғондан биров узунроқ. Гулқўрғон баргчалари 3 томирли, оч сарик, қўнғир чизикли, узунлиги 8–11 мм. Чангчилари гулқўрғондан узунроқ. Меваси – кўсақдай, юмалоқ. Уруғлари ингичка қанотчали. Май ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Нурота тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта минтақасидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Умумий сони 1 000 тадан ошмайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. 1980 йилдан буён ЎзР ФА Ботаника боғида экилади.

Муҳофаза чоралари. Нурота қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [18, 314].

Н.Ю. Бешко

Меры охраны. Охраняется на территории Нуратинского заповедника.

Источники. [18, 314].

Н.Ю. Бешко



Rare endemic of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau range (Jizzakh region). Inhabits stony slopes in the middle of mountain belt. There are about 1 000 plants can be found. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.

Статус 1. Редкий эндемик Нуратау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 40–120 см, с укороченным корневищем и веретеновидно-утолщёнными корнями. Листья узколинейные, шириной 10–30 мм. Кисть негустая, длиной 15–25 см. Прицветники белые, длиной 12–14 мм. Цветоножки длиной 10–15 мм, немного длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 3 жилками, бледно-желтоватые, с коричневой полосой, длиной 8–11 мм. Тычинки длиннее околоцветника. Плод – коробочка, шаровидная. Семена узкокрылые. Цветёт в мае, плодоносит в июле.

Распространение. Джизакская область: Хребет Нуратау.

Места обитания. Каменные склоны среднего пояса гор.

Численность. Общая численность не превышает 1 000 экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. С 1980 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.



212. ОҚГУЛЛИ ШИРАЧ

Ширач молочноцветковый / *Eremurus lactiflorus* O. Fedtsch.

Мақоми 2. Гирбий Тянь-Шань ва Нуротадаги камайиб бораётган, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 45–100 см оралиғидаги қўп йиллик ўт. Илдизпоиси қисқа, бўлаклари урчуқсимон йўғонлашган. Барглари кенг қалами, эни 13–25 мм, силлиқ. Шингили сийрак, қўп гулли, узунлиги 15–30 см. Гулдан баргчалари ингичка учбурчак наштарсимон. Шингилнинг пастидидаги гуллариининг банди гулқўрғонидан 1,5–2 марта узун. Гулқўрғон баргчалари бир томирли. Чангчилари нотекис, гулқўрғонидан қисқа. Меваси – кўсакдай, юмалоқ, 3 та бўртмали, силлиқ, эни 20–30 мм. Май–июнда гуллаб, меваси июнь–июль ойларида етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Жиззах ва Навоий вилоятлари: Қоржантав, Угом, Писком, Чотқол, Курама ва Нурота тизмаларида тарқалган. Қирғизистон ва Қозғористонда ҳам ўсади.

Ўсиш шаронти. Тоғнинг ўрта қисмидаги тошли ва шагалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кичик тўшлар ва икка-якка ҳолда тарқалган. Тошкент вилоятида олиб борилган тадқиқотлар давомида 40 000–50 000 тупи аниқланган. Нурота тоғ тизмасида тахминан 100 та туп икки жойда ўсиши аниқланган.

Қўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзғариш сабаблари. Аҳоли томонидан териб олиннши, инги ерларни ўзлаштириш ва чорва моллари таъсирида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида экилади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол ва Нурота қўриқхоналарида, Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади. Табиатдаги мавжуд туплари назорат остига олиннши лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Сокращающийся по численности эндемик Западного Тянь-Шаня и Нуратау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 35–100 см, с укороченным корневищем и веретеновидно-утолщёнными корнями. Листья широколинейные, шириной 13–25 мм, гладкие. Кисть негустая, многоцветковая, длиной 15–30 см. Прицветники узко-треугольно-ланцетные. Нижние цветоножки в 1,5–2 раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 1 жилкой. Тычинки неравные, короче околоцветника. Плод – шаровидная коробочка с 3 выпуклостями, гладкая, шириной 20–30 мм. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.





Reducing endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam, the Pskem and Chatkal range, the Karzhantau mountains (Tashkent region), the Nuratau range (Jizzakh and Navoi regions). Inhabits and stony slopes in the middle belt of mountains. Single specimens rarely can be found in the accessible for human places, in almost inaccessible regions grows in groups. The population number in the Tashkent region is about 40 000 – 50 000 plants, at the Nuratau range-about 100 pants were counted in two locations. Limiting factors: picking of flowers. Measures of protection: protected in the Chatkal and Nuratau state nature reserves and the Ugam-Chatkal national park. Regular control of the state of populations is required.



Распространение. В Ташкентской, Джизакской и Навоийской областях: все хребты Западного Тянь-Шаня и Нуратинский хребет. За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Казахстан.

Места обитания. Щебнистые и каменистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Пронзрастает небольшими группами и единичными экземплярами. По данным последних исследований, в Ташкентской области насчитывается 40 000-50 000 особей. На хребте Нуратау учтено около 100 растений в 2 пунктах.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор на букеты, освоение земель и выпас скота.

Культивирование. С 1966 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском и Нуратинском заповедниках, Угам-Чаткальском национальном парке. Необходим постоянный контроль за состоянием популяций.

Источники. [261, 279-282, 358].

К.Ш. Тожибаев



213. САРИҚ ШИРАЧ

Ширач жёлтый / *Eremurus luteus* Baker

Мақоми 1. Ўзбекистондаги жуда камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 35–60 см оралигидаги кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқа, булаклари урчуқсимон йўғонлашган. Барглари ингичка қалами, эни 4–7 мм. Шингили сийрак, нисбатан кам гулли, узунлиги 20–30 см. Гулдан баргчалари йирик учбурчак наштаарсимон, шингилининг пастки қисмидаги гулларининг банди гулқўрғонидан 1,5 марта узун. Гуллари ҳидли. Гулқўрғон баргчалари якка томирли, оч сариқ. Чангчилари нотекис, гулқўрғонидан қисқа. Меваси кўсакчадай, чўзиқ, силлиқ. Уруғлари ингичка қанотчали. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё, Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор (Қизилча, Гузор, Дарбанд, Оқравот ва Дехқонобод атрофлари) ва Кўхитанг тизмалари оралигидаги паст тоғларда тарқалган. Туркменистон, Эрон ва Афғонистонда ҳам учрайди.

Усиш шароити. Очиқ ола жинс ва гипсларда ўсади.

Сони. Жуда кам сақланган, табиатда якка-якка ҳолда учрайди.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўзига хос тупроқ шароитига мослашганлиги ва чорва молларининг боқилиши ҳамда аҳоли томонидан териб олиниши унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. 1965 йилдан буён ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстиришга қаратилган кўплаб уринишлар натижа бермаган.

Муҳофаза чоралари. Табиатдаги мавжуд туплари устидан кузатишлар олиб бориш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Очень редкий в Узбекистане вид.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 35–60 см, с укороченным корневищем и слабоверетеновидно-утолщёнными корнями. Листья узколинейные, шириной 4–7 мм. Кисть негустая, сравнительно немногочетковая, длиной 20–30 см. Прицветники крупные, треугольно-ланцетные. Нижние цветоножки в 1,5 раза длиннее околоцветника. Цветки душистые. Листочки околоцветника с 1 жилкой, бледно-жёлтые. Тычинки разной длины, короче околоцветника.



Плод – коробочка, удлинённая, гладкая. Семена узкокрылые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: низкотропа в юго-западных отрогах Гиссарского хребта (окрестности Кызылчи, Гузара, Дербента, Акрабата и Дехканабада) и хребет Кугитанг. За пределами Узбекистана: Туркменистан, Иран и Афганистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород и гипса.

Численность. Встречается крайне редко, единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Требовательность растений к местам обитания, выпас скота, сбор населением.

Культивирование. С 1965 года неоднократно интродуцировался в Ботаническом саду АН РУз. Через 2–3 года растения выпали.

Меры охраны. Требуется постоянные наблюдения за состоянием растений в природе.

Источники. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев

Very rare species in Uzbekistan. It is spread at the low mountains of the western branches of the Hissar range, from Kyzylcha, Guzar and Dekhanabad to the Kughitang range (Kashkadarya and Surkhondarya regions). Inhabits outcrops of gypcaseous rocks. Single specimens extremely rarely can be found. Limiting factors: exigence of plants to habitat, cattle pasturing, collection by the population. Measures of protection: regular control of the state of populations in nature is required.



214. СУВОРОВ ШИРАЧИ

Ширач Суворова / *Eremurus suworowii* Regel

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Вўйи 50–70 см келадиган кўп йиллик ўт. Илдиэояси қисқа, нурсимон жойлашган, бўлаклари йўғонлашган. Барглари ингичка қалами. Поясининг пастки қисми, одатда, гадир-будур тукли. Шингилли деярли цилиндрсимон, сийрак, кам гулли, узунлиги 15–50 см. Гулдан баргчалари тор учбурчак шаклда. Пастки гуллариининг банди гулқўргондан 1,5–2,5 марта узун. Гулқўргон баргчалари бир томирли, оч сарик рангда. Чангчилари гулқўргондан қисқа. Қусакчаси юмалоқ, текис, эни 1–1,4 см. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси (Тупаланг ва Сангардак дарёлари ҳавзаси), Чўлбайир тоғлари. Қўхитанг ҳамда Боботонда тарқалган. Тожикистон ва Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори ва қуйи қисмларидаги майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Яқка-яқка ҳолда ва кичик туплар ташкил қилиб тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан, баъзан вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик ўсадиган жойларининг ўзлаштирилиши, чорва молларининг боқилиши ҳамда аҳоли томонидан йиғилиши сабабли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. 1960 йилдан буён ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Айрим популяциялари Сурхон давлат қўриқхонасида сақланади. Чўлбайир тоғларида ўсимлиكنинг ҳолатини кузатиб туриш учун буюртмахона ташкил этиш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 50–70 см, с укороченным корневищем и радиально расходящимися немногочисленными корнями. Листья узколинейные. Стебель обычно внизу шероховато-пушистый. Кисть почти цилиндрическая, рыхлая, немногочетковая, длиной 15–50 см. Прицветники узко-треугольные. Нижние цветоножки часто в 1,5–2,5 раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 1 жилкой, бледно-жёлтые. Тычинки короче околоцветника. Коробочка шаровидная, гладкая, шириной 1,4 см. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет (бассейны рек Тупаланг и Сангардак), горы Чульбаир, хребты Бабатаг и Кугитанг. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны в высоких предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Встречается одиночно и небольшими группами.

Размножение. Семенное, реже вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение территорий, сбор населением, выпас скота.

Культивирование. С 1960 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Сурханского заповедника. Необходимы организация заказника в Чульбаирских горах и регулярная оценка состояния популяций.

Источники. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar, the Chulbair, the Babatag, the Kughitang ranges (Surkhandarya region). Inhabits fine earth slopes in the foothills and lower belt of mountains. Single specimens and small groups can be found. Limiting factors: reclamation of areas, collecting by the population, cattle pasturing. Measures of protection: some populations are protected in the Surkhan state nature reserve. Organization of the state reserve in the Chulbair Mountains and regular control of the state of populations are required.



215. ЯШИЛ ГУЛЛИ ШИРАЧ

Ширач зеленоцветный / *Egermias chloanthus* Popov

Мақоми 0. Туркистон тизмасида жуда кам тарқалган, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60–70 см дан ошмайдиган қўп йиллик ўт. Илдизпоиси қисқа, нурсимон жойлашган, урчуқсимон бўлаклари бироз йўғонлашган. Барглари кенг-қалами, эни 15 мм. Шингили қалин, қўп гулли, деярли цилиндрсимон, узунлиги 25–30 см, Гулолди баргчалари учбурчак наштарсимон, четлари кинриксимон тукли. Шингилининг пастидаги гулбанди гулқўрғонидан қисқароқ. Гулқўрғон баргчалари якка томирли, яшилроқ рангли, узунлиги 14–15 мм. Чангчилари гулқўрғонидан 1,5 марта қисқа. Қўсақчаси номўълум. Июлда гулдайди.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Туркистон тизмасидаги Гуралашсойнинг юқори қисмида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги нам саз тупроқли ёнбағирлар.

Сони. Фақатгина бир марта Гуралашсойдан йиғилган (1926 йил 20 июлда), 1980–1981 йилларда олиб борилган қидириш ишлари натижа бермади. Тур йўқолиб кетган бўлиши ҳам мумкин.

Қўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Зомин давлат қўриқхонасида сақланади.

Манбалар. [261, 240, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев

Статус 0. Очень редкий эндемик Туркестанского хребта.

Краткое описание. Растение высотой 60–70 см с укороченным корневищем и несильно-веретеновиднo-утолщенными корнями. Листья широколинейные, шириной около 15 мм. Кисть густая, многоцветковая, почти цилиндрическая, длиной 25–30 см. Прицветники узко-треугольно-ланцетные, реснитчатые. Цветоножки нижние немного короче околоцветника. Листочки околоцветника

с 1 жилкой, зеленоватые, длиной 14–15 мм. Тычинки в 1,5 раза короче околоцветника. Плод – коробочка, неизвестна. Цветёт в июле.

Распространение. Самаркандская, Джизакская область: Туркестанский хребет – верховья Гуралашсай.



Места обитания. Вероятно, произрастает на влажных склонах и саях в верхнем поясе гор.

Численность. Найден один раз в ущелье Гуралаш (20 июля 1926 г.). Поиски в 1980 и 1981 гг. результатов не дали. Вид, по-видимому, исчез.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Зааминском государственном заповеднике.

Источники. [261, 240, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев



Very rare endemic species of the Turkestan range. It is spread at the Turkestan range: the Guralashsay (Jizzakh region). Probably inhabits, wet fine soils in the upper mountain belt. Found only in the Guralash Gorge (July 20, 1926). The research carried out in 1980–1981 were unsuccessful. Probably disappeared. Measures of protection: protected in the Zaamin state reserve.

216. ЭЧИСОН ШИРАЧИ

Ширач Эчисона / *Eremurus aitchisonii* Baker

Мақоми 3. Ўзбекистонда камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70–120 см орасидаги қўп йиллик ўт. Илдиз пояси қисқарган, нурсимон жойлашган, бўлаклари урчуқсимон йўғонлашган. Барглари кенг қалами, эни 5–8 см, оч яшил рангли, туксиз. Пояси туксиз ёки пастки қисми ғадир-будур тукли. Шингилли сийрак, камгулли, цилиндрсимон, 20–45 см узунликда. Гулдан баргчалари учбурчак шаклда, чўзинчоқ. Шингилнинг пасткидаги гулдан гулкўрғонидан икки марта узун. Гулкўрғон баргчалари бир томирли, пушти ранг. Чангчилари гулкўрғонидан 1,5 марта қисқа. Меваси – эни 1,5–2 см келадиган юмалоқ қўсақча. Май–июнь ойларида гуллаб, июнь–июлда уруғлайди.

Тарқалиши. Самарқанд, Сурхондарё, Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон ва Ҳисор тизмаларида, Чўлбайир, Бойсун, Қўхитанг тоғларида тарқалган. Қирғизистон, Тожикистон, Афғонистонда ҳам тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмида майда жинс тупроқли ва шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Яқка-яқка, баъзан кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан, баъзан вегетатив йўл билан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аҳоли томонидан йиғиб олиниши ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор ва Сурхон қўриқхоналарида муҳофаза қилинади. Чўлбайир тоғларида буюртмахона ташкил этиш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Редкий в Узбекистане вид.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 70–120 см с укороченным корневищем и радиально расходящимися веретеновидно-утолщенными корнями. Листья широколинейные, шириной 5–8 см, ярко-зелёные, голые. Стебель голый или при основании шероховато-опушенный. Кисть рыхлая, немногочетковая, цилиндрическая, длиной 20–45 см. Прицветники треугольные, длиннооттянутые. Нижние цветоножки в

2 раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 1 жилкой, розовые. Тычинки в 1,5 раза короче околоцветника. Плод – шаровидная коробочка, шириной 1,5–2 см. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Самаркандской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях: Зеравшанский и Гиссарский хребты, горы Чўлбайир, Байсунтау, Қўхитанг. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан.

Места обитания. Мелкоземистые и мелкоземисто-каменистые склоны в нижнем поясе гор.



Численность. Встречается редко, единичными экземплярами, иногда небольшими группами.

Размножение. Семенное, редко – вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный сбор населением, выпас скота.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском и Сурханском государственных заповедниках. Необходимо организация заказника в горах Чўлбайир.

Источники. [261, 279–282, 358].
К.Ш. Тожибаев

Rare species in Uzbekistan. It is spread at the Zhetysay and Hissar ranges, the Chulbair, the Baysuntau, the Kughitang mountains (Samarkand, Surkhondarya and Kashkadarya region). Inhabits fine earth and fine earth-stony slopes in the lower belt of mountains. Solitary specimens or small groups rarely can be found. Limiting factors: the intensive collection by local population, cattle pasturing. Measures of protection: protected in the Hissar and Surkhan state reserves. It is necessary to organize a protected area in the Chulbair mountains.



ШОТАРАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ДЫМЯНКОВЫЕ –
FUMARIACEAE

217. ТУРКИСТОН ШОТАРАЧАСИ

Дымянница туркестанская / *Fumariola turkestanica* Korsh.

Мақоми 2. Олой тизмасидаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–15 см орасидаги қўп йиллик, қўқимтир ўт. Пояси битта, ингичка, асосидан шохланган. Барглари узун бандли, икки қарра уч бўлакка бўлинган, туксиз. Япроқлари 2–3 бўлакли. Тўпгули соябонсимон, кам гулли, шингили баргларида кичик. Гуллари майда, қўқимсиз, сарғиш. Меваси ёнғоқча, узунлиги 3 мм, эни 1 мм, қорамтир рангли, гадир-будур. Май-июнь ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Шохимардон ва Исфайрам дарёлари ҳавзаларида тарқалган. Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Оҳақтошли қояларнинг ёриқларида ўсади.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсимлик ареалига аниқлик киритиш ва биологик ҳусусиятларини ўрганиш лозим.

Манбалар. [167, 242].

Г.А. Лазьков

Статус 2. Редчайший эндемик Алайского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое сизоватое растение высотой 10–15 см. Стебель одиночный, тонкий, ветвистый от основания. Листья длинно-черешковые, дважды тройчаторассечённые, голые. Сегменты листа двух-трёхлопастные. Соцветие – зонтиковидная кисть, не выступающая из листьев, с немногочисленными мелкими, невзрачными, желтоватыми цветками. Плод – орешек, длиной 3 мм, шириной 1 мм, при созревании чернеющий, слабощероховатый. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Ферганская область: бассейн реки Шохимардан. За пределами Узбекистана: Кыргызстан (Исфайрам).

Места обитания. Трещины известняковых скал.

Численность. Достоверно известно 5 небольших популяций на скалах между кишлаками Вуадиль, Шохимардан и Ярдан. В связи с приуроченностью к скалам численность очень мала.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Необходимы уточнение ареала, контроль за популяциями и изучение биологических особенностей.

Источники. [167, 242].

Г.А. Лазьков

Сони. Водил. Шохимардон ва Ёрдон қишлоқлари ўртасидаги қояларда 5 та тупи мавжуд. Тошқояларда ўсиши туфайли сони ҳам ниҳоятда кам.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.



Rare endemic species of the Alay range. It is spread at the Shakhimardan river basin (Ferghana region). Inhabits clefts of limestone rocks. Known for certain 5 small populations in rocks between the Vuadil, the Shakhimardan and Yardan villages. The number of plants is very low because the species is a stenotopic petrophyte. Measures of protection: it is necessary to define more exactly the area, to control populations and to study biological characteristic features.

ШҲРАДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО МАРЕВЫЕ -
CENORODIACEAE

218. ЎТКИРБАРГ БАЛИКҚЎЗ

Климакоптера остроллистная / *Climacoptera oxurphylla* U.P. Prator

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жанубий қисмида кичик майдонда сақланиб қолган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10-15 см, асосидан шохлаган, бир йиллик ўт. Ўсимликнинг пастки қисми қалин, юқори қисми эса сийраклашган, узун, кўп хужайрали, чалкаш, ярим ётиқ туклар билан қопланган. Шохчалари ва барглари кетма-кет жойлашган, поядаги барглари-нинг банди поясига ёпишган. Барглари этли, қалами ярим цилиндрсимон, учи ўткир, баргининг учи гуж тукли. Гуллари якка, рўваксимон тўпгулга йиғилган. Гулдоли барги этли, учи ўткир, ён-баргча ва гулқўрғонлардан узунроқ. Гулқўрғони 5 баргчали, узунлиги 6 мм, мевалаган пайтида юқори қисми тукли қанотчалар ҳосил қилади. Чангчиси 5 та. Тумшукчаси бигизсимон, гулқўрғонидан қисқа. Уруғи ётиқ жойлашган.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ўзбекистоннинг жанубида Шеробод водийсидаги Майдон қишлоғи атрофларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Очик ола жинсли ерларда ўсади.

Сони. Кам учрайди, якка-якка ҳолда ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ола жинсли ерларда ўсиши ва у ўсган ерларда чорва молларининг боқилиши унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маданийлаштирилмаган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Чорва молларини боқилиши (айниқса, ўсимликнинг уруғи етилган даврда) чеклаш лозим.

Манбалар. [159, 253].

У.П. Пратов

Статус 2. Узколокальный эндемик южной части Узбекистана.

Краткое описание. Однолетнее растение высотой 10-15 см, ветвящееся от основания, опушенное внизу густыми, кверху редующими, длинными, многоклеточными, спутанными или полуприжатными волосками. Ветви и листья

очередные, стеблевые листья низбегающие, мясистые, линейные, полуэллиптические, на конце островатые, с волосками, собранными в кисточку. Цветки одиночные, собраны в метельчатое соцветие. Прицветные листья мясистые, на конце с остроконечием, длиннее прицветников и околоцветника. Листочков околоцветника 5, длиной до 6 мм, при плодах крылатые, над крыльями опушенные. Тычинок 5. Рыльца шиловидные, короче околоцветника. Семена горизонтальные.

Распространение. Сурхондарьинская область: юг Узбекистана, Шерабадская долина, окрестности кишлака Майдан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород.

Численность. Малочислен, встречается единичными растениями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к пестроцветным породам, поедание животными.

Культивирование. Не культивируется.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Необходимо ограничение выпаса скота в период созревания семян.

Источники. [159, 253].

У.П. Пратов

Rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the southern Uzbekistan, the Sherabad valley nearby the village Maidan (Surkhondarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks. Not numerous, single specimens can be found. Limiting factors: gypseous rocks, eaten by animals. Measures of protection: not protected.



219. МАЛИГИН БАЛИҚҚЎЗИ

Климакоптера Малигина / *Climacoptera malyginii* (Korovin ex Botsch.) Botsch.

Мақоми 2. Мирзачўлда тарқалган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик, ўт ўсимлик, бўйи 30–35 см, ёш ниҳол пайтида узун, ингичка, чалкаш тукли, кейинчалик туксизлана бошлайди. Барглари этли, қалами, учи тўмтоқ. Гулолди барглари поянинг пастиди гулёнбаргчалардан узун, юқорисида улардан қисқа. Гулёнбаргчалари гулкўрғонидан қисқа, тухумсимон. Гулкўрғон бўлаклари наштасимон, туксиз, меваси етилиши билан ярмидан пастиди қанотчалар пайдо бўлади. Чангдонининг узунлиги 1,5 мм, ярмигача бўлинган, учигаги бўртмаси пуфаксимон. Уруғчиси гулкўрғонидан узун. Июнь–сентябрь ойларида гуллаб, меваси етилади.

Тарқалиши. Эндемик тур. Сырдарё воҳаси (Мирзачўл)да тарқалган (Сырдарё вилояти).

Ўсиш шароити. Шўрхок тупроқларда ўсади.

Сони. Сийрак ҳолда ўсади. Сони аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу тур тарқалган жойларда деҳқончилик қилиниши ва мол боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [35, 159].

Ў.П. Пратов

Статус 2. Редкий эндемик Голодной степи.

Краткое описание. Однолетнее растение высотой 30–35 см, в молодом состоянии опушенное длинными, тонкими, спутанными волосками, в последствии голые. Листья мясистые, линейные, тупые. Прицветные внизу длиннее, вверху короче прицветничков. Прицветнички яйцевидные, короче околоцветника. Листочки околоцветника ланцетные, голые, ниже середины развивают крылья. Пыльники длиной около 1,5 мм, разделенные до половины, придатки пузыревидные. Пестик длиннее околоцветника. Цветет и плодоносит в июне–сентябре.

Распространение. Сырдарьинская область: встречается в бассейне реки Сырдарья – Мирзачуль.

Места обитания. На солончаках.

Численность. Встречается спорадически на небольших участках.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение территорий под сельхозкультуры и интенсивный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [35, 159].

Ў.П. Пратов

Rare endemic species of the Mirzachul. It is spread at the Syrdarya river basin: the Mirzachul (Syrdarya region). Inhabits saline soils. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



220. ПЯТАЕВА БАЛИҚҚЎЗИ

Климакоптера Пятаевой / *Climacoptera pyataevae* U.P. Pratov

Мақоми 2. Ғарбӣ Ҳисорда тарқалган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик ўт ўсимлик, бўйи 10–15 см, қалин, узун, чалқаш ва сийрак, қисқа, деярли тўғри тукли. 3–7 жуфт шохлари ва барглари қарама-қарши, қолганлари кетма-кет ўрнашган. Поядаги барглари серэт, қалами, тўмтоқ, узунлиги 12–(14) мм, эни 1,5 мм. Гуллари рўвакда ўрнашган. Гулолди барги серэт, узунлиги 10 мм, гулқўрғон ва ёнбаргчаларидан узун. Гулён-баргчалари, гулқўрғонига тенг ёки гулқўрғонидан қисқа. Гулқўрғони 5 бўлакли, меваси етилганда ярмидан пастроғида пардасимон қанотчалар пайдо бўлади. Чангчиси 5 та, чангдонининг учида

ларнинг салбий таъсири туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайд.

Манбалар. [159, 253].

Ў.П. Пратов

Статус 2. Редкий эндемик Западного Гиссара.

Краткое описание. Однолетнее растение высотой 10–15 см, опушенное густыми длинными спутанными и рассеянными короткими волосками. Листья супротивные, очередные. Стеблевые листья мясистые, линейные, тупые, длиной 12–14 мм, шириной 1,5 мм. Цветы собранные в метельчатое соцветие. Прицветные листья мясистые, длиной до 10 мм, длиннее прицветничков и околоцветника. Листочков околоцветника 5, при плодах ниже середины развивающих пленчатые крылья. Тычинок 5, придатки пыльников пузыревидные, яйцевидные, белые. Семена горизонтальные.

Распространение. Кашкадарьинская область: встречается в бассейне р. Кашкадарья в окрестностях кишлаков Туртсары и Сийрак.

Места обитания. Мелкощебнистые засоленные почвы на подгорной равнине.

Численность. Встречается редко. Численность не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение земли и интенсивный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 253].

У.П. Пратов

Rare endemic species of the western Hissar range. It is spread at the Kashkadarya river basin; nearby the villages Turtsary and Siyrak (Kashkadarya region). Inhabits saline soils in the piedmont plain. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.

пуфаксимон оқ тухумсимон бўртмаси бор. Уруги текис ўрнашган.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Қашқадарё воҳасидаги Туртсары ва Сийрак кишлоқлари атрофларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғолди текисликларидаги майда чағиртошли ва шўрланган тупроқларда тарқалган.

Сони. Сийрак тарқалган. Сони аниқланмаган.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши ва антропоген омил-



221. ТЎМТОҚ ГҮЛЁНБАРГЧАЛИ БАЛИҚҚЎЗ

Климакоптера тупоприцветничковая / *Climacoptera amblyostegia* [Botsch.] Botsch.

Мақоми 2. Қизилқум ва Мирзачўлда тарқалган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик ўт ўсимлик, бўйи 5–30 см, асосидан шохланган, ёш ниҳол пайтида тукли, кейинроқ туксизланади. Барглари этли, қалами, учи тўмтоқ. Гулдан баргичикроқ, гулёнбаргчалардан узун. Гулёнбаргчалари тухумсимон, ўртасидан пастроғида қанотчалари бор. Чангдон бўртмаси пуфаксимон. Июль–сентябрда гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Сирдарё, Навоий ва Бухоро вилоятлари: Мирзачўлда ва Қизилқумда тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Қозоғистонда ҳам тарқалган.



Ўсиш шароити. Шўрхок тупроқларда ўсади.

Сони. Кичик-кичик туғилар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғи орқали қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш

сабаблари. Ерларнинг дехқончилик учун ўзлаштирилиши ва чорва боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши.

Мазлумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари.

Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [35, 159].

У.П. Пратов

Статус 2. Редкий эндемик Голодной степи и Кызылкума.

Краткое описа-

ние. Однолетнее растение высотой 5–30 см, от основания кустиковидно ветвистое, в молодом состоянии опушенное длинными, тонкими, спутанными волосками, впоследствии голое. Листья мясистые, линейные, тупые. Прицветные длиннее прицветничков.

Прицветнички яйцевидные, тупые, короче околоцветника. Листочки околоцветника ланцетные, голые, ниже середины развивают крылья. Крылья вместе с околоцветником 10–14 мм в диаметре. Придатки пыльников пузыревидные. Семена горизонтальные. Цветет и плодоносит в июле–сентябре.

Распространение.

Сырдарьинская, Навоийская и Бухарская области: долина реки Сырдарья, Кызылкум, Мирзачуль. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. На солончаках.

Численность. Немногочисленные, сильно разрозненные популяции.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сельскохозяйственное освоение земель, выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [35, 159].

У.П. Пратов

Rare endemic species of the Kyzylkum and Mirzochul. It is spread at the Kyzylkum, the Mirzochul and the Syrdarya river basin (Syrdarya, Navoi and Bukhara regions).

Inhabits saline soils. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats, agriculture and pasturing. Measures of protection: not protected.



222. МЕРКУЛОВИЧ БАЛИҚҚҶЗИ

Климкоптера Меркуловича / *Climacoptera merkulowiczii* (Zakirov) Botsch.

Мақоми 2. Қизилқумда тарқалган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик ўт ўсимлик, бўйи 10–40 см, қалин, қисқа, тарвақайлаган, сийрак узун, чалқаш, кейинроқ камайиб кетадиган тукли. Асосидан шохланган. Барглари этли, қалами, ярим цилиндрсимон, тўмтоқ, гулолди барги овалсимон, қайиқчасимон, гулёнбаргчалари ва гулқўрғонидан қисқа ёки унга тенг, четлари



пардасимон ҳошияли. Гулқўрғон бўлзклари кенг наштарсимон, пуштиранг. Август ва октябрда гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Бухоро вилояти; Қизилқумда тарқалган.

Ўсиш шаронти. Шўрхок тупроқларда ўсади.

Сони. Кичик-кичик майдонларда жамоалар ҳосил қилади.

Қўпайиши. Уруғи орқали қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [35, 159].

У.П. Пратов

Статус 2. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Однолетнее растение высотой 10–40 см, опушенное короткими, торчащими и более редкими длинными, спутанными, позднее стирающимися волосками. Листья мясистые, линейные. Прицветные овальные, тупые, короче прицветничков и околоцветника. Прицветнички овальные или равны ему, по краю узко пленчато окаймленные. Листочки околоцветника широколанцетные или яйцевидные, пленчатые, опушенные. Пыльники с пузыревидным розовым придатком. Се-

мена горизонтальные. Цветет и плодоносит в августе–октябре.

Распространение. Бухарская область: Кызылкум.

Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение земельных участков под сельскохозяйствуры и выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [35, 159].

У.П. Пратов

Rare endemic species of the Kyzylkum desert. It is spread at the Kyzylkum (Bukhara region) Inhabits saline soils. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



223. ҚАНОТИ ТУКЛИ БАЛИҚҚЎЗ

Климакоптера пtilлоптера / Climacoptera ptilloptera U.P. Prатов

Мақоми 2. Устюртда тарқалган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик ўт, бўйи 40–50 см, қисқа, тўғри, чалкаш ва узун қалин тукли. Шох ва барглари навбат билан жойлашган. Пойдаги барглари серэт, ингичка қалами, учи тўмтоқ, узунлиги 12 мм, эни 1,5 мм, гулбандарчалари ва гулқўрғонидан узун. Гулқўрғони 5 бўлакли, узунлиги 4,7 мм, эни 11 мм, меваси етилганда ўртасидан сал пастроғида усти тукли қанотчалар пайдо бўлади. Чангчиси 5 та, чангдонининг учиди луфаксимон бўртмаси бор. Уруғи текис ўрнашган. Меваси октябрь ойида етилади.

Тарқалиши. Қорақалпоғистон Республикаси: Устюрт ва шарқий чинкда тарқалган.

Ўсиш шароити. Шўрланган, кулранг-қўнғир тупроқларда ўсади.

Сони. Сийрак тарқалган. Сони аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши ва тупроқнинг шўрлиги туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [59, 253].

Ў.П. Пратов

Статус 2. Редкий эндемик Устюрта.

Краткое описание. Однолетнее растение высотой 40–50 см, опушенное густыми, прямыми, оттопыренными и густыми длинными волосками. Ветви и листья очередные. Стеблевые листья мясистые, узколинейные, тупые, длиной 12 мм, шириной 1,5 мм. Прицветные листья длиннее околоцветника. Листочков околоцветника 5, длиной 4,7 мм и шириной 11 мм, при плодах чуть ниже середины развивающихся пленчатые, сверху опушенные крылья. Тычинок 5, придатки пыльников белые или розовые, пузыревидные. Семена горизонтальные. Плодоносит в октябре.

Распространение. Каракалпакстан: встречается на Устюрте и на восточном чинке.

Места обитания. На серо-бурых засоленных почвах.

Численность. Встречается редко, небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота и засоление почвы.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [59, 253].

Ў.П. Пратов

Rare endemic species the Ustyurt Plateau. It is spread at the Ustyurt Plateau: the eastern cliff (Karakalpakstan). Inhabits saline soils. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



224. СЕРТУК БУЗОҚБОШ

Галлимокснемис войлочноцветковый / *Halmoxnemis lasiantha* Iljin

Мақоми 2. Фарғона водийсига ҳос ареали қисқариб бораётган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см га етадиган, асосидан шохланувчи, тарвақайлаган, қисқа туклар билан қопланган, бир йиллик этдор ўт. Барглари ингичка-қалами, узунлиги 20–40 мм, пастки томони қабарик, устки томони ясси. Гулқўрғон баргчалари (5) юпқа, узунлиги 6–7 мм, ўткир учли. Меваси конуссимон, асоси ясси, узун чалқаш туклар билан қопланган. Июль–сентябрь ойларидан гуллаб, мева беради.



Статус 2. Редкий с сокращающимся ареалом эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Однолетнее мясистое растение, ветвящееся от самого основания и редко достигающее высоты 25 см, покрыто короткими оттопыренными волосками. Листья узколинейные, длиной 20–40 мм, снизу выпуклые, сверху плоские. Листочки околоцветника (5) плёчатые, длиной 6–7 мм, остроконечные. Плоды конические, основания плоские, покрыты длинными спутанными волосками. Цветёт и плодоносит в июле–сентябре.

Распространение. В Наманганской и Ферганской областях: Ферганская долина.

Места обитания. Каменисто-щебнистые почвы предгорий, сухие русла рек.

Численность. Встречается одиночными кустами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота и интенсивное сельскохозяйственное освоение территорий, где произрастает вид.

Культивирование. Предпринимались попытки выращивания вида в Ботаническом саду АН РУз, которые, однако, не дали результатов.

Меры охраны. Места произрастания вида необходимо сохранить.

Источники. [35, 159].

УП, Пратов

Rare endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the Ferghana valley (Namanagan and Ferghana regions). Inhabits stony soils of foothills, dry river-beds. Single specimens can be found. Limiting factors: Cattle pasturing and the intensive reclamation of species habitats for agriculture. Measures of protection: it is necessary to reserve these species locations.

Тарқалиши. Наманган, Фарғона вилоятлари; Фарғона водийсида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларида, тошли-шағалли тупроқларда, курук ўзаниларда ўсади.

Сони. Табиатда яқка-яқка ҳолда тарқалган.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари истеъмол қилиши ва ўсимлик тарқалган ерларнинг ўзлаштирилиши оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғи тажриба даласида ўстириб қўрилганда ижобий натижа бермаган.

Муҳофаза чоралари. Табiiй ҳолда ўсиб турган жойларини сақлаб қолиш лозим.

Манбалар. [35, 159].

УП, Пратов



225. БОЧАНЦЕВ ТОШБИЮРҒУНИ

Нанофитон Бочанцева / *Nanophyton botschantzevii* U.P. Prатов

Мақоми 2. Гарбий Тянь-Шанда жуда кичик майдонда сақланиб қолган ниҳоятда камёб, реликт, эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–40 см келадиган, тигиз ёстикча ҳосил қилиб, ер бағирлаб ўсувчи сершоҳ бута. Барглари кетма-кет жойлашган, дағал, учи тиканли, узунлиги 6 мм. Гуллари 2–9 тадан, шохчаларнинг учларида жойлашган. Ҳар бир гул биттадан гулолди ва иккитадан гулёнбаргчага эга. Гулқўрғон баргчалари юлқа. Уруғлари тик, узунлиги 4–6 мм. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси октябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: денгиз сатҳидан 1 600–2 000 м баландликда Чотқол тизмаси (Нуракота, Белдирсой)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тош-шағалли ёнбағирлар арча ва бутазорларида, асосан, очик жойларда ўсади.

душку. Стебли стелющиеся или слегка приподнимающиеся, многократно ветвящиеся. Листья длиной до 6 мм, очередные, на верхушке с коротким шипком. Цветки собраны по 2–9 на концах ветвей. Каждый цветок с прицветным листом и 2 прицветниками. Листочки околоцветника плёчатые. Семена вертикальные, длиной 4–6 мм. Цветёт в июне–июле, плодоносит в октябре.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет (бассейны рек Нуреката и Бельдерсай), на высоте 1 600–2 000 м.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны, среди арчовников и кустарников, преимущественно на открытых местах.

Численность. Сохранились небольшие заросли на площади около 3 га на водоразделе Уйнатай и пгтна по 10–20 кустов в ущелье Ирғайлисай.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Район интенсивно используется в качестве летних пастбищ.

Культивирование. Посевы семян не дали положительных результатов: всходы во второй половине лета засыхали.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [156–159, 260, 261].

У.П. Пратов

Extremely rare, relict endemic species of the western Tien-Shan. It is spread

at the Chatkal range (the Nurekata and Beldersay basins) at the height of 1 600–2 000 m (Tashkent region). Inhabits stony slopes, among the juniper stands and shrubs, mainly in the open places. Small populations grow in the area of about 3 ha at the watershed of the Ulnatau and groups of 10–20 specimens in the Irğailisay gorge. Limiting factors: this area is intensively used as the summer pasture lands. Measures of protection: not protected.



Сони. Ўйнатой сувайирғичида кичик майдон (3 гектар атрофи)да ва Ирғайлисойда 10–20 тупдан иборат тўплар ҳосил қилиб учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик тарқалган жойлардан чорва моллари учун ёзги ўтлоқ сифатида фойдаланилади.

Маданийлаштирилиши. Уруғидан экилганда ижобий натижа бермаган. Униб чиққан ниҳоллари ёзининг иккинчи ярмида қуриб қолган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [156–159, 260, 261].

Ў.П. Пратов

Статус 2. Чрезвычайно редкий, узколокальный, реликтовый эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Кустарник высотой 20–40 см, образующий довольно крепкую, плотную по-

226. ДРОБОВ ШЎРАГИ

Соланка Дробова / *Salsola drobovii* Botsch.

Мақоми 3. ГАРБИЙ Тянь-Шань ва Олой тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50–70 см келадиган ярим бута. Бир йиллик пояларининг узунлиги 20 см, оқш, туксиз, баъзан адир-будур. Барглари кетма-кет жойлашган, туксиз, қўқимтир, этли, қалами, узунлиги 1,5–2,5 см, эни 1–1,5 мм, тўмтоқ. Тупгули ёйиқ бошоқсимон. Гулқўрғон баргчалари чўзиқ-тухумсимон ёки чўзиқ-овал шаклида, узунлиги 4–6 мм, пардасимон, туксиз, рангсиз. Уруғи ёттиқ жойлашган. Июлда гуллаб, меvasи октябрь ойида етилади.

Тарқалиши. Фарғона водийси: Наманган ва Фарғона вилоятлари – Курама ва Олой тизмаларининг адирларда тарқалган. Қозоғистон ва Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тош-шағал тупроқли ёнбағирларда, баъзан ола жинсларда ва тоғларнинг қўйи қисмида ўсади.

Сони. Яқка-яқка ҳолда, баъзан эса йирик тўплар ташкил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликнинг кам уруғ бериши ва уруғидан яхши униб чиқмаслиги, шунингдек, у ўсган жойларда чорва моллари муттасил боқилиши сабабли сони қисқариб кетмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [35, 156–159, 249].

Ў.П. Пратов

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня и Алайского хребта.

Краткое описание. Полукустарник высотой 50–70 см. Однолетние побеги длиной 20 см, беловатые, голые, реже шероховатые. Листья очередные, неопушенные, сизые, мясистые, линейные, длиной 1,5–2,5 см и шириной 1–1,5 мм, тупые. Соцветие рыхлоколосовидное. Листочки околоцветника удлинненно-яйцевидные или продолговато-овальные, длиной 4–6 мм, пленчатые, голые, неокрашенные. Семена горизонтальные. Цветёт в июле, плодоносит в октябре.

Распространение. Ферганская долина: Наманганская и Ферганская области – предгорья Кураминского и Алайского хребтов, За пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан.

Места обитания. На каменистых и щебнистых склонах, реже на пестроцветках в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается одиночно, реже образует заросли.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Слабое плодоношение, низкая всхожесть семян, а также интенсивное использование территории под выпас скота.



Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не разработаны.

Источники. [35, 156–159, 249].

У.П. Пратов

Rare endemic species of the western Tien-Shan and Alay range. It is spread at the Ferghana valley, the foothills of Kurama and Alay ranges (Namangan and Ferghana regions). Inhabits stony and slopes, seldom outcrops of gypseous rocks in the lower belt of mountains. Single specimens and rarely large groups can be found. Limiting factors: weak fruiting, low seed germination and also the intensive use lands under cattle pasturing. Measures of protection: not protected.



227. ТИТОВ ШЎРАГИ

Солынка Титова / *Salsola titovii* Boetsch.

Мақоми 3. Помир-Олой ва Ғарбий Тянь-Шанга хос реликт; эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган ярим-бута. Бир йиллик новдалари 20 см га етади, ингичка, қалин туклар билан қопланган. Барглари кетма-кет жойлашган, қалами, узунлиги 0,3–1,5 см, эни 0,5–1 мм, қалин кулранг туклар билан қопланган. Тўпгули бошқосимон, сийрак гулли. Гуллари қўримсиз, гулқўрғон бўлаклари ва чангчилари 5 тадан. Меваси етишгач, гулқўрғон бўлакларида қанотчалар пайдо бўлади. Меваси етиқ жойлашган. Июнь–октябрь ойларида гуллаб, уруқлайди.

Тарқалиши. Тошкент, Самарқанд вилоятлари: Ғарбий Тянь-Шанда-Чотқол ва Қурама тизмаларида, Помир-Олойда (Гобдунтоғ, Омонқўтонда) тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва пастки қисмида, тош-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Яқка-яқка ҳолда ёки тўп-тўп бўлиб ўсади.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқилишидан зарар кўради.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол қўриқхонаси ва Уғам-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида муҳофаза қилинади. Ўсимлик сақланиб қолган ерларни назорат остига олиш ва ботаника боғларида экиб ўстириш лозим.

Манбалар. [35, 156–159, 249].

Ў.П. Пратов

Статус 3. Реликтовый эндемик Памиро-Алая и Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Полукустарник высотой 50 см. Однолетние побеги длиной до 20 см, тонкие, покрытые густым опушением. Листья очередные, сероватые от густого опушения, линейные, длиной 0,3–1,5 см, шириной 0,5–1 мм. Соцветия колосовидные с редко расставленными цветками. Цветки невзрачные, листочков околоцветника и тычинок по 5. При плодах на листочках околоцветника развиваются крылья. Семена горизонтальные. Цветёт и плодоносит в июне–октябре.

Распространение. В Ташкентской и Самаркандской областях: Западный Тянь-Шань – Чаткальский и Кураминский хребты; Памиро-Алай – Хобдунтау, Аманкутан.

Места обитания. На каменисто-щебнистых склонах в среднем и нижнем поясе гор.

Численность. Встречается одиночными экземплярами и небольшими зарослями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского заповедника и Угам-Чаткальского национального парка. Необходимо сохранить имеющиеся популяции и культивировать в ботанических садах.

Источники. [35, 156–159, 249].

У.П. Пратов

Relict endemic species of the Pamir-Alay and western Tien-Shan. It is spread at the western Tien-Shan: the Chatkal and Kurama range; the Pamir-Alay; the Khobduntau range, Amankutan (Tashkent and Samarkand regions). Inhabits stony slopes in the middle and lower belts of mountains. Single specimens can be found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park. It is necessary to protect populations and to cultivate in botanical gardens.



228. ХИВА ШЎРАГИ

Солонча хивинская / *Salsola chivensis* Popov

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг шимолидаги реликт тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–60 см оралиғидаги, туксиз ярим бута. Барглари кетма-кет жойлашган, этли, исси. Тўпгули бошқосимон. Гулқўрғон баргчаларда мевалаган пайтида ҳосил бўладиган қанотчалари юпқа пардасимон, буйраксимон ёки тескари тухумсимон. Июль ойида гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Қорақалпоғистон: Уstyurt ва Қизилқум (Султон Увайс тоғ)да тарқалган. Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шаронти. Кулранг қўнғир гипсли ва ошакчил тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ҳамда тўплар ҳосил қилиб тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқилиши, ҳайдаб ўтилиши натижасида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чорва молларидан сақлаш керак.

Манбалар. [35, 156–159, 249].

Ў.П. Пратов

Статус 2. Реликтовый вид Северного Узбекистана.

Краткое описание. Полукустарник высотой 30–60 см, голый. Листья очередные, мясистые, по-

лувальковатые. Соцветие колосовидное, при плодах на листочках развиваются полупрозрачные, почковидные или широко обратнояйцевидные крылья. Цветёт в июле, плодоносит в сентябре.

Распространение. Каракалпакстан: Встречается на плато Уstyurt и в Кызылкумах (Султан Увейсдаг). За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. На серо-бурых гипсованных и мергелистых почвах.

Численность. Встречается как единично, так и в зарослях.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота, скотопогон.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Необходимо охранять от выпаса скота.

Источники. [35, 156–159, 249].

У.П. Пратов

Relict species of the northern Uzbekistan. It is spread at the Ustyurt and Kyzylkum (Sultanuzdag), (Karakalpakstan). Inhabits grey-brown gypseous and marl soils. Single specimens as well as brushwoods can be found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection; it is necessary to protect from pasturing.



229. ТЯНЬ-ШАНЬ АНТОХЛАМИСИ

Антохламис тьяншанский / *Anthochlamys tianschanica* Iljin

Мақоми 2. Фарғона водийсида тарқалган кам-ёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик, сершоҳ ўт ўсимлик, бўйи 30–90 см, пастки қисми туксиз, юқори қисми қисқа, жингалак тукли. Гуллари икки жинсли, рўваксимон тўпгулда ўрнашган. Чангчиси 5 та. Гулқўрғони пардасимон. Барглари оддий, исси, пасткилари наштасимон, бандли, юқорисидагилари қалами, учи ўткир. Гулолди барги наштасимон, учи ўткир, гулқўрғонидан узун, мевасида кичик. Мевасининг эни 3 мм, учи чуқурчали. Август ва сентябрда гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Фарғона ва Наманган вилоятлари: Ғарбий Тянь-Шань (Фарғона водийсининг шимоли-шарқий, шимоли-ғарбий қисми)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмларидаги чағиртошли, тошчағиртошли тупроқларда ўсади.

Сони. Асосан, яқка-яқка ҳолда ўсади. Айрим жойларда кичик-кичик тўплар ҳосил қилади. Сони аниқланмаган.

Ўпайиши. Уругидан юғайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши.

Бу ҳақида маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари.

Қўриқланмайд.

Манбалар. [35, 156–159, 249].

У.П. Пратов

Статус 2. Редкий эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Однолетнее травянистое растение высотой 30–90 см, ветвящееся от основания, внизу голое, в соцветии густоопушенное короткими курчавыми волосками. Листья простые, плоские, нижние ланцетные, черешковые, верхние линейные, острые. Прицветные ланцетные, острые, длиннее околоцветника, короче плодов. Цветы обоеполые, собранные в метелку. Тычинок 5. Листочки околоцветника пленчатые. Плоды шириной 3 мм, с выем-

кой на верхушке. Цветет и плодоносит в августе-сентябре.



Распространение. В Ферганской и Наманганской областях; Западный Тянь-Шань (северо-восточная, северо-западная части Ферганской долины).

Места обитания. На щебнистых и каменисто-щебнистых почвах в предгорьях.

Численность. Встречается одиночно и небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [35, 156–159, 249].

У.П. Пратов

Rare endemic species of the Fergana valley. It is spread at the Fergana valley, the western Tien-Shan (Fergana and Namangan regions). Inhabits stony and slopes in the lower mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



230. ФАРҒОНА ДОНАШҶҲИ

Спайноцветник Ферганский / *Gamanthus ferganicus* Iljin

Мақоми 2. Фарғона водийсида тарқалган кам-ёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик ўт ўсимлик, бўйи 5–50 см, асосидан шохланган, қисқа, оддий, ингичка, жингалак тукли, кейинроқ пастки қисми туксизланади. Барглари қарама-қарши ўрнашган, қалами, йўғонроқ, учинда узун, бўғимли, эрта тушиб кетадиган бир боғлам тукли, узунлиги 15–20 см, эни 2–2,5 мм. Гулорди барглари қарама-



қарши ўрнашган, қўшилмаган, гулёнбаргчаларидан узун. Гулёнбаргчалари гулкўрғонидан қисқа. Гулкўрғон бўлаклари наштартсимон, узунлиги 4–6 мм, сирти тукли. Чангдон қалами, узунлиги 2,5–3 мм. Июнь–июлда гуллаб, меваси етилади.

Тарқалиши. Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятлари: Фарғона водийсининг шарқий қисмида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидаги шўрланган, майда чагиртошли тупроқларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки кичик жамозлар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ерларнинг дехқончилик қилиш учун ўзлаштирилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақида маълумотлар йўқ.

Мўҳофаза чоралари. Мўҳофаза қилинмайд.

Манбалар. [35, 159, 249].

У.П. Пратов

Статус 2. Редкий эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Однолетнее травянистое растение высотой 5–50 см, ветвистое от основания, сероватое от густого войлочка из коротких, простых, тонких курчавых волосков, позднее стирающихся. Листья супротивные, линейные, толстоватые, на самом верху с туповатым кончиком, несущим пучок прямых, длинных, членистых, рано опадающих волосков, длиной 15–20 мм и шириной 2–2,5 мм. Прицветные супротивные, несрастающиеся, длиннее прицветничков. Прицветнички короче околоцветника. Листочки околоцветника ланцетные, длиной 4–6 мм, по спинке опушенные. Пыльники линейные, длиной 2,5–3 мм. Цветет и плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Ферганской, Наманганской и Андижанской областях; на востоке Ферганской долины.

Места обитания. На засоленных щебнистых склонах предгорий.

Численность. Встречается одиночными экземплярами или небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение земель под сельскохозяйственной культурой.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [35, 159, 249].

У.П. Пратов

Rare endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the eastern part of the Ferghana valley (Ferghana, Namangan and Andijan regions). Inhabits saline gravelly soils in the foothills. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



ЯЛПИЗДОШЛАР (ЛАВГУЛДОШЛАР) ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ЯСНОТКОВЫЕ (ГУБООЦВЕТНЫЕ) - LAMIACEAE (LABIATAE)

231. ОЛЬГА БОЗУЛБАНГИ

Зайцегуб Ольга / *Lagochilus olgae* Kamelin

Мақоми 2. Нурота тизмасидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Яримбутача, бўйи 20–50 см. Поялари қўп, оддий ёки шохланган, барглари қалин. Барглари кенг тухумсимон, асоси понасимон, патсимон бўлмалли, томирлари бўртиб туради. Гуллари бандсиз, узунлиги 25–28 мм, учки баргларининг қўлтиқларида 4–6 тадан ярим халқа бўлиб жойлашган. Гулдан баргчалари ўткир, бигизсимон, юқорига қараб қайрилган, косачага ёпишган. Косачаси тор қўнғирроқсимон, узун, ўткир учли, қалами-наштарсимон, найчасига тенг ёки ундан сал узун, вегетациянинг охирида паст-

Статус 2. Редкий эндемик Нуратау.

Краткое описание. Полукустарничек высотой 20–50 см. Листья широкояйцевидные, в основании клиновидные, перисто-лопастные, с выступающими жилками. Цветки сидячие, длиной 25–28 мм, расположены в 4–6-цветковых полумутовках в пазухах верхних листьев. Чашечка узкоколокольчатая, с длинными заостренными линейно-ланцетными зубцами. Венчик белый. Цветёт в конце мая–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Джизакской, Навоийской и Самаркандской областях: хребет Нуратау.

Места обитания. Произрастает на каменисто-щебнистых склонах нижнего и среднего пояса гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нуратинского государственного заповедника.

Источники. [18, 107, 159].
Н.Ю. Бешко



га қараб эгилади, тишчали. Гултожи оқ. Май ойининг охири – июлда гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Нурота тизмасида ўсади (Жиззах, Навоий ва Самарқанд вилоятлари).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларидаги тош-чағиртошли ёнбағирларда турли ўт-шувоқли, йирик ўт ва ярим буталардан иборат жамоаларда ўсади.

Сони. Кам учрайди. Якка-якка ҳолда ёки кичик гуруҳлар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Табиатда ўта кам учраши тахмин қилинади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат қўриқхонасида муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [18, 107, 159].

Н.Ю. Бешко

Rare endemic of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau range (Jizzakh, Navoi and Samarkand regions). Inhabits stony slopes of the low and middle mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



232. ПРОСКОРЯКОВ БОЗУЛБАНГИ

Зайдегуб Проскорякова / *Lagochilus proskorjakovii* Ikramov

Мақоми 1. Нурота тизмаси учун ўта камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Ярим бутана, бўйи 20–35 см. Поялари оддий ёки шохланган, сийрак, қисқа тукли. Барглари майда, кенг тухумсимон, 3–5 бўлмали, эсоси понасимон, тарвақалайган тукли, узун бандли. Гуллари 4–6 тадан шохларининг учидаги баргларнинг қўлтиқларида ярим халқа бўлиб ўрнашган. Гулёнбаргчаларининг учи ўткир, учбурчак бигизсимон, ташқарига қараб сал эгилган. Косачаси 10–15 мм узунликда, тор қўнғироқсимон, воронкасимон кенгайган, қайтақиси кенг қўнғироқсимон, тишчаси текис жойлашган, кенг учбурчаксимон, ташқарисига сал эгилган, қисқа ҳамда безчали туклар билан қопланган. Гултожи оқ. Июнь–июлда гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Нурота тизмасида тарқалган (Жиззах ва Самарқанд вилоятлари).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қуруқ, тош-чағиртошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Жуда кам тарқалган, якка-якка ҳолда ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Шароитнинг ноқулайлигидан кам учраса керак.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади. Ўсимлик популяцияларини аниқлаш ва хариталаш, табиий ва маданий шароитда унинг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш талаб этилади.

Манбалар. [104, 320],

Ҳ.Ф. Шомуродов

Статус 1. Чрезвычайно редкий, узкий эндемик Нуратау.

Краткое описание. Полукустарничек высотой 20–35 см. Листья мелкие, широкояйцевидные, 3–5-лопастные, в основании клиновидные, с оттопыренными волосками. Цветки расположены в 4–6-цветковых полумутовках в пазухах верхних листьев. Чашечка 10–15 мм длиной, узко колокольчатая, воронкообразно-расширенная, с широко колокольчатым отгибом и почти горизонтально отклоненными широко треугольными зубцами, покрыта короткими волосками и еди-



ничными железками. Венчик белый с грязноватым оттенком. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Джизакской и Самаркандской областях: хребет Нуратау.

Места обитания. Произрастает на сухих каменисто-щебнистых склонах среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко, спорадически, единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены. Вероятно, вид имеет низкую численность в силу естественных причин.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нуратинского государственного заповедника. Требуется выявление и картирование локальных популяций вида, контроль за их состоянием и эколого-биологическое изучение вида в природе и в культуре.

Источники. [104, 320],

Ҳ.Ф. Шомуродов

Rare endemic of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau mountains (Jizzakh and Samarkand regions). Inhabits stony slopes of the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



233. ВВЕДЕНСКИЙ БОЗУЛБАНГИ

Зайцегуб Введенского / *Lagochilus vedenenskyi* Kamelin et Zuckerw.

Мақоми 3. Фақат Қизилқумда учрайдиган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Ёйи 20–25 см га етадиган ярим бута. Барглари паяда қарама-қарши жойлашган, кенг-тухумсимон, бўртиб чиққан йўғон томирли, пастки қисми оддий, шаффоф тукли. Пояси оқ, оддий тукли. Гули оч пушти рангли, узунлиги 25–28 мм, 2–4 тадан бўлиб поянинг юқори қисмидаги барглариининг қўлтиқларида жойлашган. Косачаси қўғишлоқсимон, учи тиканли. Июнда гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: Қизилқумдаги қолдиқ тепаликлар (Қулжуктоғ, Кингиртоғ, Букантау, Оқтоғ)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Якка-якка ҳолда ўсади.

Сони. Кам учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқилиши ва ҳайдаб ўтилиши натижасида камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [116, 320].

Ҳ.Ф. Шомуродов

Статус 3. Узколокальный эндемик останцов Кызылкума.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 20–25 см. Листья супротивные, широкояйцевидные, с выдающимися жилками, опушенные (нижняя сторона) простыми, прозрачными волосками. Стебель белый, опушенный простыми волосками. Цветки беловато-розовые, длиной 25–28 мм, по 2–4 в пазухах верхних листьев. Чашечка колокольчатая, оканчивается колючими шипами. Цветёт в июне, плодоносит в июле–августе.



Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: останцовые возвышенности Кызылкума: Кульжуктау, Кингиртау, Букантау, Актау.

Места обитания. Эродированные склоны.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Скотопогон и выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не разработаны.

Источники. [116, 320].

Ҳ.Ф. Шомуродов

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Kuldjuktai, the Kingirtai, the Bukantau, the Aktau (Bukhara and Navoi regions). Inhabits eroded slopes. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



234. САРХУШ БОЗУЛБАНГ

Зайцевуш омыняущий / *Lagochilus inebrians* Bunge

Мақоми 3. Ғарбий Помир-Олой ва Жанубий Қизилқумнинг қолдиқ тоғларидаги камайиб бораётган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–60 см оралиғидаги поялари оддий ёки сершоҳ ярим бута. Барглари кенг-тухумсимон 3–5 бўлакли. Тожбарги оқниш. Гуллари пояларининг юқори қисмида 4–6 тадан бўлиб ўрнашган. Косачаси чузиқ қўнғироқсимон. Ёнғоқчаси туксиз, сарғиш қулранг. Июнь–августда гуллаб, меваси июль–сентябрь ойларида етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд, Навоий ва Бухоро вилоятлари: Нурота тоғи этаклари, Зирабулоқ, Зиявуддин тоғи, Зарафшон ҳамда Туркистон тизмалари, шунингдек, Қизилқумдаги Қулжуктоғ, Қўкчатор ва Томдигтоғда тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1 200 м гача баландликдаги соз ҳамда шағалли соз тупроқларда шувоқ ва бошқа турлардан ҳосил бўлган ўсимлик гуруҳларида учрайди.

Сони. Табиатда онда-сонда ва кичик туплар ҳосил қилиб тарқалган. Энг зич туплари Нурота ва Оқтоғларда учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди. Уруғи 5–7 йил мобайнида унвчанлигини йўқотмайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Намгарчиликнинг етишмаслиги, чорва моллари томонидан пайҳон қилиниши ва қўп йиллар мобайнида катта миқдорларда йиғиб олинishi сони ва ареалига катта зарар етказган.

Маданийлаштирилиши. 1957–1960 йиллар мобайнида Самарқанд вилоятида 2 га ерда экиб ўстирилган. 1960 йилдан буён ЎзР ФА Ботаника боғида экилиб қилинади.



Муҳофаза чоралари. Нурота қўриқхонасида муҳофаза қилинади. Уни йиғиб олишни қатъий чеклаш, табиий ҳолда тикланишига қўмаклашиш зарур.

Манбалар. [103, 116, 320].

Н.Ю. Бешко

Статус 3. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая и останцовых гор Кызылкума.

Краткое описание. Прямостоячий полукустарник высотой 30–60 см. Стебли простые или ветвистые. Листья широкояйцевидные, 3–5-раздельные. Венчик белый, с грязноватым оттенком. Цветки расположены по 4–6 в верхней части стебля. Чашечка узкоколокольчатая. Орешки голые, желтовато-серые. Цветёт в июне–августе, плодоносит в июле–сентябре.

Распространение. В Жиззакской, Самаркандской, Навоийской и Бухарской областях: предгорья Нуратинских гор, Зирабулакские и Зиявуддинские горы, Зеравшанский и Туркестанский хребты; Кызылкумы – Кульджуктау, Кокчатау и Тамдытау.

Места обитания. Глинистые, чаще глинисто-щебнистые почвы подгорных равнин и предгорий высотой до 1 200 м над уровнем моря.

Численность. В природе встречается спорадически и небольшими группами. Наибольшая плотность популяций в Нуратау и Актау.

Размножение. Семенное. Семена сохраняют всхожесть на протяжении 5–7 лет.

Причины изменения численности и ареала. Аридный климат, вытаптывание скотом, усиленная заготовка.

Культивирование. В 1957–1960 гг. в Самаркандской области произведены опытные посевы на площади 2 га. С 1960 года успешно культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике. Необходимо строго ограничить сбор, содействовать восстановлению естественных запасов.

Источники. [103, 116, 320].

Н.Ю. Бешко

Rare endemic species of the western Pamir-Alay and Kyzylkum. It is spread at the Nuratau, the Ziraibulak and Ziadin mountains, the Zeravshan and Turkestan ranges; the Kyzylkum: the Kuldjuktau (Jizzakh, Samarkand, Navoi and Bukhara regions). Inhabits clay and gravelly soils of foothills up to 1 200 m. Small populations can be found sporadically. The most dense populations are in the Nuratau and Aktau. Limiting factors: arid climate, cattle trampling down, intensive gathering. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve. It is necessary to limit collection, to promote the reestablishment of natural populations.

235. АЖОЙИБ БЎЗБОШ

Энеголовник прекрасный / *Dracosephalum formosum* Gontsch.

Мақоми 3. Ҳисор тизмасидаги кам учрайдиган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–40 см келадиган кўп йиллик ўт. Барглари юмалоқ ёки тухумсимон, четлари текис ёки кунгурали, ёпирма баргларининг банди япроғидан уч баробар узун. Пояси камбаргли. Гули пушти-бинишра рангли, устки томони (сирти) сертук. Гуллари поянинг учида зич тўпгул ҳосил қилади. Июль-августда гуллаб, меваси август-сентябрда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмаси (Қизилсув дарёси ҳавзаси – Қизилгаза доғони, Чўлбайр тоғи ва Тупаланг дарёси ҳавзаси)да тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғлардаги дарё ва irmoқларининг ёқаларида ҳамда булоқларининг атрофларида ўсади.

Сони. Кам тарқалган, фақат еттига жойда борлиги аниқланган.

Қўлайлиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг булоқ атрофларида ва дарё бўйларида кўплаб боқилиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади. Ўсимликни

юлиш ёки қазиб олишни тақиқлаш ҳамда маданийлаштириш мақсадида унинг биологик хусусиятларини ўрганиш зарур.

Манбалар. [8, 159].

И.И. Мальцев

Статус 3. Редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 15–40 см. Листья округлые или яйцевидные, цельнокрайные, городчатые, прикорневые, на длинных (в 3 раза длиннее листьев) черешках. Стебли рыхлооблиственные. Цветки розово-лиловые, снаружи пушистые, в плотных головчатых соцветиях на верхушках стеблей. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет – бассейн реки Кызылсу – около перевала Кызылгаза, горы Чудбайр, бассейн реки Тупаланг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Берега горных ручьёв, родников и рек в верхнем поясе гор.

Численность. Немногочислен, отмечен в 7 местах.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Вытаптывание берегов родников и рек, чрезмерный выпас скота. Высокодекоративное растение.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике. Необходимы: запрет сбора и выкопки растений; изучение биологических особенностей с целью введения в культуру.

Источники. [8, 159].

И.И. Мальцев

Rare endemic species of the Hissar range.

It is spread at the Hissar range: the Kyzylsu river basin: near the Kyzylgaza pass, the Chulbair Mountains, the Tupalang river basin (Kashkadarya and Surkhondarya regions). Inhabits watersides of mountains streams, springs and rivers in the mountain belt. Population is not numerous, found in 7 points. Limiting factors: overgrazing, trampling down of watersides of springs and rivers. Very ornamental plant. Measures of protection: protected in the Hissar state nature reserve. It is necessary to forbid collection and digging up of plants, to study biological characteristic features for the purpose of their introduction into cultivation.



236. КОМАРОВ БЎЗБОШИ

Энегоголовник Комарова / *Dracoscephalum komarovii* Lipsky

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шань ва Помир Олойдаги ареали бўлиган, камайиб бораётган эндемик ўсимлик.

Қисқача таъсифи. Бўйи 10–20 см оралигидаги қўп йиллик ўт. Барги учбурчак-тухумсимон, учи ўткир, асоси юраксимон, четлари текис, қалин, қисқа тукли, қисқа бандли, юқоридагилари бандсиз. Пояси қўп, пастки қисми ёғочланувчан, тик ёки бироз қийшайган. Гули поянинг юқори қисмидаги барглarning қўлтигида биттадан қисқа бандларда ўрнашган. Тўғбарги сариқ. Июль–августда гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Чотқол тизмаси (Қизилсура тоғи, Майдонтол ва Қорабулоқ дарёлари тоғлари ҳамда Орашон долоғи), Қурама тизмаси (Лашкарак, Гушсой)да тарқалган. Қозғистон, Қирғизистон ва Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмида, тошшағалли тупроқларда ўсади.

Сони. Табиий захиралари кам бўлиб, бир-биридан ажралган тўплар ҳосил қилган ҳолда ўсади.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли гуллаб турган пайтида доривор ўсимлик сифатида қўлаб йиғиб олади. Ёз фаслида эси бу ерларда чорва моллари боқилади.

Мадавийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсимлик тарқалган майдонларнинг бир қисми Чотқол биосфера қўриқхонаси, Уғам-Чотқол биосфера резервати ва Уғам-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида бўлиб, муҳофаза олинган.

Манбалар. [8, 159].

И.И. Мальцев

Статус 2. Эндемик Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая с сокращающимся разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее травянистое

растение высотой 10–20 см. Листья треугольно-яйцевидные, острые: при основании слабосердцевидные, цельнокрайные, очень коротко густо пушистые, на коротких черешках, верхние – сидячие. Стебли многочисленные, при основании дрелесеющие, прямые или слегка восходящие. Цветки по 1 в пазухах верхних листьев на очень коротких цветоножках. Венчик желтый. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Чаткальский и Кураминский хребты – горы Кызылсура, верховья рек Майдантал, Карабулак и перевал Арашан, бассейны рек Лашкерек и Гушсай. За пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.



Места обитания. Каменисто-щебнистые почвы в верхнем поясе гор.

Численность. Природные запасы незначительны. Встречается небольшими, изолированными друг от друга группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный сбор населением надземной части растений во время цветения в качестве лекарственного средства. Усиленное использование территории под отгонное пастбище.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Часть площадей, занятых этим растением, расположена на территории Чаткальского биосферного заповедника, Угам-Чаткальского биосферного резервата и Угам-Чаткальского национального парка и находится под охраной.

Источники. [8, 159].

И.И. Мальцев

Endemic species of the western Tien-Shan and Pamir-Alay with the reducing area. It is spread at the Chatkal and Kurama ranges (Tashkent, Namangan regions). Inhabits stony soils in the upper belt of mountains. Natural stock is insignificant. Can be met in small, isolated from each other groups. Limiting factors: the intensive gathering of the above ground parts of plants by local people during its flowering as medicinal plant. The intensive use of lands under summer pastures. Measures of protection: protected in the Chatkal and Ugam-Chatkal biosphere reserves, the Ugam-Chatkal national park.



237. ТИКАНЛИ БЎЗБОШ

Змееголовник колючий / *Dracosephalum spinulosum* Popov

Мақоми 3. ГАРБИЙ ТЯНЬ-ШАНДА КИЧИК МАЙДОНЛАРДА САҚЛАНИБ ҚОЛГАН КАМЁБ ЭНДЕМИК ЎСИМЛИК.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см га етадиган кўп йиллик ўт. Барглари тухумсимон, пасткилари барвақт сўлийди, қаттиқ, ғадир-будур, тукли, барг банди қисқа. Пояси тўрт қиррали. Гуллари 2-6 тадан пояда ҳалқа шаклида жойлашган, оқш ёки оч қизғиш рангли. Июль-август ойида гуллаб, меваси август-сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: ГАРБИЙ ТЯНЬ-ШАННИНГ УҒОМ, ПИСКОМ, ЧОТҚОЛ тизмаларида тарқалган. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тошли ва нураган шағалли тоғ ёнбағирларда, сийрак арчазорлар орасида, кўпроқ очик жойларда ўсади.

Сони. Якка-якка, туплари бир-биридан ажралган ҳолда учрайди.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бошқа ўсимликлар билан рақобатга бардош бера олмаслиги ва чорва моллари томонидан пайхон қилиниши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида, Уғом-Чотқол биосфера резерватида ва Уғом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза этилади.

Манбалар. [8, 159].

И.И. Мальцев

Статус 3. Редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 25 см. Листья яйцевидные, нижние рано увядающие, жесткие, шероховато-опушенные, на очень коротких черешках. Стебли четырехгранные. Цветки (2-6) собраны в мутовки, беловатые или бледно-кирпично-красноватые. Цветёт в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Западный Тянь-Шань: Угамский, Чаткальский, Пскемский хребты. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Каменистые, сильно эродированные ощебенные склоны гор, среди разреженных арчовников, преимущественно открытые места.



Численность. Встречается единично, спорадически, изолированно друг от друга.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Низкая конкурентоспособность, вытаптывание скотом.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском биосферном заповеднике, Угам-Чаткальском биосферном резервате и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [8, 159].

И.И. Мальцев

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the western Tien-Shan: the Ugam, the Chatkal and Pskem ranges (Tashkent region). Inhabits stony, strongly eroded slopes on mountains, among sparse juniper stands, mainly opened places. Solitary specimens can be found sporadically. Limiting factors: low competition capacity, cattle trampling down. Measures of protection: protected the Chatkal and Ugam-Chatkal biosphere reserves, the Ugam-Chatkal national park. Control of number and introduction into cultivation are required.

238. ИПАКСИМОН КЎКАМАРОН

Шлемник шелювинстейский / *Scutellaria holosericea* Gontsch. ex Juz.

Мақоми 1. Ғарбӣй Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 45 см гача етадиган кўп пояли, қалин туклар билан қопланган примбута. Барглари йирик, узунлиги 4 см, учбурчак тухумсимон, четлари тишсимон ўйилган, майин тукли. Тўпгули узун, шохланган. Гуллари қисқа бандли, биттадан гулолди барглариининг қўлтиғига ўрнашган. Тожи оч ҳаворанг, пастки лабида бинафша рангли доғлари бор. Июнь-июлда гуллаб, июль-август ойларида меваси етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси (Тупаланг дарёсининг Ҳурватан ва Шатрут irmoқларининг ўнг қирғоқлари ҳамда Қултепасойнинг жануби-ғарбӣй ёнбағирлари)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмида гранитли қояларда ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [4, 159, 355].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 1. Редкий узкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 45 см, стебли многочисленные, густоопушенные. Листья крупные, длиной до 4 см, треугольно-йцевидные, городчато-зубчатые, бархатистоопушенные. Соцветие удлиненное, ветвистое. Цветки на очень коротких цветоножках, по 1 в пазухах прицветных листьев. Венчик голубовато-сиреневый, покрытой фиолетовыми пятнышками нижней губой. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – бассейн реки Тупаланг – правобережье её притоков (Хурватан, Шатрут), юго-западный склон Култепасая.

Места обитания. Гранитные скалы в верхнем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [4, 159, 355].

Ф.О. Ҳасанов



Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Tupalang river basin - right-bank of its tributaries (Khurvatan, Shatrut), the south-western slope of the Kultepasay (Surkhondarya region). Inhabits granite rocks in the upper belt of mountains. Specimens rarely can be found. Measures of protection: not protected.



239. МОМИҚ КЎКАМАРОН

Шлемник мохнатейишнӣ / *Scutellaria villosissima* Gontsch. et Juz.

Мақоми 2. Гарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Поялари кўп, ингичка, узун бўғимли, ёпишқоқ, эгри-бугри туклар билан қопланган. Барглари деярли юмалоқ, четлари йирик тишли, ҳар икки томони узун тукли. Гуллари қисқа бандли, гулолди баргчалар қўлтиғида биттадан ўрнашган. Тожбарглари оч кўк рангли, узунлиги 25 см. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси (Сангардак дарё ҳавзасидаги Богча қишлоғидан Қизилсойгача, Оксув дарёсининг ўрта оқими) да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги ёнбағирларида ўсади.

Сони. Маълумотлар йўқ.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.



Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [4, 159, 355].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 2. Редкий узкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см. Стебли многочисленные, тонкие, густо покрыты длинными, членистыми, извилистыми, клейкими волосками. Листья почти округлые, по краю крупнозубчатые, с обеих сторон покрыты длинными волосками. Цветки на коротких цветоножках, по 1 в пазухах прицветных листьев. Венчик светло-синий, длин-

ной до 25 мм. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – бассейн реки Сангардак от кишлака Бахча до Кизилсай, правый берег реки Аксу в среднем течении.

Места обитания. Склоны в верхнем поясе гор.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры не разработаны.

Источники. [4, 159, 355].

Ф.О. Ҳасанов

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Sangardak river basin nearby the villages Bakhcha to Kizilsay, the right bank of the Aksu river in the middle reaches (Surkhandarya region). Inhabits slopes in the upper belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



240. ТОМЧИ КУКАМАРОН

Шлемник капелый / *Scutellaria guttata* Nevski ex Juz.

Мақоми 2. Гарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Қўп пояли, қалин тукли, ғовак ёстиқ шаклидаги ярим бута. Бир йиллик шохлари ингичка, узунлиги 10 см, сербарг, пастки қисми пахмоқ тукли. Барглари кенг тухумсимон, деярли текис қиррали, ҳар икки томони сийрак тукли. Гуллари биттадан барг қўлтигида ўрнашган. Тожбарглари сариқ рангли, узунлиги 28 мм. Июнь-августда гуллаб, меваси июль-сентябрь ойларида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси – Тупаланг дарёси ҳавзаси – Хурватан, Зевар, Қўштут қишлоқлари, Шатрут ва Тамшуш дарёларининг қуйилиши ҳамда Сангардак дарёси воҳасидаги Сангардак ва Боғча қишлоқлари агрофлорида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоёларнинг ўрта қисми ёнбағирларида ва очик қумтошларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг қўллаб боқилиши унга салбий таъсир кўрсатмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [4, 159, 355].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 2. Редкий узкий эндемик западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Полукустарник, рыхлый, подушкообразный, многостебельный, густоволосистый. Годичные побеги тонкие (до 10 см), густолиственные, в нижней части мохнатые. Листья широкояйцевидные, почти цельнокрайные, с обеих сторон негустоволосистые. Цветки по 1 в пазухах листьев. Венчик жёлтый, длиной до 28 мм. Цветёт в июне-августе, плодоносит в июле-сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – бассейн реки Тупаланг – окрестности кишлака Хурватан, между кишлаками Зевар и Куштут, у слияния рек Шатрут и Тамшуш, бассейн реки Сангардак – окрестности кишлаков Сангардак и Бахча.

Места обитания. Обнажения песчаников и склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры не разработаны.

Источники. [4, 159, 355].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Tupalang river basin – nearby the villages Khurvatan, Zevar and Kshutut, the Shatrut and Tamshush rivers, the Sangardak: nearby the villages Sangardak and Bakhcha (Surkhondarya region). Inhabits outcrops of sandstones and slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.



241. ФЕДЧЕНКО КЎКАМАРОНИ

Шлемник Федченко / *Scutellaria fedtschenkoii* Bornm.

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олой тоғларидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган қўп йиллик ўт. Поялари қўп, ингичка. Барглари кўкимтир, деярли юмалоқ, тўмтоқ, туксиз. Гуллари қисқа бандли, поя ва шохларининг учларида бир томонлама сийрак тўпгул ҳосил қилади. Тожбарги тўқ ҳаворанг. Июнь-июлда гуллаб, меваси июль-август ойларида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасида (Ғузор ва Шеробод шаҳарлари оралиғи, Шўроб ва Дарбанд қишлоқлари атрофи, Бўзгалахона дараси, Тўпаланг дарёси воҳаси, Войсунтоғ) тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмида оҳақтош қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [4, 159, 355].

Ф.Ў. Ҳасанов

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет; между городами Гузар и Шерабад, окрестности кишлаков Шураб и Дербент, ущелье Бугалахана; долина реки Тупаланг, Байсунтау.

Места обитания. Трещины известняковых скал в среднем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры не разработаны.

Источники. [4, 159, 355].

Ф.О. Ҳасанов

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range; between Guzar and Sherabad, the surroundings of the villages Shurab and Derbent, the Buzgalakhana gorge; the Tupalang valley, the Baysuntau (Kashkadarya and Surkhondarya regions). Inhabits clefts of limestone rocks in the middle belt of mountains. Specimens very rarely can be found. Measures of protection; not protected.



Статус 3. Редкий узкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 50 см. Стебли многочисленные, тонкие. Листья сизоватые, почти округлые, тупые, голые. Цветки на коротких цветоножках, образуют рыхлые однобокие соцветия на верхушке стеблей и ветвей; венчик тёмно-голубой. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.



242. ҚАЙРИЛГАН КЎКАМАРОН

Шлемник изогнутый / *Scutellaria colpodea* Nevski

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Хивчинсимон, кулранг пояли ярим бутача, баландлиги 30–60 см. Барглари ажинли, тухумсимон, тўмтоқ, бутун, узунлиги 1,5–2 см.

Гуллари биттадан гулолди барглариининг қўлтигида ўрнашган, сийрак тўпгул ҳосил қилади. Косачаси 2–3,5 мм узунлиқда, 2 паллали бўртмаси бор. Гултожи сариқ, қалин тукли, узунлиги 18–23 мм, ташқи томони қўнғир-тўқ қизил рангли. Ёнғоқчаси тукли.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасининг ғарбий тармоқлари, Бойсун тоғлари, Кўхитанг ва Боботоғда тарқалган.

Ўсиш шароити. Ола жинсларда ўсади.

Сони. Кўхитангда 500 га яқин тути борлиги аниқланган.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ола жинсли ерларининг қисқариши ва қўп миқдорда чорва боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайд.

Манбалар. [4, 159, 310, 355].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Полукустарничек с серыми прутьевидными стеблями высотой 30–60 см. Листья от вдавленных жилок морщинистые яйцевидные, тупые, цельнокрайние, длиной 1,5–2 см. Цветы по одному в пазухах прицветных листьев образуют рыхлое соцветие. Чашечка длиной 2–3,5 мм, с двулопастным придатком. Венчик желтый, густо пушистый, длиной 18–23 мм, снаружи с коричнево-пурпурным оттенком. Орешки пушистые. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: западные отроги Гиссарского хребта, Байсунские горы, Кугитанг и Бабатаг.

Места обитания. Пестроцветные толщи.

Численность. В 2009 г. зарегистрировано около 500 растений в Кугитанге.

Размножение. Семенное.



Причины изменения численности и ареала. Сокращение площади пестроцветов, выпас скота.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [4, 159, 310, 355].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the western branches of the Hisar range, the Baysun mountains, the Kughitang and Babatag (Kashkadarya and Surkhondarya regions). Inhabits gypseous slopes. 500 plants were registered in Kughitang in 2009. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



243. ЗЕБО МАРМАРАК

Шалфей замечательный / *Salvia insignis* Kudr.

Мақоми 1. Жанубий Ўзбекистонда ўсадиган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см га етадиган тик пояли кўп йиллик ўт. Барглари, эсосан, илдиз бўғизиди жойлашган, тухумсимон, четлари икки қарра тишсимон бўлинган, узун бандли. Гуллари пушти рангли, узунлиги 30-35 мм. Меваси 4 та ёнғоқчага ажралади. Ёнғоқчаси эллипсимон, ишилроқ рангли, уч қиррали, узунлиги 3 мм. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Боботог тизмаси ва Бешарча тоғларида (Гармбўлоқ ва Қашқақудуқ атрофлари) тарқалган. Жанубий Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки қисмидаги ола жинсларда, оҳақтошли ҳамда гипсли ёнбағирларда ва сурилмаларда ўсади.

Сони. Бу тур табиатда жуда кам сақланиб қолган бўлиб, умумий сони 1 000 тупдан ошмайди. Йўқолиб кетиш хавфи остида.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик тарқалган ерларда чорва молларининг қўлаб боқилиши туфайли унинг сони қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофазачоралари. Боботог ўрмонхўжалиги ҳудудида (Бешарча тоғлар) буюртмахона ташкил қилиш ва ўсимлиكنи маданийлаштириш лозим.

Манбалар. [111, 191-193, 238, 260].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Очень редкий эндемик Южного Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 40 см. Стебель прямой. Листья почти все прикорневые, яйцевидные, по краю дважды городчатые, длинночерешковые. Цветки розовые, длиной 30-35 мм. Плод дробный, распадающийся на 4 орешка. Орешки зеленоватые, эллиптические, трёхгранные, длиной 3 мм.



Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Бабатаг, горы Бешарча (Гармбўлоқ ва Қашқақудуқ). За пределами Узбекистана: Южный Таджикистан.

Места обитания.

Выходы пестроцветных пород, известняковые и гипсированные склоны и осыпи в нижнем поясе гор.

Численность.

Вид малочислен, находится под угрозой исчезновения. Общее число растений не превышает 1 000 экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Скотопогон и выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Необходимы организация заказника на территории Бабатагского лесхоза (горы Бешарча), введение в культуру.

Источники. [111, 191-193, 238, 260].

К.Ш. Тожибаев

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the the Babatag range, Besharcha mountains (Surkhandarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks, limestone and gypsum slopes and mounds in the lower belt of mountains. Species are not numerous, endangered. Total number of plants does not exceed 1 000 specimens. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: it is necessary to organize the state reserve in the territory of the Babatag forestry (the Besharcha mountains), to introduce into cultivation.



244. КОРОЛЬКОВ МАРМАРАҒИ

Шалфей Королькова / *Salvia korolkovii* Regel et Schmalh.

Мақоми 3. Ғарбий Тянь-Шанга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган, тик ўсувчи, оқ момик тукли ярим бутча. Барглари, асосан, ёпирма барглاردан иборат, кенг нашта-симон пондагилари 2-3 жуфт, устки томони сийрак, остки томони эса оқ момик тукли. Гуллари 2-10 тадан мураккаб сохта ҳалқа ҳосил қилиб ўрнашган. Косачаси кенг қўнғироқсимон, икки лабли, пардасимон, йўғон томирли. Тож барглари сариқ, узунлиги 25-33 мм. Меваси 4 та ёнгоқчага аж-ралади. Июнда гуллаб, ме-васи июль ойида етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти; Қоржонтов, Уғам ва Қўксув тизмаларида ҳамда Чотқол тизмаси-нинг шимоли-ғарбида тарқалган.

Ўсиш шароити. Ден-гиз сатҳидан 1 200-1 500 м баландликда соз тупроқли нураган ёнбағирларда, тик қизил созларда ўсади.

Сони. Тарқалиш майдонларининг чегаралан-ганлиги сабабли, табиий захиралари кам. Умумий сони 20 000 тупдан иборат; 200 га яқин популяция-си мавжудлиги аниқланган.

Қўпайиши. Уругидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши ва янги ерларнинг ўзлаштирилиши.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида экилган.

Муҳофаза чоралари. Уғам-Чотқол миллий та-биат боғида учрайди. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [111, 191-193, 238, 260, 293].

К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Прямостоячий полуку-старник высотой до 50 см. Стебли прямые, бело-паутинисто-войлочные. Листья преимущественно прикорневые, широколанцетные, стеблевых 2-3 пары, сверху рассеянно опушенные, снизу густо бело-паутинисто-войлочные. Соцветие вет-вистое, цветки собраны по 2-10 в ложные мутов-ки. Чашечка двугубая, пленчатая, с выдающимися жилками, ширококолокольчатая. Венчик желтый, длиной 25-33 мм. Плод drobный, распадающийся на 4 орешка. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: хребты Каржантау, Угамский и Коксуйский; северо-западные отроги Чаткальского хребта.

Места обитания. Глинистые эродированные склоны и крутые обнажения красных глин, где об-разует самостоятельные ценозы, на высоте 1 200-1 500 м.

Численность. Из-за ограниченности площади распространения природ-ные запасы незначи-тельны. Известно около 200 локальных популяций об-щей численностью не бо-лее 20 000 растений.

Размножение. Семен-ное.

Причины изменения численности и ареала. Основной фактор измене-ния численности - антро-погенный.

Культивирование. Успешно индуцирован в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Встре-чается на территории Угам-Чаткальского национального парка. Специ-альные меры охраны не разработаны.

Источники. [111, 191-193, 238, 260, 293].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Karzhantau, the Ugam and Koksui ranges; the Chatkal range (Tashkent region). Inhabits clayish eroded slopes and steep outcrops of red clays, where it forms the independent cenoses (1 200-1 500 m), about 200 populations are known. Total number is about 20 000 plants. Limiting factors: anthropogenic factor is the main factor of decreasing. Measures of protec-tion; protected in the Ugam-Chatkal national park.



245. МАРГАРИТА МАРМАРАҒИ

Шалфей Маргариты / *Salvia margaritae* Botsch.

Мақоми 2. Олой тизмасидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган ярим бута. Пойлари қўп, асосидан шохланган. Барглари майда, наштарсимон, бандсиз. Косача баргларининг узунлиги 18 мм, бинафша рангли, безчасимон тукли. Тожбарглари тўқ бинафша рангли, безчасимон тукли, узунлиги 30–40 мм. Июнда гуллаб, меваси июль ойида етилади. Манзарали ҳамда доривор ўсимлик.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой тизмасидаги Шохимардон дарёси воҳасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоёларнинг ўрта қисмида

шенная, железистоволосистая. Венчик тёмно-фиолетовый, железистоволосистый, длиной 30–40 мм. Цветёт в июне, плодоносит в июле. Декоративное и лекарственное растение.

Распространение. Ферганская область; Алайский хребет – бассейн реки Шохимардан.

Места обитания. Каменистые и мелкоземисто-каменистые открытые склоны и скалы среднего пояса гор.

Численность. В бассейне реки Шохимардан насчитывалось 10–15 популяций. Общая численность не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Слабое семенное возобновление, скотопрогон и выпас скота, а также освоение территории под зоны отдыха.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны на разработаны. Необходимо изучение вида в культуре.

Источники. [111, 191–193, 238, 260]



тошли ва майда жинс-тошли очик ёнбағирларда ва қояларда ўсади.

Сони. Шохимардон дарёси ҳавзасида 10–15 та популяцияси борлиги аниқланган. Тупларининг сони номаълум.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уруғидан яхши унмаслиги, чорва моллари боқилиши, дам олиш уйлари қурилиши унинг қисқариб кетишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Бу турни маданий шароитда экиб ўрганиш лозим.

Манбалар. [111, 191–193, 238, 260].

К.Ш. Тожибаев

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the Alay range. It is spread at the Alay range; the Shakhimardan river basin (Fergana region). Inhabits stony and fine earth-stony open slopes and rocks in the middle belt of mountains. 10–15 populations are counted in the Shakhimardan river basin. Total number is unknown. Limiting factors: weak seed reproduction, pasturing and also reclamation of lands under for resorts. Measures of protection: not protected.



Статус 2. Редкий узкий эндемик Алайского хребта.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 50 см. Стеблей несколько, от основания ветвистые. Листья сравнительно мелкие, ланцетные, сидячие. Чашечка длиной 18 мм, фиолетово-крас-

246. ТЯНЬ-ШАНЬ МАРМАРАҒИ

Шалфей тэншанский / *Salvia tianshanica* Makhm.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шанга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Буйи 25–40 см га етадиган кўп йиллик ўт. Поялари 1–3 та, тик ўсувчи, тўпгулига яқин қисмида қарама-қарши шохланган, қалин безчасимон ва узун юмшоқ оддий туклар билан қопланган. Барглари чўзиқ наشتарсимон, узунлиги 7–9 см, эни 3–4 см, ўткир учли, четлари патсимон бўлинган. Ёпирма барглари узун бандли, япрогининг узунлиги бандига тенг, поядагилари кичикроқ, бандсиз. Тўпгуллари 4–6 та (ҳар бири 2–3 гулли) сохта ҳалқадан ташкил топган. Гулбандининг узунлиги 12–14 мм. Гуллари пушти рангли, узунлиги 35–40 мм. Ёнғоқчаси уч қиррали, тескари тухумсимон, узунлиги 6 мм, силлиқ. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Уғом тизмасида (Хумсон), Чотқол тизмаси (жануби-ғарбий қисми), Қурама тизмасининг шимолий ёнбағирлари, Олмалик шаҳри атрофларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмидаги қуруқ майда жинс шағалли тупроқларда ўсади.

Сони. Яқка-яқка ёки ажралган кичик тўплар ташкил қилган ҳолда ўсади. Алоҳида тўп ҳосил қилмайди. Уғом-Чотқол биосфера резервати ҳудудида кўпроқ учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Техноген омиллар таъсири ва чорва молларининг кўп боқилиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ареалининг бир қисми Уғом-Чотқол биосфера резерватида ва Уғом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [111, 191–193, 238, 260].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 25–40 см. Листья продолговато-ланцетные, длиной 7–9 см, шириной 3–4 см, с заостренными, глубоко перистораздельными лопастями; прикорневые на черешках, равных по длине пластинкам; стеблевые слегка уменьшенные, сидячие. Соцветия из 4–6 расставленных немногочетковых (2–3) ложных мутовок. Цветоножки длиной 12–14 мм. Цветки розоватые, длиной 35–40 мм. Орешки трехгранно-обратнояйцевидные, длиной 6 мм, гладкие. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле.



Распространение. Ташкентская область: Угамский хребет (Хумсан), Чаткальский хребет, северные склоны Кураминского хребта, окрестности города Алмалык.

Места обитания. Сухие мелкощебнистые и щебнисто-мелкоземистые склоны в нижнем поясе гор.

Численность. Единично и небольшими группами, популяции разобщены. Самостоятельных ценозов не образует. Наиболее часто встречается на территории Угам-Чаткальского биосферного резервата.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Техногенные факторы и перевыпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Часть популяций охраняется в Угам-Чаткальском биосферном резервате и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [111, 191–193, 238, 260].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam, the Chatkal ranges, the Akhangaran river basin, the northern slopes of the Kurama range, nearby Almalyk (Tashkent region). Inhabits dry gravelly and fine earth slopes in the lower belt of mountains. Solitary specimens and small groups can be found sporadically. Does not form the independent cenoses. It is most frequently found in the territory of the Ugam-Chatkal biosphere reserve. Limiting factors: economic human activities, mining operations. Measures of protection: several populations are protected in the Ugam-Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.



247. ТЎМТОҚ МАРМАРАК

Шалфей туловатий / *Salvia submutica* Botsch. et Vved.

Мақоми 2. Нурота тизмасидаги камёб, реликт, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Вуғи 15–40 см га етадиган қўп йиллик ўт. Пояси битта, тик, қалин безчасимон тукли. Ёпирма барглари қўп, бандли, чуқик, наштарсимон, патсимон бўлинган, бўлакларини ўз навбатида, чуқур-патсимон қисмларга ажралган. Поясининг пастки қисмидаги бир жуфт барг қисқа бандли, четларининг учини ўткир бўлакларга ажралган, пойининг ўрта ва юқори қисмидагилари эса бандсиз, бутун ва майдароқ. Гуллари узун (10–12 мм), гул бандда 4 тадан ҳалқа ҳосил қилади. Қосачаси кенг қўнғироқсимон, бироз шишган, узунлиги 22–23 мм, деярли икки лабди, қосачабарглари тўмтоқ. Тожи сарғиш. Июнь–июлда гуллаб, меваси июль–август ойларида етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота тизмасида тарқалган.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг қўплаб боқилиши турнинг камайиб кетишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Бу тур ўсадиган ерларнинг бир қисми Нурота қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [111, 191–193, 238, 260].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий узкий реликтовый эндемик Нуратау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 15–40 см. Стебель прямой, густожезистоволосистый. Прикорневые листья многочисленные, черешковые, продолговато-ланцетные, перисторассечённые, с глубоко заострёнными перисто-лопастными сегментами; стеблевые в нижней паре более короткочерешковые, с более заострёнными лопастями; средние и верхние сильно уменьшенные, цельные, сидячие. Цветки на длинных (10–12 мм) ножках в 4-цветковых мутовках. Чашечка ширококолокольчатая, слегка вздутая, длиной 22–23 мм, неясно-двугубая, все зубцы туповатые. Венчик кремовый. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. В Жизакской, Самаркандской и Навоийской областях: Нуратинский хребет.

Места обитания. Осыпи, скалы, щебнистые и каменистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими популяциями, наиболее часто – на территории Нуратинского заповедника.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Успешно индуцирован в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Часть популяций охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [111, 191–193, 238, 260]

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau range (Jizzakh, Samarkand and Navoi regions). Inhabits mounds, rocks, skeleton and stony slopes in the middle belt of mountains. Single specimens and small populations most frequently can be found in the Nuratau nature reserve. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: some of populations are protected in the Nuratau state reserve.



Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги сурилмалар, қонларда, шўғалли ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда яқка-яқка ҳолда ва кичик тўплар ҳолда тарқалган. Қўпроқ Нурота давлат қўриқхонасида ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

248. ХАВОРАНГ МАРМАРАК

Шалфей лиловоголубой / *Salvia lilacinocaerulea* Nevski

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Пойси 1-3 та, тик, безчали туклар билан қопланган, баландлиги 30-60 см. Барглари лира кўринишли патсимон қирқилган, иккала томони оқш тукли. Гуллари 1-2 тадан 1 см узунликдаги гулбандларда гулолди баргчаларнинг қўлтигида ўрнашган. Косачаси кенг қўнғироқсимон, қабарикли, узунлиги 15-20 мм, туклари безчали. Гултожи оч пуштиранг, 35-45 мм узунликдаги қорамтир қайтақили. Ёнғоқчаси ясси - эллипсимон, узунлиги 5 мм.

Тарқалиши. Ҳисор тизмасининг ғарбий қисмида, Кўхитанг тизмасида, Сувсизтоғ ва Байсунтоғда тарқалган (Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қояларда ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 3 000 тули борлиги аниқланган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Молларнинг боқилиши ва пичан ўрилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [111, 192-193, 238, 260, 310].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Стебли 1-3, прямые, железисто-опушенные, высотой 30-60 см. Листья лировидно-перисто-раздельные с обеих сторон бело-волосистые. Цветы на цветоножках длиной 1 см, по 1-2 в пазухах прицветных листьев. Чашечка широко-колокольчатая, вздутая, длиной 15-20 мм, железисто-опушенная. Венчик бледно-сиреневый с темным отгибом, длиной 35-45 мм, голый. Орешки сплюснuto-эллиптические длиной 5 мм. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области: западные отроги Гиссарского хребта, Кугитанг, Сусызтау и Байсунтау.

Места обитания. Каменистые склоны и скалы в среднем поясе гор.

Численность. Около 3 000 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота и сенокос.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [111, 192-193, 238, 260, 310].

К.Ш. Тожибаев



Rare endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at western spurs of the Hissar range, the Kughitang, Susyztau and Baysuntau ranges. Inhabits rocks and stony slopes of the middle mountainous zone. 3 000 plants can be found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.

249. МАЙДА ГУЛЛИ ТОШБОСТИ

Зопниковияк мелкоцветный / *Phlomisoschema parviflorum* (Beenth.) Vved.

Мақоми 0. Шимоли-ғарбий Помир-Олойдаги камёб тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўт, ҳалқасимон шохланган туқли, гулёнбаргчасиз. Пояси бир нечта, энг пастки қисми ёғочланувчи, тубидан шохланган, баландлиги 30–50 см. Барглари чўзиқ ёки юқоридагилари наштасимон, учи ўткирлашган, бутун, бандсиз. Гуллари бандсиз, 2–4 тадан юқори барглarning қўлтиғида жойлашган, косчасининг узунлиги 4 мм, учбурчак, юмшоқ тишчали, найчасидан 3 марта қисқа. Гултожи оқиш, косчасидан сал узун. Ёнғоқчаси деярли шарсимон. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд вилояти: Зарафшон тизмаси (Тошбоши, Ургут)да тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Афғонистон ва Шимоли-ғарбий Ҳиндистонда учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Яқка-яқка ҳолда ва кичик гуруҳлар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Кўп миқдорда чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 300].

К.Ш. Тожибаев

Статус 0. Редкий вид Северо-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее растение, войлочно-опушенное повторно мутовчатоветвистыми волосками. Стебли в числе нескольких при самом основании деревенеющие, от основания ветвистые, высотой 30–50 см. Листья продолговатые или верхние ланцетные, островатые, цельнокрайние, сидячие. Цветы сидячие по 2–4 в пазухах верхних листьев. Чашечка длиной 4 мм, с треугольными неколючими зубцами, в 3 раза более короткими, чем трубка. Венчик беловатый, едва длиннее чашечки. Орешки почти шаровидные. Цветёт в июне, плодоносит в июле.



Распространение. Самаркандская область: Зеравшанский хребет (Ташбоши, Ургут). За пределами Узбекистана: Афганистан, Северо-западная Индия.

Места обитания. Каменистые склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается спорадически единичными растениями и группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159, 300].

К.Ш. Тожибаев



Rare species of the north-western Pamir-Alay. It is spread at the Samarkand region; the Zerafshan range, Toshboshi, Urgut. Inhabits stony slopes of the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors; pasturing. Measures of protection; special measures of preservation are not developed.

250. БУХОРО ОТОСТЕГИЯСИ

Отостегия бухарская / *Otostegia bucharica* B. Fedtsch.

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойнинг жуда кам сақланиб қолган. Йўқолиш арафасида турган камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 120 см га етадиган кулранг пояси юқори қисмигача ёғочланадиган ярим бута. Бир йиллик новдалари ноаниқ тўрт қиррали, сарғиш-оқ рангли, тукли. Барглари кенг тухумсимон, бандсиз, тўмтоқ, кўкимтир-яшил рангли, ҳурпайган қалин тукли. Гуллари бандсиз, барг қўлтигида 5–8 тадан ҳалқа ҳосил қилиб жойлашган. Гулолди баргчалари кураксимон. Тожбарглари 10–14 мм узунликда, оқ рангли. Июнь–август ойларида гуллаб, меваси сентябрь–октябрда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Шўроб, Дарбанд ва Ғурхожи қишлоқлари атрофларида бир-бирдан ажралган иккита популяцияси маълум.

Ўсиш шароити. Тоғ олди ва тоғ этакларида гипсли тепаликларда, гипсли қояларда, баъзан гипсли оҳақтошларда ўсади.

Сони. Шўроб ва Дарбанд атрофларидаги популяцияда туплар сони 1 800 дан ошмайди. Ғурхожидаги популяцияда 3 000 атрофидаги туплар ўсиши эниқланган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди. Аммо кейинги тадқиқотлар давомида уруғидан қўпайган ёш туплари қайд этилмаган.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг қўплаб боқилиши ҳамда ўсимлик уруғига турли ҳашаротларнинг зарар келтириши ўсимлиكنинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстириш ишлари натижа бермади.

Муҳофаза чоралари. У ўсиб турган жойларда буюртмаҳона ташкил қилиш лозим.

Манбалар. [14, 15, 80, 159].

И.В. Белолипов

Статус 1. Редчайший, находящийся на грани исчезновения эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Полукустарники высотой до 120 см, с высоко древеснеющими побегами серого цвета. Годичные побеги округло-четырёхгранные, желтовато-белые, опушенные. Листья сизовато-зеленые, густооттопыренно-опушенные, широкояйцевидные, тупые, сидячие. Цветки в мутовках по 5–8, сидячие в пазухах верхних листьев, с лопатчатыми прицветниками. Венчик белый, длиной 10–14 мм. Цветёт в июне–августе, плодоносит в сентябре–октябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: существует две популяции вида в окрестностях кишлаков Шуроб, Дарбанд и Гурхожи. Площадь распространения примерно 2 км².

Места обитания. Склоны гипсовых холмов, гипсовые скалы, реже сильно-гипсированные известняки в предгорьях и нижней части гор.

Численность. Популяция в окрестностях кишлаков Шуроб и Дарбанд насчитывает не более 1 800 особей. Популяция в окрестностях кишлака Гурхожи насчитывает около 3 000 особей.

Размножение. Семенное. Во время последних обследований семенное возобновление не зафиксировано.

Причины изменения численности и ареала. Неумеренный выпас скота, скотопроегон, повреждение семян насекомыми.

Культивирование. Многочисленные попытки вырастить в Ботаническом саду АН РУз результатов не дали.

Меры охраны. Необходима организация заказника.

Источники. [14, 15, 80, 159].

И.В. Белолипов



Rare, endemic, relict species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at only 2 locations: the surroundings of the villages Shurab, Derbend and Gorkhozhi, the distribution area is about 2 sq. km. (Surkhondarya region). Inhabits slopes of gypsum hills, gypsum rocks, rarely, highly gypseous lime-stones in the foothills and lower belt of mountains. 1 population consists of 1800 plants. 2 population (Gurkhazhi) – about 3000 plants. Limiting factors: overpasturing, seed damage by insects. Measures of protection: it is necessary to organize a state reserve.



251. АМУДАРЁ ОКЎШАСИ

Флемондес азмударьинский / *Phlomisoides transoxana* (Bunge) Salmaki

Мақоми 2. Қизилқумда учрайдиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–40 см га етadиган кўп йиллик ўт. Илдизи тугунаксимон йўғонлашган. Пояси туксиз, юқори қисми шохланган. Ёпирма барглари узун бандли, патсимон бўлинган, қалами бўлакчалардан иборат, устки томони тукли, пастки томони туксиз. Поясидаги барглари нисбатан кичикроқ, камроқ, бўлинган ва қисқа бандли. Гуллари биттадан, узунлиги 5 см га етадиган гулбандларда гулолди баргчалари қўлтиғида ўрнашган. Гулолди баргчалари қалами, косачадан 1,5–2 марта қисқа. Косачаси тор кўнғироқсимон, узунлиги 17–20 мм, деярли туксиз. Тожбарглари узунлиги 23–25 мм, пастки лабини ўрта қисми тўқ сариқ рангли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро ва Навоий вилоятлари: Марказий ва Жанубий Қизилқумда тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғлар атрофларида унча мустаҳкамланмаган қумларда ўсади.

Сони. Тўртта жойда (Ойтим, Жирик, Ўғиз, Себетти қудуқлари атрофлари) да маълум. Бу ерда улар кичик-кичик майдонларда тўп-тўп бўлиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тугунаги маҳаллий аҳоли томонидан доривор ашё сифатида ишлатилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [7–9, 159].

Т.А. Одилов

Статус 2. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 25–40 см. Корни с клубневидными утолщениями. Стебель голый, вверху ветвистый. Прикорневые листья на длинных черешках, перисто-рассечённые на почти линейные сегменты, сверху опушенные, снизу голые, длинночерешковые, стеблевые листья уменьшенные, менее рассечённые, короткочерешковые. Цветки по 1 на длинных (до 5 см) цветоножках, в пазухах расставленных прицветных листьев. Прицветники линейные, в 1,5–2 раза короче чашечки. Чашечка длиной 17–20 мм, узкоколокольчатая, почти голая. Венчик длиной 23–25 мм, с оранжево-жёлтой средней лопастью нижней губы. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: Центральные и Южные Кызылкумы.

Места обитания. Полуразбитые пески у подножия останцовых гор.

Численность. Известно четыре местонахождения в окрестностях колодцев Айтм, Джирик, Огуз, Себетти, где растение образует разреженные заросли.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Клубни этого растения используются местным населением как лекарственное средство.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [7–9, 159].

Т.А. Адылов

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum (Bukhara and Navoi regions). Inhabits sands at foothills of the remnant mountains. 4 locations are known in the surroundings of Aitim, Djirik, Oguz, Segetti. Limiting factors: local people use tubers of this plant as medicine. Measures of protection: not protected.



252. УЧПОЯЛИ ОҚТЎША

Фломендес ғарағноғубий / *Phlomis anisochila* (Pavlj. et Vred.) Salmaki

Мақоми 2. Нурота тизмасидаги нихоятда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см га етadиган қўйиллик, қалин тукли ўт. Поялари учта, пастки қисмидан тарвақайлаб шохланган, қалин туклар билан қопланган. Ёпирма барглари нинг банди қисқа, қалин ва узун тукли. Поядаги барглари ромб-тухумсимон, четлари тишли, қалин тукли, томирлари йўғон, поянинг юқори қисмидаги барглари эса бандсиз. Гуллари гулолди баргчаларининг қўлтиқларида ҳалқасимон шаклда ўрнашган. Гулолди баргчалари бигизсимон, пахмоқ тукли. Косачаси қўнғироқсимон, узунлиги 20 мм атрофида, найчаси қалин тукли. Тожи сариқ рангли, узунлиги 4 мм, найчасининг узунлиги 15 мм, туксиз, қайтақиси қисқа, қалин тукли, тожининг пастки

Статус 2. Чрезвычайно редкий эндемик Нуратау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой около 20 см. Стебли в количестве 3, от основания отклонённо-ветвистые, густошерстистые. Прикорневые листья на коротких, густошерстистых от длинных волосков черешках; стеблевые ромбически-яйцевидные, зубчатые, с выступающими жилками, густоволосистые, самые верхние листья сидячие. Цветки в многоцветковых сближенных мутовках в пазухах прицветных листьев. Прицветники шиловидные, сильношерстистые. Чашечка длиной около 20 мм, колокольчатая, по трубке густошерстистая. Венчик длиной 4 мм, жёлтый, с голой трубкой длиной 15 мм, снаружи с густо-коротковолосистым отгибом. Нижняя губа венчика в 2 раза длиннее верхней. Цветёт в июне-июле, плодоносит в августе.

Распространение. Джизакская область. В центральной части хребта Нуратау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны.

Численность. Общая численность до 1 000 растений, общая площадь распространения около 2 тыс. га.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [7–9, 18, 159, 289].

Т.А. Адылов



лаби устки лабидан икки марта узун. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояти; Нурота тизмасининг марказий қисмида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмида шағал-тошли қуруқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. Яққа ҳолда ва кичик тўплар ҳолида учрайди. Тўплар умумий сони 1 000 дан ошмайди.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Сонининг ўзгариш сабаблари аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [7–9, 18, 159, 289].

Т.О. Одилов

Extremely rare endemic species of the Nuratau range. It is spread at the central part of the Nuratau range (Jizzakh region). Inhabits dry stony-slopes. About 1 000 plants can be found. The distribution area is about 2 000 hectares. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



253. ОРОЛ ФЛОМОИДЕСИ

Фломоидес аральский / *Phlomis aralensis* (Bunge) Salmaidi

Мақоми 2. Қизилкумда учрайдиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Илдизи шолғомсимон. Пояси тик, юқори қисми шохланган, момик тукли, баландлиги 30 см. Барглари тўмтоқ тишчали, ик-

Сони. 200 га иқин туплари борлиги аниқланган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Қўп миқдорда чорва боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [7–9, 159].

Т. О. Одилов

Статус 2. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Корень реповидный. Стебель прямой вверх ветвистый, мохнатый, высотой 30 см. Листья городчато-зубчатые, с обеих сторон бело-волосистые. Цветы сидячие, по 1 в пазухах прицветных листьев. Чашечка колокольчатая, вздутая, длиной 15–20 мм, густо-мохнатая. Венчик белый с желтой нижней губой длиной 22–25 мм. Орешки на верхушке мохнатые. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Навоийская область: пески Джаманкум, Баткакум, около родников Аякагытма, Узункудук, Янгикудук, Ауминза.

Места обитания. Закрепленные пески и шлейфы останцов.

Численность. В 2007 г. выявлено около 200 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [7–9, 159].

Т.А. Адылов

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Dzhamankum, the Batkakum, the Ajakagytma, the Uzunkuduk, the Jangikuduk, the Auminza (Bukhara and Navoi region). Inhabits sands and piedmonts of remnant mountains, 200 plants were found in 2007. Measures of protection: not protected.

кала томони оқиш тукли. Гуллари бандсиз, 1 тадан гулолди баргларнинг қўлтигида жойлашган. Косачаси қўнғироқсимон, пуфаксимон, узунлиги 15–20 мм, қалин тукли. Гултожи оқ, пастки лаби сарик, узунлиги 22–25 мм. Ёнғоқчасининг учи қалин тукли.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Ёмонқум, Баткакум, Аяқагитма бўлоғи атрофи, Узункудук, Янгикудук ва Ауманзада тарқалган.

Ўсиш шароити. Мустақамланган қумларда ва қолдиқ тоғларининг увоқларида ўсади.



254. БОБУР ФЛОМОИДЕСИ

Фломоидес Бабур / *Phlomis baburi* (Adylov) Adylov

Мақоми 1. Жанубий Ўзбекистондаги гонт камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40–50 см га етадиган қўн йиллик ўт. Пояси бақувват, туксиз, пастки қисмидан тарвақайлаб шохланган. Ёпирма барглари чўзиқ, асоси кенг понасимон, қисқа бандли, туксиз; пондаги барглари кичикроқ, деярли бандсиз, ўткир тишли. Гуллари бандсиз, гулолди баргчаларининг қўлтигида камгулли ярим ҳалқа ҳосил қилиб ўрнашган. Гулолди барглари бигизсимон, туксиз, косачадан 4 марта қисқа. Косачаси 16–20 мм узунликда, най-қўнғироқсимон, туксиз. Косачасининг четлари киприксимон. Тожининг узунлиги 30 мм, оқиш ёки қуригилганда оч сариқ рангда бўлса керак. Тожининг найи косачадан салгина чиқиб туради.

Май ойида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Шерабод тепаликларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Очиқ қолган ола жинсларда ўсади.

Сони. 2009 йили 200 тупи қайд этилган.

Қўпайиши. Уругидан қўпайса керак.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [6–9, 159].

Т.О. Одилов

Статус 1. Очень редкий узкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 40–50 см. Стебель крепкий, от основания отклонённо-ветвистый, голый. Прикорневые листья продолговатые, при основании ширококлиновидные, короткочерешковые, голые; стеблевые уменьшенные, почти сидячие, с острыми зубцами. Цветки почти сидячие, в не-



многочетковых, слегка расставленных полумутовках в пазухах прицветных листьев. Прицветники шиловидные, голые, в 4 раза короче чашечки. Чашечка длиной 16–20 мм, трубчатого-колокольчатая, голая. Зубцы чашечки по краю снабжены густыми ресничками. Венчик длиной около 30 мм, видимо, белый или бледно-жёлтый (в сухом виде); трубка венчика едва выступает из чашечки. Цветёт в мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Келиф-Шерабадская гряда (окрестности кишлака Акташ).

Места обитания. Серые глины.

Численность. В 2009 г. зарегистрировано 200 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Поедается скотом.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [6–9, 159].

Т.А. Адылов

Very rare endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Kelif-Sherabad range: nearby the Aktash village (Surkhondarya region). Inhabits grey clays. In 2009, 200 plants were registered. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



255. ГИПСЛИ ФЛОМОИДЕС

Фломоидес гипсовый / *Phlomisoides gypsacea* (Popov) Adylov, Kamelin et Makhm.

Мақоми 0. Ғарбий Ҳисор тизмаларидаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 100 см га етадиган қўп йиллик ўт. Пояси шохланган, туксиз. Ёпирма барглари узун бандли, йирик, чўзиқ-эллипсимон, четлари йирик тишсимон ўйилган, ҳар икки томони сийрак-юлдузсимон туклар билан қопланган. Поядаги барглари қисқа бандли, энг юқори қисмидагилари эса деярли бандсиз. Космасининг узунлиги 16–18 мм, қўнғироқсимон, сийрак тукли. Тожининг узунлиги 25–30 мм, оқ рангли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ғузур шаҳрининг жануби-шарқидаги пасть тоғларда тарқалган.

Ўсиш шароити. Очилиб қолган ола жинсларда ўсади.

Сони. Жуда камёб ўсимлик. Фақат бир марта 1935 йилда Ғузур шаҳрининг жануби-шарқи (Қоракамар атрофи)дан терилган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайса керак.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [7–9, 159].

Т.О. Одилов

Статус 0. Чрезвычайно редкий эндемик Западного Гиссара.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой около 100 см. Стебель ветвистый, голый. Прикорневые листья длинночерешковые, крупные, продолговато-эллиптические, крупнозубчато-городчатые, с обеих сторон с рассеянными звездчатыми волосками; стеблевые короткочерешковые; прицветные почти сидячие. Чашечка длиной 16–18 мм, трубчато-колокольчатая, с немногочисленными волосками. Венчик длиной 25–30 мм, белый. Цветёт в мае, плодоносит в июне.



Распространение. Кашкадарьинская область: пестроцветные низкогорья к юго-востоку от города Гузар.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород.

Численность. Очень редкий. Собран только один раз в 1935 г. к юго-востоку от города Гузар, в окрестностях зимовки Кара-Камар. Многократные попытки найти растение успехом не увенчались. Вероятно, вид исчез.

Размножение. Возможно семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [7–9, 159].

Т.А. Адылов



Extremely rare endemic species of the western Hissar range. It is spread at the gypsaceous low mountains to the south-east of Guzars (Kashkadarya region). Inhabits outcrops of gypsaceous rocks. It was collected only once, in 1935 to the south-east of Guzars, in the surroundings of the Kara-Kamar. Several attempts to find the species had no success. Probably disappeared. Measures of protection; not protected.

256. СИЛЛИК КОСАЧАЛИ ФЛОМОИДЕС

Фломоидес гладкочашечный / *Phlomoïdes leiocalyx* (Pavil et Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.

Мақоми 1. Қарши чўлидаги ниҳоятда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50–60 см га етадиган пояси шохлаган, туксиз қўп йиллик ўт. Ёпирма барглари қисқа бандли, чўзиқ, четлари йирик тишсимон ўйилган, ҳар икки томони сийрак, юлдузсимон тукли. Поядаги барглари деярли бандсиз. Гуллари ярим ҳалқалар ҳосил қилиб, гулолди баргларининг қўлтиқларида жойлашган. Гулолди баргчалари бигизсимон, косачасидан 3 марта қисқа. Косачаси найсимон, туксиз, узунлиги 17–18 мм. Тожининг узунлиги 33–35 мм, оқ рангли, пастки лаби дастлаб бинафша, кейинроқ эса қўғиғир рангга ўтувчи доеларга эга. Апрельда гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Қарши чўлларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғолди тепаликларидаги соз тупроқларда ўсади.

Сони. 1958 йил 22 апрелда Гузор–Қарши темир йўли четларидан бир марта терилган. Бу тур қайта учрамаган.

Қўпайиши. Уругидан қўпайса керак.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [7–9, 159].

Т.О. Одилов

Статус 1. Очень редкий узкий эндемик Каршинской степи.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 50–60 см с голым ветвящимся стеблем. Прикорневые листья короткочерешковые, продолговатые, городчато-лопастные с рассеянными звездчатыми волосками с обеих сторон; стеблевые почти сидячие. Цветки в по-



лумутовках в пазухах прицветных листьев. Прицветники шиловидные, в 3 раза короче чашечки. Чашечка голая, трубчатая, длиной 17–18 мм. Венчик длиной 33–35 мм, белый, сначала с фиолетовым, затем с коричневым пятном на нижней губе. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Кашкадарьинская область: Каршинская степь.

Места обитания. Глинистые холмы в предгорьях.

Численность. Растение собрано 22 апреля 1958 года у полотна железной дороги между городами Гузар и Карши. Повторные сборы не известны.

Размножение. Возможно семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [7–9, 159].

Т.А. Адылов

Very rare endemic species of the Karshi Steppe.

It is spread at the Karshi Steppe (Kashkadarya region). Inhabits clayish hills. In April 22, 1958, the plant was collected at the permanent way between Guzard and Karshi. Another collections are unknown. Measures of protection: not protected.



257. ЧИМЁН ФЛОМОИДЕСИ

Фломоидес чимганский / *Phlomooides tschimganica* (Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.

Мақоми 0. Чотқол тизмасидаги деярли йўқолган тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40–50 см га етадиган қўп йиллик ўт. Пойси иккита, оддий. Ёпирма барглари қўп, кенг тухумсимондан то наштарсимонгача, четлари йирик тишсимон ўйилган. Пойдаги барглари 1 жуфт, чузиқ наштарсимон. Гуллари бандсиз, қўп гулли ҳалқа ҳосил қилиб ўрнашган. Гулолди баргчалари бигизсимон-қалами, косачасига тенг. Косачасининг узунлиги 12 мм, қалин юлдузсимон туклар билан қопланган. Косачасидаги тишларининг узунлиги 4–5 мм. Тожининг узунлиги 20 мм, бинафша рангли. Июлда гуллаб, меваси август ойида етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Катта Чимён тоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ ёнбағирларида ўсади.

Сони. Бу тур 1926 йили Катта Чимён тоғидан терилган. Ягона нусха зсосида тавсифланган.

Қўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.
Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайд.
Манбалар. [7–9, 159, 293].

Т.О. Одилов

Статус 0. Возможно, исчезнувший вид Чаткальского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 40–50 см. Стебли в количестве 2, простые. Листья прикорневые, в густой розетке, от широкояйцевидных до ланцетных, крупно-городчато-зубчатые; стеблевые в количестве 1 пары, продолговато-ланцетные. Цветки сидячие, в многоцветковых расставленных мутовках. Прицветники шиловидно-линейные, равные чашечке. Чашечка длиной 12 мм, густо покрыта звездчатыми волосками. Зубцы чашечки длиной 4–5 мм. Венчик длиной около 20 мм, лиловый. Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Ташкентская область: горы Большого Чимгана.

Места обитания. Склоны среднего пояса гор.

Численность. Единственный экземпляр, по которому описан вид, найден в 1926 г. на Большом Чимгане. Больше растение никем не собиралось. Вид, вероятно, исчез.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [7–9, 159, 293].

Т.А. Адылов

Rare endemic probably disappeared species of the Chatkal range. It is spread at the Great Chimgan (Tashkent region). Inhabits slopes in the middle belt of mountains. Only one specimen was found in 1926, in the Great Chimgan. No one collected the species any more. Probably disappeared. Measures of protection: not protected.



258. БЎҒИЗТУКЛИ ЭРЕМОСТАХИС

Пустынноюлосник опушенноглоточный / *Eremostachys eriologynx* Pazij et Vred.

Мақоми 1. Қизилқумдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–30 см га етадиган қўп йиллик ўт. Илдизи шолғомсимон. Пояси қалин, оддий хурпайган туклар билан қопланган. Ёпирма барглари кенг тухумсимон, қисқа бандли, япроғининг четлари тишсимон ўйилган, оддий тукли. Пойдаги барглари ёпирма барглarga ўхшаш, лекин майдароқ. Гуллари майда, ярим ҳалқа бўлиб гулолди баргчалари қўлтиғида ўрнашган. Косачанинг узунлиги 20–25 мм, карнайсимон, қайтакиси кенг, оддий ва сийрак безчасимон туклар билан қопланган. Тожининг узунлиги 28–31 мм, оқ рангли, пастки лаби сарик. Тож найининг ташқи томони туксиз, ичи эса тукли ҳалқага эга. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро вилояти; Қизилқумда тарқалган. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Текисликлардаги сур-қўнгир тусли тупроқларда ўсади.

Сони. Биринчи марта 1871 йил 5 майда Карак чулдан ва шу йил Карак тоғининг шарқий этакларидан терилган (Чимкент вилояти). 1956 йилда Гиждувон туманига қарашли Янгикудук яқинидан топилган (Бухоро вилояти). 2016 йилда Бухоро вилояти Гиждувон тумани Қорабоғ қишлоғи атрофида топилган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ташқари қўп боқилиши унинг ўсишига салбий таъсир кўрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [6, 61, 115].

Т.О. Одилов

Статус 1. Очень редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее растение высотой 20–30 см с реповидным корнем. Стебель

густо-опушенный длинными утолщенными простыми волосками. Прикорневые листья широко-ййцевидные, зубчато-городчатые, опушенные простыми волосками, короткочерешковые; стеблевые сходны с прикорневыми, но более мелкие. Цветки в полумутовках в пазухах прицветных листьев. Чашечка длиной 20–25 мм, воронковидная, с очень расширенным отгибом, опушенная простыми волосками с примесью одиночных, железистых. Венчик длиной 28–31 мм, белый, с желтой нижней губой. Трубка венчика снаружи голая, внутри снабжена волосистым кольцом. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Бухарская область: Кызылкумы. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Серо-бурые почвы равнин.

Численность. Впервые собран 5 мая 1871 г. в Каракской степи (Чимкентская область). В 1956 году собран в Гиждуванском районе в окрестностях колодца Янги-Кудук (Бухарская область). В 2016 году найден в Гиждуванском районе Бухар-



ской области, в окрестностях кишлака Карабаг.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [6, 61, 115].

Т.А. Адылов

Very rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum (Bukhara region). Inhabits grey-brown desert soils. For the first time, it was collected in May 5, 1871, in the Karak Steppe (the Chimgent region). In 1956, it was collected near the well Yangi-Kuduk (Bukhara region). In 2016, the species was found near the village Karabag (Bukhara region). Subsequent repeated searches were unsuccessful. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.



259. КЎРИМСИЗ ҚЎЗИҚУЛОҚ

Зопник мрачный / *Phlomis subilans* Zakirov

Мақоми 3. Нурота тизмасидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–40 см оранжидидаги қўп йиллик ўт. Пойси бир нечта. Барги тухумсимон, четлари текис ёки ноаниқ аррасимон, устки томони юлдузсимон ва оддий туклар билан қопланган, пастки томони эса қалин юлдузсимон тукли ва йўғон томирли. Гуллари бандсиз, пойнинг юқори қисмидаги барглари қўлтиғида 2–6 тадан сийрак халқа ҳосил қилиб жойлашган. Гулдан баргчалари бигизсимон, косача найдан 1,5 баробар узун. Косачаси 10–13 мм узунликда, қалин юлдузсимон туклар билан қопланган. Тожи пушти, узунлиги 23–27 мм. Июлда гуллаб, меваси август ойида етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота тизмаси ва Оқтоғда тарқалган.



Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки ва ўрта қисмида майда жинс тупроқли, шағалли ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда яқка-яқка ва бир-биридан ажралган тўплари учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Қишлоқ хўжалик экинлари учун ерларнинг ўзлаштирилиши ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Популяциясининг бир қисми Нурота давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [94, 194, 195].

Р.У. Қодиров

Статус 3. Редкий эндемик Нуратинских гор.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30–40 см. Стеблей несколько.

Листья яйцевидные, цельнокрайные или неясно-пильчатые, сверху с рассечёнными звёздчатыми или простыми волосками, снизу с выступающими жилками и звёздчато-войлочные. Цветки сидячие, в немногочетковых (2–6) расставленных мутовках в пазухах верхних листьев. Прицветники шиловидные, в 1,5 раза длиннее трубки чашечки. Чашечка длиной 10–13 мм, густо-звёздчато-опушенная. Венчик розовый, длиной 23–27 мм. Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. В Жиззакской, Самаркандской и Навоийской областях: хребет Нуратау и горы Актау.

Места обитания. Мелкоземистые, щебнистые, каменистые склоны нижнего и среднего пояса гор.

Численность. Встречается единично и группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение мест естественного произрастания под сельскохозяйству и выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Часть популяций охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [94, 194, 195].

Р.У. Қодиров

Rare endemic species of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau and Aktau mountains

(Jizzakh, Samarkand, Navoi regions). Inhabits fine earth and stony slopes in the lower and middle belt of mountains. Single specimens and populations occur sporadically. Limiting factors: reclamation of natural habitats under farming and pasturing. Measures of protection: some populations are protected in the Nuratau state reserve.



260. КУДРЯШЕВ АРСЛОНҚУЙРУҒИ

Пустырник Кудряшева / *Leonurus kudrjaschevii* Kamešin et Tulyag.

Мақоми 2. Ҳисор тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 35–55 см га етадиган, тўғри ўсувчи, оддий, баъзида бироз шохланган кўп йиллик ўт. Пояси қалин, кулранг туклар билан қопланган. Баргининг икки томони тукли, узунлиги 3–6 см, эни 2,5–4 см. Гул бандидаги барги кенг ромбсимон, асоси понасимон. Гуллари халқасимон ўрнашган, узунлиги 3,5–9 см. Гул-ёнбаргчаси қалами-наштарсимон, баъзида учи қайрилган, қалин туклар билан қопланган, гул косача баргидан бироз қисқа. Гулкоса баргининг узунлиги 6–6,5 мм, қалин тукли. Гултож барги майда, узунлиги 10–12 мм, рангли. Ёнғоқчаси оқиш-жигарранг, уч қиррали, учига томон қийшиқ, ўткирлашган, узунлиги 2 мм гача, июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: ГАРБИЙ Ҳисорнинг (Бешнов ва Майданак тоғлари) шимолий ёнбағирларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмидаги шимолий тошлоқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уругдан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўп боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [159, 298, 299].

М. Туляганова



Статус 2. Редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 35–55 см. Все растение густо паутинисто-войлочко опушенное. Листья с обеих сторон опушенные, в очертании широкоромбические, длиной 3–6 см, шириной 2,5–4 см. Соцветия расставленные, длиной 3,5–9 см. Чашечка длиной 6–6,5 мм, густо опушенная, с зубцами. Венчик мелкий, сиреневый, длиной около 10–12 мм. Орешки длиной около 2 мм, светло-коричневые, опушенные. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Кашкадарьинская область: Западный Гиссар – бассейн реки Кашкадарья, горы Бешнау и Майданак.

Места обитания. На северных каменистых склонах в субальпийском поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском заповеднике.

Источники. [159, 298, 299].

М. Туляганова

Rare endemic species of the western Hissar range. It is spread at the western part of the Hissar range; the Kashkadarya river basin, Mt. Beshnau and Mt. Mайданак (Kashkadarya region). Inhabits subalpine slopes. The quantity is unknown. Measures of protection; protected in the Hissar state nature reserve.



ҚОВОҚДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ТЫКВЕННЫЕ –
CUCURBITACEAE

261. ҚОРА СИРТТАН

Переступень черноплодный / *Bryonia melanocarpa* Nabiev



Мақоми 3. Жануби-шарқий Қизилқумда кичик майдонда сакланиб қолган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Чирмашиб ўсувчи қўп йиллик ўт. Илдизи йўгон, узунлиги 75 см гача, йўгонлиги 15–30 см, оғирлиги 27 кг гача. Илдиз бўғизидан (25 гача) 2–4 м узунликдаги чирмашиб ўсувчи поялар ўсиб чиқади. Пастки барглари йирик, этли, кенг юраксимон, чуқур беш бўлакли; юқоридаги барглари майда, наштаксимон учбурчакли, 2–5 бўлакли. Пастки шингиллари чангчили. Шингилининг ўрта қисмидаги гуллари аралаш (чангчи ва уруғчили); юқоридаги гуллари эса уруғчили. Тожги яшил-сарик рангли. Меваси яшил-қора рангли, юмалоқ, силлиқ, диаметри 6–8 мм. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Сирдарё, Жиззах ва Навоий вилоятлари: Қизилқумдаги қадимий Чордара шаҳри ҳаробалари яқинида ва Айдарқул атрофида тарқалган. Қозогистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Мустақамланган кичик қум уюмларида ўсади.

Сони. Кичик-кичик тўплар ҳосил қилиб ёки якка-якка ҳолда учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши, қўл бутазорлари деградацияси туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. 1958–1960 йиллар мобайнида ЎзР ФА Ботаника боғи тажриба даласида ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [156–159, 199].

М.М. Набиев

Статус 3. Редкий узкий эндемик Юго-восточного Кызылкума.

Краткое описание. Лиановидный травянистый многолетник. Корень толстый, длиной до 75

см, толщиной 15–30 см (масса до 27 кг). От корневой шейки отходят многочисленные (до 25) цепляющиеся стебли длиной 2–4 м. Нижние листья крупные, широкосердцевидные, глубоко-пятираздельные; верхние – мелкие, копьевидно-треугольные, 5-лопастные. Нижние кисти мужские; верхние с мужскими и женскими цветками на коротких цветоносах; самые верхние – с женскими цветками. Венчики зеленовато-жёлтые. Плоды зеленовато-черные, шаровидные, гладкие, 6–8 мм в диаметре. Цветёт апреле–мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Сырдарьинской, Навоийской и Джизакской областях: Кызылкумы близ

руин города Чардара, пески около озера Айдаркуль. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Закреплённые мелкобугристые пески.

Численность. Встречается единично и небольшими популяциями вокруг озера Айдаркуль.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Деградация пустынных экосистем, выпас скота и выкапывание корней в качестве лекарства.

Культивирование. С 1958 по 1960 гг. успешно культивировался на экспериментальном участке Ботанического сада АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [156–159, 199].

М.М. Набиев

Rare endemic species of the south-eastern Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: near the ruins of the Chardara, around the Aydarkul Lake (Syrdarya, Navoi and Jizzakh regions). Inhabits fixed small-hilly sands. Single specimens and small populations occur around of the Aydar Lake. Limiting factors: degradation of desert ecosystems, pasturing and digging the roots for medicinal purposes. Measures of protection: not protected.



ҚОРАҚАТДОШЛАР (ТОШБЕРДОШЛАР) ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО КРЫЖОВНИКОВЫЕ
(КАМНЕЛОМКОВЫЕ) - GROSSULARIACEAE (SAXIFRAGACEAE)

262. ГУЛХАЙРИБАРГ ҚОРАҚАТ

Смородина малъолистная / *Ribes malvifolium* Pojark.



Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Кустарник высотой до 1 м. Всё растение, кроме листьев, покрыто стебельчатыми железками. Листья с 5 лопастями, шириной 1,5–4 см. Цветки в многоцветковых кистях, беловатые. Плод – многосеменная ягода. Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Каменистые склоны, россы-

пы и трещины скал в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор плодов в качестве лекарственного сырья.

Культивирование. Изредка культивируется в частных садах как декоративное и лекарственное растение.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском заповеднике.

Источники. [159, 188].

О.Т. Тургинов

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м гача етадиган бута. Ўсимлиkning барча қисми (баргларида ташқари) безчалли туклар билан қопланган. Барглари 5 бўлакли. Бўлақларининг эни 1,5–4 см. Гуллари қўпгулли шингил ҳосил қилиб ўрнашган, оқиш рангли. Меваси қўп уруғли, резавор. Июль ойида гуллаб, меваси август ойида пишади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларидаги тошли ёнбағирлар, сурилмалар ва қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Табиатда яқка-яқка бўлиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Меваси дориворлик хусусиятига эга бўлганлиги учун қўплаб териб олинади.

Маданийлаштирилиши. Манзарали ва доривор ўсимлик сифатида оз бўлса ҳам боғларда ва ҳовлиларда экилади.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор қўриқхонасида муҳофаза қилинади. Мавжуд тўплари устидан назорат ўрнатилган ва биологик хусусиятларини ўрганиш лозим.

Манбалар. [159, 188].

О.Т. Тургинов

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range (Surkhondarya and Kashkadarya regions). Inhabits stony slopes, gorges in the lower and middle belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: harvesting of fruits as medicinal raw material. Measures of protection: protected in the Hissar nature reserve.



ҚОҚИЎТДОШЛАР (МУРАККАБГУЛДОШЛАР) ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО
АСТРОВЫЕ (СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ) – ASTERACEAE (COMPOSITAE)

263. ЯШИЛ АНУРА

Анура бледнозелёная / *Anura pallidivirens* (Kult.) Tscherneva

Мақоми 2. Нурота тоғларида ўсувчи камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40–50 см га етadиган кўп йиллик ўт. Пояси чалкаш туклар билан қопланган, жўякли, асосидан шохланган. Барглари чармсимон, устки томони туксиз, пастки томони қалин оқ туклар билан қопланган. Илдизолди барглари бандли, тухумсимон, четлари текис ёки майда тикан тишли. Поядаги барглари пастдан юқорига қарай майдалашиб боради, бандси ёки пояни қамраб туради, пастки қисмининг икки томони йирик тикан тишли ёки текис. Саватчаси кўп, қисқа бандли, майда. Гуллари кўп, оқ. Уруғи майда, чузиқ-овал шаклда. Июнь–июль ойида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота, Қўйтош, Октоғ, ва Молғузар тизмалари (Темур дарвозаси атрофи)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки ва ўрта қисмида, тош шағалли, баъзан майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда, баъзан кичик тўплар ҳосил қилиб тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари учун яхши озуқа бўлганлиги туфайли уруғидан кўпайиши анча чекланган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота қўриқхонасида қўриқланади.

Манбалар. [18, 156–159, 289, 326].

Н.Ю. Бешко

Статус 2. Редкий эндемичный вид и род Нуратинских гор.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 40–50 см. Стебель опушен паутистыми волосками, бороздчатый, от основания ветвистый. Листья кожистые, сверху – голые, снизу – седоватойлочные, прикорневые листья черешковые,

ийцевидные, по краю – почти цельнокрайные или очень мелкоколючезубчатые, стеблевые к верхушке очень быстро уменьшающиеся, сидячие, полустеблеобъемлющие, при основании с обеих сторон крупноколючезубчатые или цельнокрайные. Корзинки многочисленные, на коротких ножках, мелкие. Цветки многочисленные, с белыми венчиками. Семянки мелкие, продолговато-овальные. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.



Распространение. В Навоийской, Самаркандской и Джизакской областях: Нуратау – Койташ, Мальгузарские горы (около Тамерлановых ворот), Актау.

Места обитания. Каменно-щебнистые, мелкоземистые склоны нижнего и среднего пояса гор.

Численность. Встречается спорадически, как единично и небольшими группами, так и довольно многочисленными популяциями (до нескольких сотен растений). Площадь локальных популяций составляет от 0,01 га до нескольких гектаров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хорошо поедается всеми видами домашнего скота, перевыпас препятствует семенному размножению.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нуратинского заповедника.

Источники. [18, 156–159, 289, 326].

Н.Ю. Бешко

Rare endemic species and genus of the Nuratau mountains. It is spread at the Nuratau, the Koytash, the Aktau, the Malguzar mountains (nearby the Tamerlan's Gate gorge), (Navoi, Samarkand, Jizzakh regions). Inhabits stony, fine earth slopes in the lower and middle belt of mountains. It occurs sporadically, by single specimens, small groups, sometimes, large populations (up to several hundred plants). Limiting factors: pasturing. Well eaten by livestock that prevents seed reproduction. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.

264. АЛЛОЛЕПИС КАРПАК

Кузинея инакотешуйая / *Cousinia allolepis* Tschernaeve et Vred.

Мақоми 2. Ҳисор тизмаси ғарбий қисмига ҳос жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 55 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояси кўп, чалкаш тукли, асоси қалин тукли, ўрта қисмидан шохланувчан. Шохчалари якка саватчали, баргларининг устки томони безчали тукли, пастки томони кулранг қалин тукли. Ташқи ёлпирма баргларининг банди новсимон кенгайган, ичкилариники бандли, наштарсимон, патсимон бўлинган, асосига қараб пардасимон қанотчалар ҳосил қилади. Пойдаги барглари юқорига қараб кичрайиб боради, бандсиз. Саватчаси кенг цилиндрсимон, безчали ҳамда оддий туклар билан қопланган. Урама барглари 35 тага яқин. Тожи сариқ рангли, Уруғи узун таскари тухумсимон, майда тишли. Август ойида гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмасининг ғарбий қисмида Қашқадарё ҳавзасида тарқалган (Оқсув, Гилондарё ва Танхоздарё ҳавзаларининг юқори қисми).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқ маълумот йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофиза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофиза қилинади.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф.Ў Ҳасанов

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного Гиссара.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 55 см. Стебли (их несколько), паутинистые, у основания войлочные, от середины ветвистые. Веточки несут по 1 корзинке. Листья сверху железистоволосистые, снизу – серо-войлочные; наружные прикорневые – с влагалищно-расширенными черешками; внутренние прикорневые с черешками, к основанию плёнчато крылатыми, ланцетные, перисторассечённые; стеблевые сверху постепенно уменьшающиеся, сидячие. Корзинки широкоцилиндрические, опушенные железистыми и простыми волосками. Листочки обёртки в количестве 30–35. Венчики жёлтые. Семянки продолговато-обратнояйцевидные, мелкозубчатые. Цветёт в августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Кашкадарьинская область: западные отроги Гиссарского хребта, бассейн реки Кашкадарья, верховья Аксу, Гиландарьи и Танхаздарьи.

Места обитания. Каменные склоны в верхнем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.



Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф.О. Хасанов

Very rare endemic species of the western part of the Hissar range. It is spread at the western outskirts of the Hissar range, the Kashkadarya river basin, the upper reach of the Aksu, the Gilandarya and Tankhazdarya rivers (the Kashkadarya region). Inhabits stony slopes in the upper belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Hissar state nature reserve.



265. БЕЗЧАТУКЛИ КАРПАК

Кузвиния железистая / *Coesinia aënenophora* Juz.

Мақоми 2. Зарафшон тизмаси ғарбий қисмига мансуб жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган куп йиллик ўт. Поялари қўп, тарвақайлаган, туксиз, юқори қисми безчасимон тукли. Шохчалари якка каллакли. Тўпгуллари сийрак. Баргларининг устки томони безчасимон тукли, пастки томони кулранг, қалин тукли, пяссимон қирқилган. Поядаги барглари бандсиз, юқорига қараб кичрайиб боради. Саватчалари чузиқ тухумсимон, безчасимон тукларга эга. Урама баргчалари 30–40 та, яссиروقчармсимон, безчасимон тукли. Гули сариқ рангли. Уруғи тескари тухумсимон, девяри уч қиррали, ингичка қанотчали, юқори қисми 2–3 тишли. Июль–август ойларида гуллаб, уруғи август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиий ҳолда кам тарқалган.



Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқ маълумот йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф.Ў Ҳасанов



Статус 2. Очень редкий эндемик западной части Зеравшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 50 см. Стеблей несколько, голые, в верхней половине железистоопушенные, оттопыренноветвистые, веточки одноголовчатые. Соцветие рыхлое. Листья сверху железисто-волосистые, снизу – серо-войлочные, перисторассеченные, стеблевые листья к вершине стебля постепенно уменьшающиеся, сидячие. Корзинки узкояйцевидные, железистые. Листочки обёртки в количестве 30–40, плосковатые, кожистые, железистоволосистые. Венчик желтый. Семянки обратнояйцевидные, почти трёхгранные, узокрылатые, наверху 2–3-зубчатые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях: Зеравшанский хребет.

Места обитания. Каменистые склоны в верхнем поясе гор.

Численность. В естественных условиях встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф.О. Хасанов

Very rare endemic species of the western part of the Zeravshan range. It is spread at the Zeravshan range (Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits stony slopes in the upper belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.

266. БУТКОВ КАРРАГИ

Қўзиния Буткова / Cousinia butkovii Tscherneva et Vved.

Мақоми 1. Зарафшон тизмасига мансуб камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см га етадиган пояси йўл-йўл чизикли (жуякли), қалин тукли, сербарг, асосидан шохланувчан, яқка қаллакли, икки йиллик ўт. Барглари яшил рангли, устки ва пастки томони қалқаш тукли, қирраси тикансимон тишли. Епирма ҳамда поянинг пастки қисмидаги барглари қисқа бандли, патсимон бўлинган. Поянинг ўрта қисмидаги барглари чўзиқ, четлари бўлакли, юқори қисмидагилари эса юмалоқ, пояни ярим қамраб туради, уч қаттиқ, тиканли. Саватчаси ясси-юмалоқ (диаметри 2,5-3,5 см), кўп гулли. Урама барглари кўп, дағал. Тожни пушти рангли. Уруғи чўзиқ тухумсимон. Май-июль ойларида гуллаб, меваси июль-августларда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмаси (Ургут шаҳри атрофлари, Самарқанд тоғлари, Оқсой қишлоғи атрофи) да тарқалган. Тожкистонда ҳам учрайди.

Усиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва пастки қисмларидаги жарликлар, сурилмалар ҳамда шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Усимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳалдан ташқари кўп боқилиши ва ҳашак учун ўриб олинishi сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Аннқ маълумот йўқ, расбросанными

Муҳофаза чоралари. Кнтоб давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 1. Редкий вид Зеравшанского хребта.

Краткое описание. Двулетнее травянистое растение высотой до 40 см. Стебель полосатобороздчатый, войлочный, облиственный, от основания ветвистый, одиоголовчатый. Листья светло-зелёные, сверху и снизу паутинистые, по краю – колючезубчатые; прикорневые и нижние – короткочерешковые, перисто-раздельные; средние стеблевые – продолговатые, лопастные; верхние – округлые, полустеблеобъемлющие, кончаются крепкой колючкой. Корзинки сплюснуто-шаровидные (2,5-3,5 см в диаметре), многоцветковые. Листочки обёртки многочисленные, грубые. Венчик розовый. Семянки продолговато-йичевидные. Цветёт в мае-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях: Зеравшанский хребет, окрестности города Ургут; Самаркандские горы, окрестности Аксай. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Щебнистые склоны, осыпи и обрывы в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота, заготовки на сено.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Китабском заповеднике.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф.О. Ҳасанов



Rare species of the Zerafshan range. It is spread at the Zerafshan range, nearby Urgut: the Samarkand mountains, nearby the village Aksay (the Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits slopes, mounds and cliffs in the lower and middle belts of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing, hay-mowings. Measures of protection: protected in the Kitab state reserve



267. ВВЕДЕНСКИЙ КАРПАГИ

Кузиния Введенского / Cousinia vvedenskii Tschernaveva

Мақоми 2. Ҳисор тизмаси жануби-ғарбий тармоқларининг эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см га етадиган икки йиллик ўт. Понси йўл-йўл қизикли (жўякли), чалкаш тукли, шохлари 1 ёки 2 та каллакли. Барглариининг пастки томони қалин оқиш тукли, устки томони сий-рак чалкаш тукли, четлари тишсимон майда тиканли. Ёпирма барглари бандли, лирасимон. Поянинг пастки қисмидаги барглари ёпирма баргларга ўхшаш, банд-



сиз ёки қисқа бандли. Поянинг ўрта қисмидаги барглари ҳам бандсиз. Энг юқоридагилари эса қисқариб тиканга айланган. Саватчаси чўзиқ тухумсимон, юқори қисми сиқилган, сий-рак чалкаш тукли. Урама баргчалари яшил, қиррали, ўткир учли, ўрта қисми

қисилган. Тожи пушти рангли, Уруғи тескари тухумсимон, тўқ кулранг. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Помир-Олойда Чўлбайир, Бойсун тоғларида, Ҳисор тизмаси жанубий ёнбағридаги Сангардак сув ҳавзасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги йирик тошли ва шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Фақат ўзига хос тупроқда ўсишга мослашганлиги унинг қисқаришига сабаб бўлган.

Маданийлаштирилиши. Аниқ маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф.О. Ҳасанов

Статус 2. Эндемик юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

Краткое описание. Двухлетнее травянистое растение высотой до 20 см. Стебель полосатобороздчатый, паутинистый, ветви одно- реже двуголовчатые. Листья снизу беловато-шерстистые, сверху умеренно-паутинистые, по краю – мелко-колючезубчатые; прикорневые листья черешковые, лировидные; нижние – стеблевые, подобны прикорневым, но сидячие или короткочерешковые; средние – стеблевые, сидячие; самые верхние иногда редуцированные до колёчки. Корзинки продолговато-яйцевидные, наверху сжатые, умеренно-паутинистые. Листочки обёртки зеленые, жилеватые, короткозаострённые, в средней части сжатые. Венчик розовый. Семязки обратнояйцевидные, тёмно-серые. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: Памиро-Алай: горы Чутьбайир и Байсунтау, бассейн реки Сангардак на южном склоне Гиссарского хребта.

Места обитания. Каменистые и щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к определенным местам обитания.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф.О. Ҳасанов



Endemic species of the south-western branches of the Hissar range. It is spread at the Pamir-Alay: the Chulbair and Baysuntau mountains, the Sangardak river basin (Surkhandarya region). Inhabits stony and slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



268. ЁПИРМА КАРПАК

Кузиния широкооберточная / *Cousinia platystegia* Tscherneva

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жанубида ўсувчи жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см гача етадиган қўп йиллик ўт. Поялари қўп, тик, чалкаш тукли, юқори қисмидан шохланувчи, қисқа шохларнинг учида саватчалари 2-3 тадан бўлиб, зич жойлаш-



ган. Ёпирма барглари кенг бандли, поядаги барглари бандсиз, чузиқ ёки наштасимон, четлари тишсимон тиканли, юқори томони ингичка чалкаш тукли, пастки томони оқич қалин тукли. Саватчалари цилиндрсимон. Гултожи сарик, ўрама баргларида қисқа. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг ғарбий тармоқлари, Қўхитангнинг жанубий тоғ этаклари, Шеробод водийсида тарқалган.

Ўсиш шароити. Паст тоғлардаги ола жинсларда ўсади.

Сони. 2013 йилда 120 туп ўсимлик қайд этилган.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 2. Очень редкий эндемик южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 25 см. Стеблей несколько, прямостоячие, паутинистые, на верхушке слегка ветвистые, с укороченными ветвями, несущими на концах скученные по 2-3 корзинки. Прикорневые листья с расширенными черешками; стеблевые сидячие, продолговатые или ланцетные, по краю колючезубчатые, сверху тонкопаутинистые, снизу беловойлочные. Корзинки цилиндрические. Венчики жёлтые, не выдающиеся из листочков обертки. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: западные отроги Гиссарского хребта, южные предгорья Кугитанга, Шерабадская долина.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород в низкогорьях.

Численность. В 2013 г. было зарегистрировано около 120 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение площадей пестроцветов.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф.О. Ҳасанов

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the western outskirts of the Hissar range, the southern foothills of the Kughitang range, the Sherabad valley (Surkhandarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks in low mountains. In 2013, about 120 plants were found. Limiting factors: decreasing of gypseous habitats. Measures of protection: not protected.



269. ЖИЗЗАХ КАРРАГИ

Кузница джизакская / *Cousinia dzhizakensis* Kolt.

Мақоми 3. Шимоли-ғарбий Помир-Олойга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–40 см га етадиган, ўқ илдизли, икки йиллик ўт. Понси икка каллакли шохчалардан иборат. Ёпирма барглари лирасимон, кенг бандли. Поядаги барглари чузиқ, четлари йирик тишсимон тиканли, учи ҳам йирик тиканли, устки томони чалкаш тукли, пастки томони қалли кулранг тукли. Саватчаси йирик, диаметри 2–2,5 см. Тожи ўрама баргчалардан бироз узун, пушти рангли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Навоий, Самарқанд ва Жиззах вилоятлари: Нурота, Туркистон ва Молгузар тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва пастки қисмларида тошли ва шағалли ёнбағирларда ҳамда қонларда ўсади.

Сони. Тўплари кам тупли (1 га да 20 тупгача), олис-олис жойлашган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ташқари қўп боқилиши қўпайишига салбий таъсир қилмоқда. Камёблигининг табиий сабаблари ҳам бўлса керак.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1962 йилдан бошлаб экиб келинади.

Муҳофаза чоралари. Айрим популяциялари Зомин миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [289, 321, 324, 325, 327].

Г.У Кодиров

Статус 3. Редкий эндемик Северо-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Стержнекорневая травянистый двухлетник высотой 20–40 см. Стебель с одностолбоватыми ветвями. Прикорневые листья лировидные, широко черешковые, стеблевые – продолговатые, по краю крупно-колючезубчатые, оканчиваются крупной колючкой, сверху паутинистые, снизу серо-войлочные. Корзинки крупные, 2–2,5 см в диаметре, венчики слегка выдающиеся из листочков обертки, розовые. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях; хребты Нуратау, Туркестанский и Мальгузарский.

Места обитания. Щебнистые склоны и скальные выходы в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Популяции ма-

лочисленные, с единично разбросанными растениями (до 20 экземпляров на 1 га).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный выпас скота. Вероятно, имеются и естественные причины снижения численности.

Культивирование. С 1962 г. успешно выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Часть популяций находится на территории Зааминского национального парка.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Г.У Кодиров



Rare endemic species of the north-western Pamir-Alay. It is spread at the Nuratau, the Turkestan and Malguzar ranges (Jizzakh, Samarkand and Navoi regions). Inhabits slopes and rock outcrops in the lower and middle belts of mountains. Populations are not numerous with single sparse plants (up to 20 specimens per 1 hectare). Measures of protection: some populations protected in the Zaamin national park.



270. КИНДИКЧАЛИ КАРПАК

Кузница пушчоккая / *Cousinia umbilicata* Jaz.

Мақоми 2. Қизилқумга мансуб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Поясининг бўйи 60 см гача етадиган, деярли асосидан шохланувчи, шохчалари яқка бошчали, тўп гуллари ёйик, қўп йиллик ўт. Баргларининг устки томони яшил рангли, чалкаш тукли, яўғон томирли, пастки томони кулранг, қалин тукли. Ёпирма барглари чўзиқ наштартсимон, патсимон бўлинган, бандли, бандининг асоси бироз кенгайган, оқиш, қалин тукли. Поядаги барглари бандсиэ, кенг наштартсимон, сийрак, тишсимон тиканли. Саватчаси кенг цилиндрсимон. Тожи сариқ. Уруғи деярли тўрт қиррали, кулранг. Июнь-август ойларида гуллаб, меваси август-сентябрда етилади.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: Қизилқумдаги қолдиқ тепаликлар (Қўнгиртоғ, Етимтоғ ва Оқтоғлар)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тепаликлардаги тошли, тошли-шэгалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда яқка-яқка ҳолда тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу тур алоҳида тупроқ шароитига мослашганлиги учун камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. 1964 йили ЎзР ФА Қизилқум чўл станцияси тажриба майдонида экиб ўстирилган. Ўсиб чиққан ниҳоллар шу йилнинг ўзидаёқ қуриб қолган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Эндемик Қизилқума.

Краткое описание. Многолетнее растение высотой до 60 см. Стебель почти от основания обильно ветвистый, веточки одностолчатые, собраны в раскидистое соцветие. Листья сверху зелёные, паутинистые, с выступающими жилками, снизу – сероватые. Прикорневые листья черешковые, с бело-войлочными, у основания слегка расширенными черешками, продолговато-ланцетными, перистолопастными. Стеблевые листья сидячие, широколанцетные, расставленно-колючезубчатые. Корзинки широкоцилиндрические. Венчики жёлтые. Семянки почти четырёхгранные, серые. Цветёт в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: Кызылкумы – останцевые возвышенности Кингиртау, Джетымтау и Актау.

Места обитания. Каменистые, каменисто-щебнистые склоны останцевых возвышенностей.

Численность. Встречается единичными растениями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. В 1964 г. был высеван в коллекционном питомнике Кызылкумской пустынной станции АН РУз. Всходы выпали в том же году.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [321, 324, 325, 327].

К.Ш. Тожибаев

Endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Kingirtau, the Dzhetymtau and Aktau (Bukhara and Navoi regions). Inhabits stony and gravelly slopes of remnant low mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



271. НОЗИКБОШ КАРРАК

Кузиния изящноголовая / *Cousinia glaphyrocephala* Juz. et Tschernieva

Мақоми 1. Ўзбекистоннинг жанубида кичик майдонларда ўсадиган жуда камёб эндемик ўсимлик.



Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см га етадиган кўп йиллик ўт. Поялари кўп, қалин тукли, ўрта қисмидан шоҳланувчи, шоҳлари ингичка, қисқа, яқка қаллакли. Барглариининг устки томони чалкаш тукли, пастки томони оқш қалин тукли. Ёпирма барглари қисқа бандли, патсимон бўлинган. Поядаги барглари юқорига қараб кичинлашиб боради, бандсиз, наштарсимон, асоси 1-2 жуфт тишли. Саватчаси тухумсимон, чалкаш тукли. Ўрама барглари 40 та атрофида, қиррали. Тожи ўрама баргчаларидан узун, пушти рангли. Уруғи тескари тухумсимон, силлиқ. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти; Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқлари (Сувсизтоғ, Навобулоқ)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Умумий сони ҳақида маълумотлар йўқ.
Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [310, 321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов

Статус 1. Очень редкий эндемик южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 20 см. Стебли (их несколько) тонковолочные, от середины ветвистые. Ветви тонкие, укороченные, одиоголовчатые. Листья сверху паутинистые, снизу – бело-войлочные; прикорневые – короткочерешковые, перисторассеченные; стеблевые – постепенно уменьшающиеся кверху, сидячие, ланцетные, у основания с 1-2 парами зубцов. Корзинки яйцевидные, паутинистые. Листочки обёртки (около 40) килеватые. Венчики выдающиеся, розовые. Семянки обратно-яйцевидные, гладкие. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: юго-западные отроги Гиссарского хребта – Сусьзтау (Наво-Булак).

Места обитания. Каменные горные склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [310, 321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the south-western outskirts of the Hissar range: the Susyztay (Navobulak), (Surkhandarya region). Inhabits stony mountain slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



272. ОҚИШ КАРПАК

Кузиния белесоватая / *Cousinia belosovata* Juz.

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жанубий қисмига ҳос жуда камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70 см гача етадиган қўп йиллик ўт. Пойси ётиқ-чалкаш тукли, асосидан шохланувчи, якка каллакли. Барглари чармсмон, ҳар икки томони қудрағ қалин тукли, учи қаттиқ тиканли. Ёлirma барглари қисқа бандли, чўзиқ, япроғининг четлари йирик тишли ёки бўлакли. Саватчаси тухумсимон, диаметри 2 см гача, чалкаш, қалин тукли. Ўрама баргчалари тарвақайлаган, қаттиқ, учи уч қиррали, тиканли. Тожи тўқ қизил рангли. Уруғлари доғли, деярли

Статус 2. Очень редкий вид южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 70 см. Стебель прижатоплаутистый, от основания ветвистый, одностоловчатый. Листья кожистые, с обеих сторон сероваточные, оканчивающиеся крепкими колючками. Прикорневые – короткочерешковые, продолговатые, по краю – крупнозубчатые или лопастные. Корзинки яйцевидные, до 2 см в диаметре, густоплаутистые. Листочки обёртки отогнутые, торчащие, крепкие, оканчиваются трехгранной колючкой. Венчики пурпурные. Семянки пятигранные, почти трехгранные. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Известники в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единично.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Г.М. Шерматов

Very rare species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Babatag range (Surkhondarya region). Inhabits limestones in the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.

уч қиррали. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Боботот тизмасида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги оҳақтошларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Г.М. Шерматов



273. ПАТТАНГАЧАЛИ КАРРАК

Кузница перисточешуйчатая / Cousinia pterolepida Kult.

Мақоми 3. ГАРБИЙ ТИАНЬ-ШАНГА МАНСУБ КАМЕЪ ЭНДЕМИК ЎСИМЛИК.

Қисқача тавсифи. Илдизи ёғочланувчи, қўп бошчали, пояси қўп, бўйи 35–45 см га етадиган, чалкаш қалин тукли, якка каллакчи қўп йиллик ўт. Барглари чармсимон, устки томони кулранг-яшил, чалкаш тукли, пастки томони оқш қалин тукли. Ёпирма барглари ва поянинг пастки қисмидаги баргларининг узунлиги 14–25 см, энг юқоридаги барглари тиканли бўлакларга ажралган. Саватчаси цилиндрсимон, туксиз. Урама баргчалари қўп. Тожги пушти рангли. Уруғи тескари



тухумсимон, туксиз, силлиқ. Август ойида гуллаб, меваси август-сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти; Угам тизмасидаги Курушйўл довоида, Тепарсойда тарқалган. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмида майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг қўплаб боқилиши сабабли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсиш жойлари Угам-Чотқол миллий табиат боғида жойлашган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Г.М. Шерматов

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. Корень деревянистый, многоглавный. Стебли (их несколько) высотой 35–45 см, паутинисто-войлочные, одностолбчатые. Листья кожистые, сверху серовато-зелёные, тонкопаутинистые, снизу бело-войлочные; прикорневые и нижние стеблевые листья длиной около 14–25 см и самые верхние почти колюче-лопастные. Корзинки цилиндрические, голые. Листочки обёртки многочисленные. Венчики розовые. Семянки обратнойцевидные, голые, гладкие. Цветёт в августе, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Угамский хребет, перевал Курушйол, верховья Тепарсай. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны в субальпийском поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Г.М. Шерматов

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam range, the Kurushyul passage, the Teparsay (Tashkent region). Inhabits the northern slopes in the subalpine mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



274. СИЛЛИҚТУКЛИ КАРПАК

Кузиния гладкощетиноквая / *Cousinia glabriseta* Kult.

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойнинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см гача етадиган икки йиллик ўт. Пояси йўл-йўл чизикли баргли, асосидан шохланувчи, шохлари яқка қаллакчи. Барглари чармсимон, юқори қисми чалкаш тукли, пастки томони оқш-қалин тукли, четлари йирик тишли. Поясининг ўрта ва юқори қисмидаги барглари бандсиз, юмалоқ, пойни ярим қамраб



туради. Саватчаси тухумсимон-юмалоқ, сийрак чалкаш тукли. Ўрама баргчалари нисбатан кам, тарвақайлаган, сийрак чалкаш тукли. Тожи пушти рангли, ўрама баргчалардан узунроқ, Уруги тескари тухумсимон. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмасида тарқалган. Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги шағалли ва майда жинс тупроқли ёнбағирларда учрайди.

Сони. Табиатда бу тур кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва эреалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [321, 324, 325, 327]

Ғ.М. Шерматов

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Двухлетнее травянистое растение высотой до 25 см. Стебель полосатобороздчатый, облиственный, от основания ветвистый, ветви одно-ловчатые. Листья кожистые, сверху тонкопаутиновые, снизу бело-войлочные, по краю крупнозубчатые; средние и верхние стеблевые – сидячие, округлые, полустеблеобъемлющие. Корзинки яйцевидно-шаровидные, слабопаутиновые. Листочки обертки сравнительно немногочисленные, оттопыренно торчащие, слегка паутиновые. Венчик розовый, выдающийся. Семянки обратнойцевидные. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые склоны верхнего пояса гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском заповеднике.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Kughitang range (Surkhandarya region). Inhabits stony slopes in subalpine zone. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



275. СОХТАТУКЛИ КАРПАК

Қузиния ложношерстная / *Cousinia pseudolamata* Popov ex Tscherneva

Мақоми 1. Оқтоғ тизмасининг жуда камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80 см га етадиган қўп йиллик ўт. Пояси битта, тик ўсувчи, баргли, йўғон, қалин тукли. Ёпирма барглари патсимон бўлинган, бандсиз, остки томони туксиз, устки томони безчасимон тукли, ёки ҳар икки томони қалин тукли. Тўпуллари ингичка бошоқсимон. Саватчаси қисқа бандли, йирик, тукли. Ҷрама баргчалари қўп, силлиқ. Тожи сариқ. Уруғи тескари-тухумсимон, денгли уч қиррали. Июль ойида гуллаб, меваси июль-августларда етилади.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Нурота тоғларида Оқтоғ (Лангар шаҳарчаси атрофи)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тош-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка, баъзан кичик тўплар ҳосил қилиб учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг қўплаб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [18, 289, 321, 324, 325, 327].

И.В. Белоліпов

Статус 1. Очень редкий эндемик хребта Актау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 80 см. Стебли одиночные, прямостоячие, толстые, войлочнопушенные, облиственные. Листья розеток перисторассечённые, сидячие, снизу-голые, сверху железистые, или с обеих сторон густоопушенные. Соцветия узкоколосовидные. Корзинки на коротких цветоножках, крупные, опушенные. Листочки обертки многочисленные, гладкие. Венчики жёлтые. Семянки обратнойцевидные, почти трёхгранные. Цветёт в июле, плодоносит в июле-августе.



Распространение. Навоийская область: Нуратинские горы, хребет Актау, окрестности посёлка Лангар.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны в среднем поясе гор.



Численность. Встречается единичными экземплярами, реже образует небольшие группы.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры не разработаны.

Источники. [18, 289, 321, 324, 325, 327]

И.В. Белоліпов

Very rare endemic species of the Aktau range. It is spread at the Nuratau mountains, the Aktau range, nearby the Langar village (Navoi region). Inhabits stony slopes in the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.

276. ТИК КАРПАК

Кузиния торчащая / *Cousinia stricta* Tschernyeva

Мақоми 2. Ўзбекистон жанубига ҳос жуда камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70 см гача етадиган қўп йиллик ўт. Пойлари бандсиз безчали, юқори қисми сийрак шоҳли, шоҳчалари қўп саватчали. Тўпгули рўвқсимон. Барглари чармсмон, ҳар икки томони ишил, устки томони бандсиз безчали, пастки томони жуда сийрак чалкаш тукли. Ёпирма барглари бандли, чўзиқ наштарсимон,



патсимон бўлакли. Поядаги барглари бандсиз, наштарсимон, патсимон бўлинган. Саватчаси чўзиқ цилиндрсимон. Тожки сариқ рангда. Уруғи очкулранг, қора доғли, уч қиррали, учи уч тишли. Июль-август ойларида гуллаб, меваси август-сентябрда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Боботоғда тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги очилиб қолган ола жинсларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди, фақат бир жойда маълум.

Қўпайиши. Уругидан қўпайса керак.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тур маълум тупроқ шароитида ўсишга мослашганлиги оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов

Статус 2. Очень редкий вид южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 70 см. Стебель с сидячими железками, в верхней половине рыхловатый; ветви несут многочисленные корзинки, собранные в метельчатое соцветие. Листья кожистые, с обеих сторон зелёные, сверху с сидячими железками, снизу очень незначительно-паутинистые; прикорневые листья черешковые, продолговато-ланцетные, перистораздельные; стеблевые сидячие, ланцетные, перисто-лопастные. Корзинки продолговато-цилиндрические. Венчики жёлтые. Семянки светло-серые с черными точечными пятнами, почти трёхгранные, наверху трёхзубчатые. Цветёт в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород в среднем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко, отмечен в 1 пункте.

Размножение. Видимо, семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к специфическим местам обитания.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не разработаны.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов

Very rare species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Babatag range (Surkhandarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks in the middle belt of mountains. Collected only once. Measures of protection; not protected.



277. УЗУНБАҒ ҚАРРАК

Кузиния длиннолистная / *Cousinia dolichophylla* Kult.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шаннинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 90 см гача етадиган қўп йиллик ўт. Пояси поаниқ йўл-йўл чиққан, чалқаш тукли, юқори қисми эса момик тукли. Ўпирма барглари узун бандли, чуқик наштақсимон, қўпинча йирик, узунлиги 25–30 см, кенлиги 5–8 см, чарқсимон, устки томони сийрак чалқаш тукли, яшил, пастки томони оқш қалин тукли, патсимон бўлакли, четлари тикан тишли. Поянинг пастки қисмидаги барглари ёпирма барглarga ўхшаш, ўрта қисмидаги барглари бандсиз, энг юқоридаги барглари майда, маълум оралиқда жойлашган, бандсиз, четлари бўлинган, тиканли. Саватчалари қўп, қўп гулли, қисқа бандли. Тожи оч сарғиш, ўрама баргчаларидан узун. Уруғи тескари пирамидасимон, йирик, узунлиги 7 мм гача етади. Июль–август ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Қоржонтов. Угом ва Писком тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шаронти. Тоғларнинг ўрта қисмидаги майда жинс тупроқли, шагалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда яқка-яқка ҳолда, баъзан тўп бўлиб тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликларни пичанга ўриб олиш оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсиш жойлари Угом-Чотқол миллий табиат боғида жойлашган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327]

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 90 см. Стебель неясно-полосато-бороздчатый, паутинистый, наверху почти войлочный. Прикорневые листья длинно-черешковые, продолговато-ланцетные, обычно крупные, длиной 25–30 см и шириной 5–8 см, кожистые, сверху очень незначительно-паутинистые, зелёные, снизу беловоюлочные, перистораздельные, по краю колючезубчатые; нижние стеблевые подобны прикорневым; средние такие же, но сидячие; самые верхние расставленные, сидячие, колючелопастные, мелкие. Корзинки многочисленные и многоцветковые, на укороченных ножках. Венчики бледно-желтоватые, выдающиеся. Семянки обратнопирамидальные, крупные, длиной до 7 мм. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Каржан-тау, Угамский и Пскемский хребты.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единично, реже образует небольшие группы.

Размножение. Семенное.

Причины уменьшения численности и ареала. Сенокосение.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Места произрастания расположены на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [321, 324, 325, 327].

К.Ш. Тожибаев



Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Karzhantau, the Ugam and Pskem ranges (Tashkent region). Inhabits fine earth and gravelly slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection; protected in the Ugam-Chatkal national park.



278. ХУРПАЙҒАН КАРРАК

Cousinia hoplophylla Tscherneva

Мақоми 2. Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқларида тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Г.М. Шерматов



Статус 2. Редкий эндемик юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 80 см. Стебель сероватойлоочный, в средней части обильно ветвистый, одиоголовчатый. Листья кожистые, с обеих сторон серовато-зелёные, войлочные; стеблевые листья кверху постепенно уменьшаются; нижние – сидячие или коротко-черешковые, обратноланцетные, по краю курчавые, перистораздельные. Корзинки шаровидные, 18–20 мм в диаметре, паутинистые. Листочки обёртки многочисленные, оттопыренно вверх торчащие, по спинке килеватые. Цветёт в июне-июле, плодоносит в августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: горы Чулбайр.

Места обитания. Каменистые склоны у верхней границы среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры не разработаны.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Г.М. Шерматов

Қисқача тавсифи. Бўйи 80 см га етадиган қўп йиллик ўт. Пояси қулранг қалин тукли, ўрта қисми қалин шохли, яқка каллакли. Барглари чарсимон, ҳар икки томони қулранг-яшил, қалин тукли. Поядаги барглари юқорига қараб кичрайиб боради, пастки қисмидаги барглари бандсиз ёки қисқа бандли, тескари наштәрсимон, патсимон қирқилган, четлари жингалаксимон. Саватчаси юмалоқ, диаметри 18–20 мм, чалкаш тукли. Урама баргчалари қўп, хурпайган, қиррали. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Чўлбайир тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва юқори қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Rare endemic species of south-western branches of the Hissar range. It is spread at the Chulbair mountains (Surkhondarya region). Inhabits stony slopes at the subalpine zone of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection; not protected.



279. ШУБЎАЛИ КАРПАК

Кузинея сомнительная / *Coesinia haesitabunda* Juz.

Мақоми 2. Гирбий Помир-Олойд тарқалган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см гача етадиган қўп йиллик ўт. Пояси унча чуқур бўлмаган чизиқли, чалкаш тукли, сийрак баргли. Ёпирма барглари кам, чўзиқ наштартсимон, пастки томони оқиш қалин тукли, патсимон қирқилган, четлари тикансимон тишли. Пойдаги барглари майда, бандсиз, пойни ярим қамраб туради. Саватчаси тухумсимон, диаметри 10–12 мм, туксиз. Ўрама баргчалари қўп, қаттиқ чармсимон. Тожи сариқ, Уруғи тескари тухумсимон, деврли тўрт қиррали. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Молгузар, Нурота тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги шўғалли, майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсиб турган ерларининг ўзлаштирилиши ва чорва молларининг қўплаб боқилиши унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Г.М. Шерматов

Статус 2. Очень редкий эндемик западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 50 см. Стебель неглубокобороздчатый, тонкопаутинистый, очень рыхлооблиственный. Листья в прикорневой розетке, немногочисленные, продолговатоланцетные, снизу бело-войлочные, перисторассечённые, по краю колючезубчатые; стеблевые мелкие, сидячие, полустеблеобъемлющие. Корзинки яйцевидные, 10–12 мм в диаметре, голые. Листочки обёртки многочисленные, твердокожистые. Венчик жёлтый. Семянки обратнойяйцевидные, почти четырёхгранные. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Джизакской области: Мальгузарский и Нуратинский хребты.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение территорий под сельхозугодья, чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны

не разработаны.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Г.М. Шерматов

Very rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Malguzar and Nuratau ranges (Jizzakh regions). Inhabits fine earth slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.



280. ЭГРИТИКАН КАРПАК

Қўзиния согнутоколичковая / *Cousinia campyloraphis* Tschetwewa

Мақоми 2. Ҳисор тизмасининг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–50 см га етадиган қўп йиллик ўт. Пояси тик, йўл-йўл чизикли, қалин чалкаш тукли, ўрта қисмидан шохланувчи. Барглари чармсимон, ҳар икки томони қалин тукли. Ёпирма барглари бандли, чузиқ эллипссимон, деярли бўлинган, тикан тишчали. Саватчаси кенг тухумсимон, диаметри 15–17 мм, тукли. Ўрама баргчалари қўп, қиррали, сиртидагилари пастга қараб эгилган. Тожи пушти. Уруғи кулранг. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Қашқадарё ҳавзасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Қўпзйиши. Уруғидан қўлаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор ва Китоб қўриқхоналарида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов

Статус 2. Редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. Стебли прямостоячие, полосатобороздчатые, паутинистоволоочные, высотой 30–50 см, от середины ветвистые. Листья кожистые, с обеих сторон войлочные; прикорневые – черешковые, продолговато-эллиптические, почти лопастные, колючезубчатые. Корзинки широкояйцевидные, 15–17 мм в диаметре, опушенные. Листочки обёртки многочисленные, колеватые, наружные – отогнутые. Венчик розовый. Семянки серые. Цветёт в июне–июле, плодоносит в августе–сентябре.



Распространение. Кашкадарьинская область: бассейн реки Кашкадарья.

Места обитания. Мелкоземистые склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском и Китабском государственных заповедниках.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов

Rare endemic species of the Hissar range. It is spread at the Khashkadarya river basin (Kashkadarya region). Inhabits fine earth slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Hissar and Kitab state reserves.



281. ҚИЗИЛГУЛЛИ КАРПАК

Кузиния красноплодная / *Coesinia rhodantha* Kult.

Мақоми 1. Ўзбекистоннинг жанубидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см га етадиган икки йиллик ўт. Пояси йўл-йўл чизикли, қисман чалкаш тукли. Ўрта қисмидан шохланувчи, баргли шохчалари йўл-йўл каллакли. Барглари оч яшил, устки томони туксиз, пастки томони қалин тукли, четлари йирик



тукан тишли. Ёлirma барглари бандли, патсимон бўлинган. Поядаги барглари патсимон ўйилган, бандси. Саватчалари тухумсимон-юмалоқ, чалкаш тукли, диаметри 3 см. Ўрама баргчалари кўп, қиррали. Тожи пушти, ўрама баргчаларидан қисқа. Уруғи тескари тухумсимон, оч кулранг. Июнда гуллаб, меваси июнь-июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқларида, Бойсун тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидаги қумлоқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда кам тарқалган.

Қўлайлиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълум тупроқ шароитига мослашганлиги унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [310, 321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов

Статус 1. Очень редкий эндемик южной части Узбекистана.

Краткое описание. Двухлетнее травянистое растение высотой до 25 см. Стебель полосатобороздчатый, частично паутинистый, от середины

ветвистый, ветви одностолбчатые, облиственные. Листья светло-зелёные, сверху голые, снизу войлочные, по краю крупноколючеобразные; прикорневые листья черешковые, перистораздельные, стеблевые – перисторассечённые, сидячие. Корзинки яйцевидно-шаровидные, паутинистые, до 3 см в диаметре. Листочки обёртки многочисленные, килеватые. Венчики розовые, не выдающиеся. Семянки обратнойяйцевидные, светло-серые. Цветёт в июне, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Сурхондарьинская область: юго-западные отроги Гиссарского хребта, Байсунские горы.

Места обитания. Суглинистые склоны в предгорьях.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к определенным местам обитания.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специ-

альные меры охраны не разработаны.

Источники. [310, 321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the south-western outskirts of the Hissar range, the Baysun mountains (Surkhondaryia region). Inhabits loamy slopes in foothills. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



282. СПРИГИН КАПРАГИ

Кузиния Спрыгина / *Cousinia sprygini* Kult.

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Икки йиллик ўсимлик. Пойси 20–40 см баландликда, тик, тўғри, қалин тукли, йўл-йўл, жўқли, шохлари баргли. Барглarning устки томони ингичка, тўрсимон, пастки томони кулранг, қалин тукли, четлари тикасимон тишли, тескари тухумсимон. Саватчаси шарсимон диаметри 2,5–3,5 см (учи тўмтоқ) қалин тўрсимон тукли. Ҷрама баргчалари ўткир, узун, учбурчаксимон, узунлиги 4 см, тиканли. Гул ўриннинг дағал туклари силлиқ, Гултожи оқиш-сарик, Данзқаси тескари тухумсимон, қанотчаси қорамтир доғли. Май–июнда гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқларида, Қўхитанг тизмасида ва Келиф-Шеробод тепаликларида тарқалган (Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари). Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Кулранг соз тупроқларда ўсади.

Сони. Оқтош қишлоғи атрофида 70 тупдан иборат 2 та популяцияси аниқланган.

Қўпайиши. Уругдан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиий ерларнинг бузилиши ва молларнинг қўллаб боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайд.

Манбалар. [310, 321, 324, 325, 327].

Н.Т. Очилова

Статус 1. Редкий узколокальный эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Двулетник. Стебель высотой 20–40 см, прямой, паутинистый, полосато-бороздчатый, ветви одностолчатые, облиственные. Листья сверху тонко паутинистые, снизу сероваточные, по краю колюче-зубчатые, обратнояйцевидные. Корзинки шаровидные, 2,5–3,5 см диаметре (без остроконечий).

густо паутинистые. Листочки обертки заострены в длинные, трехгранные колючки длиной до 4 см. Щетинки цветоложа гладкие. Венчики бледно-желтые. Семянки обратно яйцевидные, крылатые с темными точками. Цветет в мае–июне, плодоносит в августе.

Распространение. В Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях: юго-западные отроги Гиссарского хребта, Кугитанг, Келиф-Шерабадская гряда. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Серые глины.

Численность. 2 популяции в окрестностях кишлака Акташ (70 растений).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Разрушение естественных местообитаний и выпас скота.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [310, 321, 324, 325, 327].

Н.Т. Очилова

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the south-western branches of the Hissar range, the Kughitang, the Kelif-Sherabad range (Surkhondarya and Kashkadarya regions). Inhabits grey clays, 2 populations nearby the village Aktash (about 70 plants) were found. Measures of protection: not protected.



283. ҒУЖТУҚ КАРПАК

Кузния превосходная / Cousinia praestans Tschetseva et Vved.

Мақоми 2. Ғарбий Помир-Олойд тарқалган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м гача етадиган икки йиллик ўт. Пояси гуж-гуж тукли, йўл-йўл чизилли, баргли, асосидан тарвақайлаб шохланган. Барглари нисбатан юмшоқ тиканли, устки томони чалкаш тукли, пастки томони кулранг қилин тукли. Поянинг пастки қисмидаги барглари бандси, пояни ярим қамраб туради. пастсимон бўлакли, четлари иотекис тикансимон тишли; ўрта қисмидаги барглари бандси, бўлакли, четлари майда тикансимон тишли; юқоридагилари бандси, юмалоқроқ, четлари тикансимон тишли. Саватчалари юмалоқ, йирик, узунлиги 4 см, диаметри 3–3,5 см, қилин чалкаш тукли. Урама баргчалари қаттиқ. Тожи пушти рангли. Уруғи тескари тухумсимон, силлиқ, ялтироқ. Май-июнь ойларида гуллаб, меваси июнь-июлда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Қашқадарё сув ҳавзаси – Ҳисор тизмасининг ғарбий қисмида, Зарафшон тизмасининг жанубий ёнбағридаги Оёқчи дарё водийсида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу турнинг маълум ўсиш шароитига мослашганлиги унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Двухлетнее травянистое растение высотой до 1 м. Стебель клочковато-войлочный, полосато-бороздчатый, облиственный, от самого основания раскидисто-ветвистый. Листья сравнительно мягкие, умеренно колючие, сверху тонкопаутинистые, снизу серо-войлочные; нижние стеблевые – сидячие, полустеблеобъемлющие, перистолопастные, по краю неравномерноколючезубчатые; средние – сидячие, лопастные, по краю мелкоколючезубчатые; верхние – сидячие, почти округлые, по краю колючезубчатые. Корзинки шаровидные, крупные, длиной около 4 см и 3–3,5 см в диаметре, густопаутинистые. Листочки оберстки жесткие. Венчики розовые. Семянки обратно-яйцевидные, гладкие, блестящие. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Кашкадарьинская область: бассейн реки Кашкадарьи – западные отроги Гиссарского хребта, долина реки Аякчи на южном склоне Зеравшанского хребта.

Места обитания. Каменистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлена.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов

Very rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Kashkadarya river basin; the western outskirts of the Hissar range, the Ayakchi river valley on the southern slopes of the Zerafshan range (Kashkadarya region). Inhabits stony slopes in the middle belt of mountains. The quantity unknown. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



284. ҚОЯ КСИЛАНТЕМУМИ

Ксилантемум скальный / *Xylanthemum rupestre* (Pegov ex Nevski) Tzvelev

Мақоми 1. Қўхитанг тизмасининг камёб, стенобионт ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. 10–20 см баландликдаги яримбутача, шохлари қўнғир тусли туклар билан қопланган. Барглари кулранг-яшил, тукланган, 1–1,5 см узунликда, патсимон қирқилган. Саватчалари якка-якка, гуллари кам сонли, узунлиги 5–6 мм, эни 4–5 мм, цилиндр шаклида. Ўрама барглари тукланган, эллипс шаклида, учу тўмтоқ. Гуллари сариқ, без тукли. Уруғлари 2,5 мм узунликда. Попуклари 1,2 мм узунликда. Июлда гуллайдди, августда мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Қўхитанг тизмаси.

Ўсиш жойи. 2 600–3 000 м баландликдаги қояларда ўсади.

Сони. 2001 йилда 50 тупи қайд этилган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Реликт, петрофит эндемик.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [128, 310].

Ф.Ў Ҳасанов

Статус 1. Редкий стенобионтный эндемик Кугитанга.

Краткое описание. Полукустарничек высотой 10–20 см, с бурыми опушенными веточками. Листья серо-зеленые, опушенные, длиной 1–1,5 см, перисто-рассеченные. Корзинки одиночные, малоцветковые, длиной 5–6 мм, шириной 4–5 мм ширины. Листочки обертки опушенные, эллипти-

ческие, тупые. Цветы желтые, железистые. Семянки длиной 2,5 мм. Хохолос длиной 1,2 мм. Цветет в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: эндемик хребта Кугитанг.

Места обитания. Скалы (2 600–3 000 м).

Численность. Зарегистрировано 50 растений в 2001 году.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Реликтовый петрофильный эндемик.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [128, 310].

Ф.О. Хасанов

Very rare endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang range (Surkhondaryia region). Inhabits rocks (2 600–3 000 m.s.l.). 50 plants were found in 2001. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



285. БОБОТОҒ КЎКБОШИ

Мордовник бабатагский / *Echinops babatagensis* Tschernaeва

Мақоми 3. Ўзбекистоннинг жанубидаги кичик майдонларда тарқалган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–30 см гача етadиган қўп йиллик ўт. Пойси тик, жўякли, безчали ва момик тукли, шохланган, якка бошчали. Барглрининг устки томони безчали, пастки томони кулранг қалин тукли, йўғон томирли. Ёпирма барглари бандли, патсимон бўлинган, майда тишсимон тиканли. Пойнинг пастки ва ўрта қисмидаги барглари ёпирма барглариға ўхшаш, аммо бандсиз. Саватчаларининг узунлиги 10–20 мм. Ўрама баргчалари 28–30 та, хаворанг. Уруғи чўзиқ, қалин сариқ тукли. Июль–август ойларида гуллаб, меваси август–сентябр да етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Боботоғ тизмасида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шаронти. Тоғларнинг ўрта қисмидаги оҳақтошларда ва гипсларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўзига хос тупроқ шаронтига мослашганлиги унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [332, 333].

И.И. Мальцев



Меры охраны. Не разработаны.

Источники. [332, 333].

И.И. Мальцев

Статус 3. Очень редкий эндемик южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 20–30 см. Стебли прямостоячие, бороздчатые, железистые, с войлочным опушением, ветвистые, одностолбовчатые. Листья сверху густо железистые, снизу с резко выдающейся средней жилкой, тонкосеровойлочные. Прикорневые черешковые, перистораздельные, мелкоколючезубчатые. Нижние и средние стеблевые подобны прикорневым, но сидячие. Корзинки длиной 10–20 мм. Обёртка состоит из 28–30 голубоватых листочков. Семянки густо-жёлтоволосястые, продолговатые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Известняки и гипсы среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Babatag range (the Surkhandarya region). Inhabits lime stones and gypsies in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



286. КИСКАМУЎЙ КЎКБОШ

Мордовник коротыколисточковый / *Echinops brevipaniculatus* Tschernawa

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жанубий минтақасига хос жуда камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–60 см га етадиган қўп йиллик ўт. Пояси тик, баргли, юқори қисми шохланган, юза жуякли, оқиш қалин тукли. Барглари чармсимон, устки томони яшил, сийрак безчали, чалкаш тукли, пастки томони оқиш қалин тукли. Ёлпирма барглари йирик, четлари бутун,

лиственный, в верхней части ветвистый. Листья кожистые, сверху зелёные, рассеянно железистые, тонкопаутинистые, снизу бело-войлочные; прикорневые крупные, цельнокрайные, длинночерешковые, кожистые; стеблевые постепенно кверху уменьшающиеся, сидячие. Нижние стеблевые листья с маленькими ушками, продолговато-ланцетные. Корзинки шаровидные, около 5 см в диаметре. Обертка состоит из 16–19 гладких листочков. Венчик беловатый, глубококорассечённый, с железистой трубкой. Семянки густоволосистые. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область; хребет Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород в предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к выходам пестроцветных пород.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [332, 333].

И.И. Мальцев

узун бандли, чармсимон. Поядаги барглари юқорига қараб кичрайиб боради, бандсиз. Поянинг пастки қисмидаги барглари кичик ўсимтали, чузиқ наштарсимон. Саватчаси юмалоқ, диаметри 5 см атрофида. Ўрама баргчалари 16–19 та, силлиқ, Тожи оқиш, чуқур кесилган, найчаси безчали. Уруғи қалин тукли. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Боботог тизмасида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмидаги ва тоғ этакларидаги очик ола жинсларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Очиқлиб қолган ола жинсларда ўсганлиги учун улар чекланган майдонлардагина сақланиб қолган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [332, 333].

И.И. Мальцев

Статус 2. Очень редкий вид южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 30–60 см. Стебель прямостоячий, неглубокобороздчатый, белово́йлочный, об-

Very rare species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Babatag range (Surkhondarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks in foothills and the lower belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: stenobiont species. Measures of protection: not protected.



287. НУРОТА ЛЕПИДОЛОФАСИ

Лепидолофа нуратинская / Lepidolopha nuratavica Krasch.

Мақоми 3. Гербий Помир-Олойга хос ареали бўлиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80–100 см га етадиган асосидан шохланувчи ярим бута. Йиллик шохчалари тўғри, қалин тукли, пастки қисми баргли, юққа саватчали. Барглари қўқимтир-яшил, қисқа ётиқ тукли, нуқтасимон безчали, пояннинг пастки қисмидаги ҳамда мевасиз шохларидаги барглари қисқа бандли, уч бўлакли, пояннинг юқори қисмидаги барглари эса бандсиз. Саватчалари майда. Ҳама баргчалари цилиндрсимон, қисқа, ётиқ тукли. Гуллари сариқ, безчали. Уруғи ҳам безчали. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд, Навоий, Сурхондарё вилоятлари: Нурота ва Қўхитанг тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмидаги тошли ва шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Тўп-тўп бўлиб ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан ўтин сифатида қўп миқдорда кесиб олинishi ва чорва молларининг боқилиши оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон ва Нурота қўриқхоналарида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [12, 117, 127].

Н.Ю. Бешко

Статус 3. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая с разорванным ареалом.

Краткое описание. Полукустарник, ветвящийся от основания, высотой 80–100 см. Годовые побеги прямые, прижато-опушенные, в нижней части облиственные, с одиночными корзинками. Листья сизовато-зелёные, коротко-прижато-опушенные, точечно-железистые, нижние стеблевые и листья стерильных побегов коротко-черешковые, трёхрассечённые, выше по стеблю сидячие. Корзинки мелкие. Обертка цилиндрическая, коротко прижато опушенная. Цветки жёлтые, железистые. Семянки железистые. Цветёт в июне–июле, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Сурхандарьинской областях: Кугитанг и Нуратинский хребет.



Места обитания. Каменистые и щебнистые склоны в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Усиленная заготовка на топливо, выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском и Сурхонском заповедниках.

Источники. [12, 117, 127].

Н.Ю. Бешко

Rare endemic species of the western Pamir-Alay with reducing area. It is spread at the Kughitang and Nuratau ranges (Jizzakh, Samarkand, Navoi and Surkhondarya regions). Inhabits stony slopes in the lower and middle belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: intensive feedstock as firing, pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau and Surkhan state reserves.



288. ФЕДЧЕНКО ЛЕПИДОЛОФАСИ

Лепидолофа Федченко / *Lepidolopha fedtschenkiana* Klotting

Мақоми 3. Гарбий Ҳисор ва Қўхитанг тизмаларида ўсувчи камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см гача етадиган қўп пояли ирим бута. Барглари қалами, бутун, тукли. Саватчалари узун бандли. Гуллари сарик, безчали. Уруғи майда. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси, Сурхондарё ҳавзаси (Токчиён), Қўхитанг тизмаси (Тангидевор қишлоғи атрофи, Тарамхо булоғи атрофи ва Боғлидара)да тарқалган. Туркманистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қоя ёриқларида, тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда яқка ҳолда ва тўп-тўп бўлиб тарқалган, 100 м² майдонга 15–20 та ўсимлик тўғри келади. Умумий сони аниқланмаган.

Места обитания. Расщелины скал, каменистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. В природе встречается единичными экземплярами и популяциями, в которых на 100 м² насчитывается 15–20 растений. Общая численность не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены. Территория используется под интенсивный выпас скота.

Культивирование. С 1971 г. культивируется в Ботаническом саду АН РУз. Продолжительность жизни в культуре 3–4 года.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [12, 117, 127].

И.В. Белополов



Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқ маълумотлар йўқ. Ўсимлик тарқалган жойларда қўлаб чорва моллари боқилади.

Маданийлаштирилиши. 1971 йилдан буён ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилмоқда. Маданий шароитда у фақат 3–4 йил ўсади.

Муҳофаза чоралари. Сурхон қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [12, 117, 127].

И.В. Белополов

Статус 3. Редкий эндемик Западного Гиссара и Кугитанга.

Краткое описание. Многостебельный полукустарник высотой до 50 см. Листья линейные, цельные, опушенные. Корзинки сидят на длинных цветоносах. Цветки желтые, железистые. Семянки мелкие. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – бассейн реки Сурхандарья (Такчиан); хребет Кугитанг – окрестности кишлака Тангидувал, родника Тарамхо и Бағлидара. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Rare endemic species of the western the Hissar and Kughitang ranges. It is spread at the Hissar range: the Surkhandarya river basin (Takchiyan); the Kughitang range; nearby the village Tangiduval and the Taramkho spring (Surkhandarya region). Inhabits clefts of rocks, stony slopes in the middle belt of mountains. In nature, met with single specimens and populations (15–20 plants per 100 m²). Total number is unknown. Limiting factors: The territory is used for intensive pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



289. ВВЕДЕНСКИЙ ОЛИГОХЕТАСИ

Олигохета Введенского / *Oligochaeta vvedenskyyi* (Popov) Tschernaeva

Мақоми 3. Қизилқум ва Ўзбекистоннинг жанубий минтақасига хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Поялари жуда қисқа, асосидан шохланган, бир ёки бир нечта саватчали, бир йиллик ўт. Шохлари 7–15 см узунликда, ер бағирлаб ўсади, ётиқ жингалак-чалкаш тукли. Барглари кулранг, яшил, устки қисми ётиқ жингалак тукли. Илдизолди барглари бандли, чўзиқ тухумсимон, четлари ўйилган тишли, тиканли. Саватчаси битта ёки бир нечта, чўзиқ. Ҳрама баргчалари наштарсимон, устки қисми жингалак тукли. Тожи оқш. Уруғи 3 мм узунликда, ялтироқ. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Бухоро вилоятлари, шунингдек, Қорақалпоғистонда учрайди. Помир-Олойда – Шеробод водийси (Учқизил тепалиги) ва Жанубий Қизилқумда тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғларда ва тоғ этакларида, очилиб қолган ола жинсларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ортиқ боқилиши, пичан сифатида ўрилиши ва махсус тупроқ шароитига мослашганлиги унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [329].

М. Туляганова

Статус 3. Редкий эндемик юга Узбекистана и Кызылкума.

Краткое описание. Однолетнее травянистое растение. Стебель очень короткий, от основания ветвистый, с одной или несколькими корзинками. Ветви удлиненные, длиной 7–15 см, облиственные, стелющиеся, ребристые, прижато-курчаво-паутинистые. Листья серо-зелёные, сверху рассеянно-прижато-курчаво-волосистые. Прикорневые листья черешковые, продолговатояйцевидные, по краю выемчато-зубчатые. Корзинки одиночные или несколько, продолговатые. Листочки обёртки ланцетные, по спинке курчаво-волосистые. Венчики беловатые. Семянки длиной 3 мм, блестящие. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае.

Распространение. В Кашкадарьинской и Бухарской областях, Каракалпакстан; Памиро-Алай



– Шерабадская долина, горки Учкызыл, Южные Кызылкумы.

Места обитания. Останцы и подгорные пустыни, выходы пестроцветных пород.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Усиленный выпас скота, заготовка кормов, приуроченность к определённым местам обитания.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [329].

М. Туляганова

Rare endemic species of the southern Uzbekistan and Kyzylkum. It is spread at the Pamir-Alay: the Sherabad Valley, the Uchkyzyl hills, the southern Kyzylkum (Kashkadarya and Bukhara regions, Karakalpakstan). Inhabits low mountains and submountane deserts, outcrops of gypseous rocks. The quantity is unknown. Limiting factors: the intensive pasturing, feedstock. Measures of protection: not protected.



290. ТАРОҚСИМОН ОЛЬГЕЯ

Ольгя гребенчатая / *Olgaea pectinata* Iljin

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шаннинг камеб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30 – 70 см га етадиган қўп йиллик ўт. Поялари биттадан, йўғон. Барглари чарсимон, устки томони оч яшил, туксиз, пастки томони қалин тукли, узунчоқ ёки нащтарсимон. Ёпирма ва поянинг пастки қисмидаги барглари аста-секин барг бандига айланади. Қолган барглари бандсиз. Саватчасининг узунлиги 6–7 см, эни 4–5 см. Урама барглари қўп. Тожи тўқ қизил, узунлиги 35–50 мм. Уруғлари узунчоқ, қалами. Август ойида гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Ғарбий Тянь-Шаннинг Угом тизмасида тарқалган. Қозоғистон ва Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли-шағалли жойларда, бутазорларда ва даштларда ўсади.



Сони. Угом тизмасидан бир марта йиғилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Асосан, чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [328].

М. Тулаганова

Статус 2. Редчайший эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Травянистый многолетник высотой 30–70 см. Стебли обычно одиночные толстые. Листья кожистые, сверху – светло-зеленые, голые, снизу – беловолючные, продолговатые или ланцетные. Прикорневые и нижние стеблевые листья постепенно переходят в черешок. Остальные листья сидячие. Корзинки 6–7 см длиной, 4–5 см шириной. Листочки обертки многочисленные. Венчик 35–50 мм длиной, темно-красный. Семянки продолговато-линейные. Цветет в августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Западный Тянь-Шань: Угамский хребет. За пределами Узбекистана: Казахстан и Кыргызстан.

Места обитания. По каменисто-щебнистым склонам гор в кустарниковом поясе и сухих степях.

Численность. Собран один раз на Угамском хребте.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [328]

М. Тулаганова

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the western Tien-Shan: the Ugam range (Tashkent region). Inhabits stony slopes of mountains in the belt of shrubs and dry steppes. Once it was collected in the Ugam range. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



291. НАШТАРСИМОН СЕРРАТУЛА

Серпуха ланцетоллистная / *Serratula lancifolia* Zakirev

Мақоми 2. Гарбий Помир-Олойдаги жуда кам-ёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–30 см га етадиган қўп йиллик ўт. Пойси қўп, баргли, ингичка, туксиз, саватчасининг остигина бироз тукли, якка саватчалли. Барги чармсимон, иккала томони ҳам яшил, туксиз, четлари бутун, ўйилган ёки тишли. Илдиз-олди ва пойдаги барглари бандли, наштарсимон,

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 221, 330].

М.Б. Тиркашева

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 20–30 см. Стебли многочисленные, тонкие, голые, слегка опушенные под корзинкой, облиственные, одностолчатые. Листья тонкокожистые, с обеих сторон зелёные, голые, цельные или реже выемчатые, зубчатые. Прикорневые и нижние стеблевые листья черешковые, ланцетные; остальные – к вершине стебля постепенно уменьшающиеся, узколанцетные, сидячие. Корзинки длиной до 20 см, продолговатые. Листочки обертки многочисленные, кожистые, наверху округлые. Венчики розовые. Молодые семянки голые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе.

Распространение. В Самаркандской и Джизакской областях: Мальгузарский и Зеравшанский хребты.

Места обитания. Каменистые склоны среднего пояса гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 221, 330].

М.Б. Тиркашева



қолган барглари пой бўйлаб юқори қўтарилган сари кичиклаша боради, ингичка наштарсимон, бандсиз. Ҳама баргчалари қўп, чармсимон, учи юмалоқ. Тоғи пушти. Етилмаган уруглари туксиз. Июль–августда гуллаб, август ойида мева беради.

Тарқалиши. Самарқанд ва Жиззах вилоятлари; Молгузар ва Зарафшон тизмаларидаги тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги майда жинс тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Very rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Malguzar and Zerafshan ranges (Samarkand and Jizzakh regions). Inhabits stony slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



292. БУНҒЕ ТАКАСОҚОЛИ

Қозилең Бунге / *Scorzonera bungei* Krasch. et Lipsch.

Мақоми 2. Қизилқумдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Илдизи тугунаксимон йўғонлашган кўп йиллик ўт. Илдиз бўғизи қалин, малла тукли. Пояси 2-3 та, баъзан битта, шохланган, шохчалари лиска саватчали, тукли. Барглари юмшоқ, ҳар икки томони ётиқ тукли, четлари текис ёки эгри-бугри, Илдизолди барглари кенг наштарсимон, эни 1,5-2 см, бандли. Пондаги барглари қалами, наштарсимон, бандсиз, пойни ярим қамраб олган. Саватчаси дастлаб цилиндрсимон бўлади, кейинчалик эса тескари чўққисимон шаклга киради. Мева тукканда саватчаси пастга қараб эгилади. Ўрама баргчалари қумушранг туклар билан қопланган. Гуллари сарғиш. Уруғи 6-7 мм узунликда, оқ момиқ тукли. Апрельда гуллаб, уруғи май ойида етилади.



Тарқалиши. Қорақалпоғистон: Қизилқумда Султон Увайс тоғида тарқалган.

Ўсиш шаронти. Қолдиқ тоғларнинг қояларида ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Жуда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Муайян тупроқ шаронтига мослашганлиги сабабли кам тарқалган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [164, 186, 189].

Г.А. Серекеева

Статус 2. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. Корень клубневидно-утолщенный. Корневая шейка рыжевато-серо-шерстистая. Стебли в количестве 2-3, реже одиночные, ветвистые, ветви с одиночными корзинками, опушенные. Листья мягкие, с обеих сторон прижатоопушенные, по краю плоские и слегка волнистые. Прикорневые листья широколанцетные, шириной 1,5-2 см, с черешками; стеблевые линейно-ланцетные, сидячие, слегка стеблеобъемлющие. Корзинки в молодом состоянии цилиндрические, позже обратноконические, в период плодоношения – поникающие. Листочки обертки серебристо-опушенные. Цветки лимонно-желтые. Семянки длиной 6-7 мм, бело-шерстистые. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Каракалпакстан: Кызылкум: останцовые горы Султан-Увайсдаг.

Места обитания. Каменистые склоны и скалы останцовых гор.

Численность. В 2009 г. отмечено всего 2 растения.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к гипсам.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [164, 186, 189]

Г.А. Серекеева

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum; the Sultan-Uveysdag remnant hills (Karakalpakstan). Inhabits stony slopes and rocks of remnant hills. In 2009, 2 plants were found. Limiting factors: growing on gypseous slopes. Measures of protection: not protected.

293. БОЧАНЦЕВ ТАНАЦЕТОПСИСИ

Танацетопсис Бочанцева / *Tanacetopsis botschantzevii* (Kovalevsk.) Kovalevsk.

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жанубида жуда кичик майдонларда сақланиб қолган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–45 см орасидаги илдиз поиси йўғон, қўпбошчали қўп йиллик ўсимлик. Поиси қўп, пастки қисми сертук, камбар. Илдизолди барглариининг узунлиги 10 см, эни 2 см, узун бандли, икки қарра патсиммон бўлинган. Пойдаги барглари кичрайган ва камроқ бўлинган. Ҳар бир пойда 3–8 тагача саватча жойлашган. Саватчалар узун ва ингичка бандларда ўрнашиб, ёйиқ шингилсимон тўпгул ҳосил қилади. Ўрама баргчалари сарғиш яшил рангли, қалин ётиқ тукли. Гули сарик, қалин тукли. Июль ойида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқлари (Бойсунтоғ, Яқкабоғ дарёсининг юқори қисми)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмидаги ёнбағир ва сурилмаларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [125, 310].

Ғ.М. Шерматов

Статус 2. Очень редкий эндемик юга Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 25–45 см, с утолщённым многоглавым корневищем. Стебли многочисленные, у основания шерстистоволочные, слабо облиственные. Прикорневые листья длиной до 10 см и шириной 2 см, на довольно длинных черешках, дважды перисторассеченные. Стеблевые листья уменьшающиеся и менее рассеченные. Корзинки в количестве 3–8 на одном стебле, собранные на очень длинных тонких ножках в рыхлое кистевидное соцветие. Листочки обёртки светло-жёлто-зеленоватые, густо-войлочно-опушенные. Цветки жёлтые, густоопушенные. Цветёт и плодоносит в июле.

Распространение. В Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях: юго-западные отроги Гиссарского хребта, Байсунтау, верховья реки Яккабагдарья.

Места обитания. Склоны и осыпи в верхнем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведений нет.



Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [125, 310].

Ғ.М. Шерматов

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the south-western outskirts of the Hissar range, the Baysuntau, the Yakkabagdarya river basin (Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits slopes and mounds in the upper belt of mountains. Population is very rare. Measures of protection: protected in Hissar state reserve.



294. БУТКОВ ТРИХАНТЕМИСИ

Трихантеми Буткова / *Trichanthemis butkovii* Kovalevsk.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шаннинг жуда камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см га етадиган, йўғон, кўп бошчали, ёғочланган каудексли кўп йиллик ўт. Пояси кўп, камбаргли. Барглари қаттиқ, туксиз ёки яқка-яқка тукли, асосидан икки ёки уч карра патсимон бўлинган, бандсиз. Саватчасидаги гуллари икки хил. Тилсимон уруғчи гуллари оқ, саватча ўртасидаги гуллари аса икки жипсли, сариқ. Урама баргчалари узун сийрак тукли. Уруғи узун оқ тукли. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.



Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизмаси (Оқбулоқ дарёсининг ҳавзаси)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта ва пастки қисмларидаги қонларда ўсади.

Сони. Кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Пичан тайёрлашда бу турнинг қўшиб ўрилиши унинг қисқариб боришига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол давлат қўриқхонасида ва Уғам-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [123, 315].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 40 см с толстым деревянистым многоглавым каудексом. Стебли довольно многочисленны, слабооблиственные. Листья жесткие, голые или с единичными волосками, от самого основания дважды или почти трижды перисторассеченные, сидячие. Корзинки гетерогамные. Язычковые цветки женские, белые. Дисковые цветки обоеполые, желтые. Листочки обертки с длинными редкими волосками. Семянки опушены длинными редкими волосками. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет, бассейн реки Акбулак.

Места обитания. Скалы в среднем и нижнем поясах гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сенокосение.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [123, 315].

К.Ш. Тожибаев

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range, the Akbulak river basin (Tashkent region). Inhabits rocks in the middle and lower belts of mountains. Population is very rare. Limiting factors: hay-mowing. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.

295. АНГРЕН УГАМИЯСИ

Угамия ангреникая / *Ugamia angrenica* (Krasch.) Tzvelev

Мақоми 2. Гарбий Тянь-Шаннинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 2–8 см га етадиган яримбутача. Қўп сонли пойларидан зич жойлашиб, гиласимон чим ҳосил қилади. Барглари қўп, узунлиги 1,2 см, эни 0,6 мм гача бўлиб, зич жойлашган туклари кулранг-яшил тусга киради. Саватчалари яқка-яқка, жуда калта ва эгилган гулбандларда жойлашган. Гул баргчаларининг чети қўнғир, тўқ қўнғир ҳошили. Най гулларининг тожбарги 4–5,5 мм узунлиқта. Уруғчалари 4–5,5 мм, қўндаланг жойлашган 10–15 та қовурғали бўлиб, улардан 5 таси сертук, алоҳида ажралиб туради. Июль–августда гуллаб, меваси август–сентябрда пишди.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Курама (Арашан, Жардан довои), Чотқол (Чотқол биосфера қўриқхонаси), Пскем (Оқсарсой) тизмаларида тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон (Талас Олатоғи, Уғом–Бахмалқул тизмалари) ва Қирғизистонда (Санталаш тизмаси) тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмидаги тошли, шағалли ёнбағирликларда, гранит бўлақлари орасида, тўқилмалар атрофида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида ва Уғом–Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [13В].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкое эндемичное растение Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Полукустарничек высотой 2–8 см, с толстым корнем. Стебли многочисленные. Листья серовато-зеленые от довольно обильного опушения, многочисленные, длиной до 1,2 см и шириной 0,6 мм, на коротких черешках, продолговатые, перисто-рассеченные. Корзинки одиночные, расположенные на коротких, изогнутых ножках. Листочки их по краю с буровой, перепончатой каймой. Венчик трубчатых цветков длиной 4–5,5 мм. Семянки длиной 4–5,5 мм, с 10–15 продольными ребрами, из которых 5 выдаются обычно сильнее других, обильно волосистые. Цветет в июне–июле, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Кураминский (Арашан, перевал Джардан), Чаткальский (Чаткальский биосферный заповедник), Пскемский хребты (Аксарсай). За пределами Узбекистана: Кыргызстан (Санталашский хребет), Казахстан (Таласский Алатау, Угамский хребет – Бахмаль-Куль).

Места обитания. На каменистых и щебнистых склонах, среди обломков гранитов, на осыпях сланцев в верхнем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Нет данных.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника и Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [13В].

К.Ш. Тожибаев



Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Tashkent and Namangan regions; the Chatkal (Akbulak), the Kurama (Arashan), the Pskem (Aksarsay) ranges. Inhabits rocks and stony slopes in the upper belt of the mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.



296. БЕЖИРИМ ЮРИНЕЯ

Наголоватка стройкая / *Jurinea gracilis* Iljin

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жанубига хос эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см атрофидаги қўп йиллик ўт. Поялари қўп, асоси оқш, пахмоқ тукли, пастки қисми чалкаш ва сийрак безчали туклар билан қопланган, тик чизикли (жуякли),



шоҳчалари яқка каллакли. Барглари чуңқроқдан наштарсимонгача, четлари текис ёки сийрак тишли, ўткир, туксиз, безчали, устки томони гадирбудур. Ёлирма барглариининг япроқлари бандига қараб торайиб боради. Поядаги барглари бандсиз, поя бўйлаб пастга қараб ёпишган. Саватчаси косачасимон, туксиз ёки сийрак чалкаш тукли. Ўрама баргчалари 4–5 қаторли, яшил, ички томонидагилари қирмизи рангли. Тожи пушти рангли, саватчаниннг четидаги гуллари пастга қараб осилган, қалин безчали. Уруғи силлиқ. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари; Ҳисор тизмасининг ғарбий тармоқларида, Бойсунтоғ ва Қўхитангда тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки ва ўрта қисмларида тошли ёнбағирларда ва очилиб қолган ола жинсларда ўсади.

Сони. Жуда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўзига хос тупроқ шароитида ўсишга мослашганлиги учун кичик майдонларда сақланиб қолган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Эндемик юга Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. Стебли многочисленные, у основания шерстисто-бело-войлочные, в нижней половине паутинистые, рассеяножелезистые, продольно-бороздчатые, высотой до 50 см. Ветви одноголовчатые. Листья от продолговатых до ланцетных, цельнокрайные или с расставленными зубцами, заостренные, голые, железистые, сверху шероховатые; прикорневые – постепенно оттянутые в расширенный у основания черешок; стеблевые – сидячие, длинно и широко низбегающие. Корзинки чашевидные, голые или с отдельными паутинками. Листочки обёртки, 4–5-рядные, зелёные, внутренние – пурпурноокрашенные. Венчики розовые, краевые повислые, густо железистые. Семянки гладкие. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях; Западные отроги Гиссарского хребта, Байсунские горы, Кугитанг.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород, каменистые склоны в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к специфическим местам обитания.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the western Hissar, Baysun mountains, the Kughitang (Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits outcrops of gypsaceous rocks, stony slopes in the lower and middle belt of mountains. Population is very rare. Limiting factors; stenobiont species. Measures of protection; protected in the Surkhan state reserve.



297. ДАҒАЛБАРГ ЮРИНЕЯ

Наголоватка шероховатолустиная / *Jurinea asperifolia* Iljin

Мақоми 2. Ғарбий Помир-Олойнинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80 см га етадиган қўп йиллик ўт. Поялари қўп, тик, оддий, юққа қиррали, безчасимон тукли. Барглари яшил, устки томони бироз буришган ғадир-будур, пастки томони ингичка чалкаш тукли. Илдизолди ва поянинг пастки қисмидаги барглари бандли, лирасимон. Поянинг ўрта қисмидаги барглари пасткидаги баргларига ўхшаш, лекин бандсиз, поянинг юқорисидаги барглари майдарок, деярли бутун, қалами. Саватчаси якка, қўп гулли. Сиртки ва ўртадаги ўрама барглари наштарсимон, устки томонидагилари тўқ яшил. Тожи пушти-қирмизи, ташқи томони безчали. Уруғи тескари пирамида-



симон, силлиқ. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор ва Зарафшон тизмасининг ғарбий қисмида тарқалган (Қизилсув, Эгрисув, Тупаланг сув ҳавзалари, Тахта-Қорача довори).

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги оҳақтошли ва тошли сурилмаларда ўсади.

Сони. Кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 80 см. Стебли (их несколько) примостоячие, простые, тонкопродольноресчатые, железистоволосистые. Листья зелёные, сверху морщинистые, шероховатые; снизу тонколаустиные; прикорневые и нижние стеблевые – черешковые, лировидные; средние стеблевые – подобны нижним, но сидячие; верхние – уменьшенные, почти цельные, линейные. Корзинки одиночные, многоцветковые. Листочки обёртки наружные и средние ланцетные, в верхней части темно-зелёные. Венчики розово-пурпурные, снаружи обычно с железками. Семянки обратнопирамидальные, гладкие. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет, бассейны рек Кызылсу, Игрису, Тупаланг; Зеравшанский хребет (около перевала Тахта-Карача).

Места обитания. Известняки и каменные осыпи в среднем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the western part of the Hissar and Zerafshan ranges; the Kyzylsu, the Igrisu, the Tupalang river basins, the Takhtakaracha pass (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits limestones and stony mounds in the middle belt of mountains. Population is very rare. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



298. ЗОКИРОВ ЮРИНЕЯСИ

Навоётоватка Зокирова / Jurinea zakirovii Iljin

Мақоми 1. Нурота тоғларида тарқалган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Илдизи ёғочланувчи, қўп бошчали, қўп йиллик ўт. Поялари кам, узунлиги 50 см, оддий, тик чизикли (жуёкли), безчали, ирмидан юқориси баргсиз. Баргларикининг устки томони ғадир-будур, пастки томони қалин безчали, йўғон томирли. Ёпирма ва поянинг пастки қисмидаги барглари қисқа бандли, чуёқ, патсимон бўлинган ёки патсимон тишли. Поянинг ўрта ва юқори қисмидаги барглари бандсиз, ипроғининг пастки қисми поя бўйлаб (пастга қараб) ёпишган, четлари текис. Саватчаси қўп гулли. Урама баргчалари тўрт қиррали, сарғиш-яшил рангли. Тоғи пушти рангли, ташқи томони безчали. Уруғи тескари пирамидасимон, туксиз, силлиқ. Май ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Навоий вилоятлари: Нурота ва Оқтоғ тизмаларида тарқалган.

Ўсish шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги шағалли, майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан ва бачкисидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ташқари қўп боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Очень редкий эндемик Нуратинских гор.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. Корень деревянистый, многоглавый. Стебли малочисленные, высотой до 50 см,

простые, продольнобороздчатые, железистые, в верхней части безлистные. Листья сверху – шершавые, снизу – с сильно выдающейся центральной жилкой, густо железистые; прикорневые и нижние стеблевые – короткочерешковые, продолговатые, перистолопастные или перистозубчатые; средние и верхние стеблевые – сидячие, низбегающие, цельнокрайные. Корзинки много-



цветковые. Листочки обёртки четырёхгранные, желтовато-зелёные. Венчик розовый, снаружи железистый. Семянки обратнопирамидальные, голые, гладкие. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Джизакской и Навоийской областях: хребты Нуратау, Актау.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Very rare endemic species of the Nuratau mountains. It is spread at the Nuratau and Aktau ranges (Jizzakh and Navoi regions). Inhabits fine earth slopes in the middle belt of mountains. Population is very rare. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



299. МАРИЯ ЮРИНЕЯСИ

Наголоватка Марии / *Jurinea mariae* Pavlov

Мақоми 2. ГАРБИЙ ТИЬ-ШАННИНГ ЖУДА КАМЕЪ ЭНДЕМИК ЎСИМЛИГИ.

Қисқача тавсифи. Бўйи 45 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пойси кам, тик қиррали, гуж-гуж чалкаш тукли. Барглари буришган, майда безчали, сийрак чалкаш тукли, пастки томони кулранг,

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойи Угам-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудига туғри келади.

Манбалар. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 45 см. Стебли многочисленные, продольноребристые, клочковатопутинистые, облиственные. Листья морщинистые, мелкожелезистые, рассеянопаутинистые, снизу сероватые, тонкопаутинистые, железистые; прикорневые и нижние стеблевые короткочерешковые, в нижней половине крупнозубчатые или лопастные; средние стеблевые подобны прикорневым, но сидячие; верхние – уменьшенные. Листочки-обертки прижатые, ланцетные, обычно все пурпурно окрашенные. Венчики пурпурно-розовые. Семянки обратнопирамидальные, гладкие. Цветёт и плодоносит в июле-августе.

Распространение. Ташкентская область: Пскемский хребет, посёлок Нанай. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Каменные осыпи в верхнем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев



ингичка, чалкаш тукли ва безчали. Ёпирма барглари ва поянинг пастки қисмидаги барглари қисқа бандли, япроқлари ярмигача йирик тишли ёки бўлакли. Поянинг ўрта қисмидаги барглари ёпирма барглarga ўхшаш, бандсиз, юқоридагилари майдароқ. Ўрама баргчалари саватчага ёпишган, наштагсимон, қирмизи рангли. Тожи қирмизилушги рангли. Уруги тескари пирамидасимон, силлиқ. Июль-август ойларида гуллаб, уруг беради.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Писком тизмаси (Нанай қишлоғи атрофи)да тарқалган. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги тошли сурилмаларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уругидан қўпаяди.

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Pskem range, nearby Nanai (Tashkent region). Inhabits stony slopes in the subalpine zone. The quantity is unknown. Measures of protection; protected in the Ugam-Chatkal national park.



300. САНГАРДАК ЮРИНЕЯСИ

Наголоватка сангардакская / *Jurinea sangardensis* Iljin

Мақоми 1. Ҳисор тизмасидаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80 см гача етадиган қўп йиллик ўт. Пойлари камроқ, тик, якка бошчали, тик чизиқли (жуёқли), сийрак безчали. Баргларининг устки томони ишил, бироз ғадир-будур, пастки томони кулранг, чалкаш тукли. Ёпирма ва поянинг пастки қисмидаги барглари бандли, қолганлари бандсиз, ипроғининг пастки қисми пояга ёпишган, тоқ патсимон, энг юқоридаги барглари илсимон. Саватчаси цилиндрсимон. Ҷурама баргчалари саватчага ёпишган, йўғон томирли. Тожи қирмизи-пушти рангли. Уруғи тескари пирамидасимон, туксиз, силлиқ. Июнда гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари: Ҳисор тизмасидаги Қизилсув, Сангардак ва Тупаланг дарёлари ҳавзаларида ҳамда Байсун тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги ёнбағирларда майда жинс тупроқларда, арчазорларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Очень редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 80 см. Стебли немногочисленные, прямостоячие, одностолчатые, продольно полосатобороздчатые, рассеянножелезистые. Листья сверху зелёные, слегка шероховатые, снизу – сероватые, тонкопаутинистые; прикорневые и нижние стеблевые – черешковые, остальные стеблевые – сидячие, низбегающие, непарно перисторассеченные, самые верхние – нитевидные. Корзинки цилиндрические. Листочки обертки прижатые, с выступающими жилками. Венчики пурпурно-розовые. Семянки обратнопирамидальные, голые, гладкие. Цветёт в июне, плодоносит в июле-августе.

Распространение. В Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях: Гиссарский хребет, бассейн рек Кызылсу, Сангардак и Тупаланг, Байсунские горы.

Места обитания. Мелкоземистые склоны среднего пояса гор, арчовники.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском заповеднике.

Источники. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Very rare endemic species of the Hissar range. It is spread at the Hissar range, the Kyzylsu, the Sangardak and Tupalang river basins, the Baysun mountains (Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits fine earth slopes in the middle belt of mountains, juniper stands. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Hissar state nature reserve.



301. ҚУМЧИЛ ЮРИНЕЯ

Halimolobos psammophila / *Jurinea psammophila* Iljin

Мақоми 3. Қизилқумдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см гача етадиган қўп йиллик ўт. Пояси тик, қўп, қулранг чалкаш тукли, йўл-йўл жўякли, новдалари якка бошчали. Баргларининг ҳар икки томони қулранг-яшил, тукли, пастки томони қалин чалкаш тукли. Ёпирма ва поянинг пастки қисмидаги барглари бандли, патсимон бўлинган ёки патсимон ажралган. Поядаги бошқа барглари бандсиз, асоси пояга ёпишган, энг юқоридаги барглари қалами, бандсиз, четлари бутун, учи ўткир. Саватчаси қалин қулранг ётиқ тукли. Ўрама баргчалари саватчага ёпишган, наштагисмон четлари гадир-будур. Тожи қирмизи пушти рангли, ташқи томони безчали. Уруғи тик жўякли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Навоий ва Бухоро вилоятлари; Қизилқумда Оқтоғ, Олтинтоғ, Қўлжуктоғ этакларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғларнинг пастки қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг қўлаб боқилиши ва ўтларнинг ўриб олиниши оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев

Статус 3. Очень редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 50 см. Стебли прямостоячие, многочисленные, серовато-паутинистые, полосато-бороздчатые, одноголовчатые. Листья серо-зелёные с обеих сторон (но снизу гуще), паутинисто опушенные; прикорневые и нижние стеблевые – черешковые, обычно перистораздельные или даже перисторассеченные; стеблевые – сидячие, низбегающие; самые верхние линейные, сидячие,

цельные, заостренные. Корзинки прижато-серо-войлочные. Листочки обёртки плотно прижатые, ланцетные, по краю мелко-шероховатые. Венчики пурпурно-розовые, снаружи железистые. Семянки продольнобороздчатые. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение.

В Навоийской и Бухарской областях: Кызылкумы – подножия гор Актау, Алтынтау, Кульджуктау.

Места обитания. Каменистые склоны подножия останцовых гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота и заготовка кормов.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев



Very rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Aktau, the Altyntau, the Kuljuktai mountains (Navoi and Bukhara regions). Inhabits stony slopes of foothills of remnant mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: intensive overpasturing and feedstock. Measures of protection: not protected.

302. МАЙДАГУЛТОЖБАРГЛИ ЭРИГЕРАН

Мелкоцветный триморфообразный / *Erigeron trimorphopsis* Botsch.

Мақоми 2. Чотқол тизмасидаги ғоят камёб ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–35 см гача етadиган кўп йиллик ўт. Пояси кўп. Епирма барглари-нинг узунлиги 2,5–11,5 см, эни 6–9 мм, тескари наштарсимон. Ўрама баргчалари қалами, нашттарсимон. Саватчасининг узунлиги 0,9–1,3 см. Гули пушти ёки бинафша рангли. Уруғи узунчоқ нашттарсимон, дағал, тукли. Июль ойида гуллаб, меваси август–сентябрь ойларида етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти; Чотқол тизмасида – Куксувда тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Қирғизистонда учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғ минтақасининг юқори қисмидаги ўтлоқларда ўсади.

Сони. Табиғатда жуда кам тарқалган, фақат бир ҳудуддагина аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ортиқ боқилиши натижасида камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсиш жойлари Угам-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида жойлашган.

Мавбалар. [159, 295].

М. Тулаганова

Статус 2. Редчайший эндемик Чаткальского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 15–35 см высотой. Корневище короткое, разветвленное. Стебли (их несколько) прямые, облиственные. Прикорневые листья 2,5–11,5 см длиной, 6–9 мм шириной, обратноланцетные, на длинных черешках. Корзинка длиной 0,9–1,3 см, листочки-обертки линейно-ланцетные. Цветки лиловые или розовые. Семянки продолговато-ланцетные, опушены жестковатыми волосками. Цветет в июле, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Ташкентская область; Чаткальский хребет – Куксу. За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. На субальпийских лугах в верхнем поясе гор.

Численность. Известен из одного пункта.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [159, 295].

М. Тулаганова

Rare species of the Chatkal range. It is spread at the Chatkal range: Kuksu (Tashkent region). Inhabits subalpine meadows in the upper belt of mountains. Collected in one location. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



303. КРАШЕНИННИКОВ ВИКОАСИ

Викоа Крашенинникова / *Vicoa krascheninnikovii* Kamelin

Мақоми 3. Помир-Олой, Нурота тоғлари, Оқтоғ тизмасининг камайиб бораётган эндемик ўсимлиги.

Қискача тавсифи. Бўйи 5 – 8 см бўлган, полларининг асоси сертук, бир бошчали, қўп йиллик сербарг ўсимлик. Барглари бандсиз, эллипсимон, узунлиги 9–11 мм. Саватчасининг узунлиги 8–10 мм, диаметри 8 мм гача. Ҳрама барглари қўп қаторли, баргчалари ингичка, эллипс шаклида,

липтические, бахромчатые. Все цветки трубчатые, светло-желтые, голые. Семянки длиной около 2 мм, густо-прижато-волосистые, хохолок длиной 6–7 мм. Щетинок 20–25. Цветёт и плодоносит в июне–августе.

Распространение. Навоийская область: горы Актау.

Места обитания. Трещины скал.

Численность. Не установлена.



ташки баргларининг чети қалинроқ (терисимон), ичкиларининг чети эса қалин, пардасимон, по-пукли. Гуллари найсимон, очсариқ тусли, туксиз. Пистасининг узунлиги 2 мм, қалин ётиқ тукли. Июнь–август ойларида гуллаб, уруғ ҳосил қилади.

Тарқалиши. Навоий вилоятининг Оқтоғ тоғида тарқалган.

Ўсиш шаронти. Қояларнинг ораларида, ёриқларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқ маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [110, 159].

Н.Ф. Русанов

Статус 3. Узкий эндемик Нуратинских гор, хребет Актау.

Краткое описание. Многолетнее растение высотой 5–8 см, с одноголовчатыми стеблями. Листья эллиптические, длиной 9–11 мм. Корзинки длиной 8–10 мм, до 8 мм в диаметре. Обвертки многорядные, листочки околоцветника узкоэ-

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [110, 159].

Н.Ф. Русанов

Rare endemic species of the Aktau range. It is spread at the Aktau range (Navoi region). Inhabits rocks. The quantity is unknown. Limiting factors: unknown. Measures of protection: not protected.



304. ТУКСИЗ КАРҒАТИРНОҚ

Коелпиния голоплодная / *Koelipinka telocarpa* Popov

Мақоми 2. Ғарбий Ҳисордаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–25 см оранжиди-даги бир йиллик ўт. Пояси пастки қисмидан шохланган, ғуборли ёки туксиз, баргли. Барглари ипсимон. Саватчалари узун, ингичка гулпойларда ўрнашган. Гуллари сариқ. Ташқи ўрама барглари қалами-бигизсимон. Уруғи сал эгилган, учига қараб торайиб боради, узунлиги 12–13 мм. Апрельда гуллаб, меvasи май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмасининг ғарбий қисмидаги Яккабоғ дарёсининг юқори қисмида, Тошқўрғон қишлоғи теваракларида ҳамда Гузор тоғи этакларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидан то ўрта қисмигача бўлган гипсли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Жуда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ортиқ боқилиши натижасида камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [126, 159].

Н.Ф. Русанов

Статус 2. Редкий эндемик Западного Гиссара.

Краткое описание. Однолетник высотой 15–25 см. Стебель от самого основания разветвленный, с тонким налётом или голый, облиственный. Листья нитевидные. Корзинка на длинных тонких цветоносах. Цветки жёлтые. Наружные листочки обёртки линейно-шиловидные. Семянки слегка согнутые, к верхушке сужающиеся, длиной 12–13 мм. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Кашкадарьинская область: западные отроги Гиссарского хребта – верховья реки Яккабагдарья, окрестности кишлака Ташкуртан, предгорья горы Гузар.

Места обитания. Гипсированные склоны от предгорий до среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [126, 159].

Н.Ф. Русанов

Rare endemic species of the western Hissar range. It is spread at the western outskirts of the Hissar range: the Yakkabagdarya, nearby the villages Tashkurgan and Guzar (Kashkadarya region). Inhabits gypseous slopes from foothills to the middle belt of the mountains. Population is very rare. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



305. НУРОТА ЎЛМАСЎТИ

Бессмертник нуратавский / *Helichrysum nuratavicum* Krasch.

Мақоми 2. Нурота тоғларида ўсувчи камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўт ўсимлик. бўйи 10–20 см, наштарсимон тукли. Мевасиз поялари билан чим ҳосил қилади. Поялари кўп эмас, оддий, тик ёки ёнбошлаб ўсади. Барглари бандсиз, навбат билан ўрнашган, қалами, узунлиги 1,5–2,5 см, эни 1–2 мм. Саватчасимон ёки ингичка кўнгироқсимон, 2–6 тадан тигиз бошчасимон қалқон тўпгулда ўрнашган. Урама барглари 5–8 қатор, кетма-кет ва тигиз ўрнашган, ташқари қаватдагилари қалин тукли. Гуллари сариқ. Июнь–июлда гуллаб, меваси июль–август ойларида етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Навоий ва Самарқанд вилоятлари: Нурота ва Оқтоғ тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. 1 200–2 000 м баландликда тоғларнинг пастки ва ўрта қисмидаги тошли-чақиртошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Сийрак ҳолда учрайди. Якка-якка ҳолда ва кичик гуруҳлар ташкил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлиkning йиғиб олиниши ва чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат кўрик-ҳонасида муҳофаза қилинади. Популяцияларини назорат қилиш керак.

Манбалар. [18, 113, 203, 289].

Н.Ф. Русанов

Статус 2. Редкий эндемик Нуратау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 10–25 см, покрытое густым войлочным опушением. Листья сидячие, очередные, линейные, 1,5–2,5 см длиной и 1–2 мм шириной. Корзинки мелкие, 4–5 мм длиной и 3–4 мм шириной, обратноконические или узко-колокольчатые, в числе 2–6, собраны в плотный головчатый щиток. Листочки обертки 5–8-рядные, плотно черепитчато расположенные, наружные по спинке, густо-путиново-опушенные. Цветки желтые. Цветет в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Жиззакской, Навоийской и Самаркандской областях: хребты Нуратау и Актау.

Места обитания. Произрастает на каменисто-щебнистых склонах нижнего и среднего пояса гор (1 200–2 000 м).

Численность. Встречается спорадически, не большими популяциями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор растений и чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нуратинского государственного заповедника.

Источники. [18, 113, 203, 289].

Н.Ф. Русанов



Rare endemic species of the Nuratau mountains. It is spread at the Nuratau and Aktau ranges (Jizzakh, Navoi and Samarkand regions). Inhabits stony slopes (1 200–2 000 m.s.l.). The quantity is unknown. Limiting factors: collecting of plants and pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



ҚУНҒИРОҚГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ – SAMBRANULACEAE

306. УЛУҒВОР КЎЗАГУЛ

Островская величественная / *Ostrowskia magnifica* Regel

Мақоми 1. Марказий Осиёнинг камёб, реликт ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 170 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси говак, тик. Барглари ҳалқа ҳосил қилиб ўрнашган, тухумсимон, чузикрок, йирик тишли, кўкимтир. Косачалари ингичка қалами-наштарсимон бўлакли, узунлиги 5 см гача. Тожи оч бинафша рангли, баъзан оқ, узунлиги 8–10 см, бўлаклари тухумсимон, найчасидан қисқа. Меваси кўсакчасимон. Уруғи чузик тухумсимон. Май-июнь ойларида гуллаб, меваси июнь-июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси (Тупаланг ва Шарғун дарёларининг ҳавзалари)да тарқалган. Тожикистонда, Қозоғистонда ва Шинмолий Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги йирик тошли сурилмаларда, қонларнинг сояларида ҳамда зарангзорларнинг чеккаларида ўсади.

Сони. Табиатда тўп-тўп (50 туп атрофида) бўлиб тарқалган. Умумий сони 30 000 тупдан ошмайди.

Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари ва илдизларининг йиғиб олинishi ҳамда уруғ маҳсулдорлигининг пастлиги натижасида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Марказий Осиё республикалари ва чет эл ботаника боғларида муваффақиятли ўстирилмоқда. Уруғидан экилганда, 4–5-йил гуллайди.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [156–159, 303].

У.Х. Қодиров

Статус 1. Редкий реликт Центральной Азии.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 170 см. Стебель голый, прямой. Листья в мутовках, яйцевидные, продолговатые, крупно-зубчатые, сизоватые. Чашечка с узколинейно-ланцетными долями, длиной до 5 см. Венчик грязновато-сиреневый, реже – белый, длиной 8–10 см с яйцевидными лопастями, намного короче трубки венчика. Плод – коробочка. Семена яйцевидно-продолговатые. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – бассейн реки Тупаланг и Шарғун. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Казахстан, Северный Афганистан.

Места обитания. Крупнообломочные осыпи, в тени скал, опушки кленовых лесов в среднем поясе гор.

Численность. Встречается спорадически небольшими (не более 50 растений) группами. Общая численность не превышает 30 тысяч растений.

Размножение. Семенное.



Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов, выкапывание клубней и низкая семенная продуктивность.

Культивирование. Успешно культивируется в ботанических садах Центральной Азии и за рубежом. При выращивании из семян зацветает на 4–5 году жизни.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [156–159, 303].

У.Х. Қодиров

Rare relict species of Middle Asia. It is spread at the Hisar range: the Tupalang and Shargun rivers basins (Surkhandarya regions). Inhabits large-disintegrated rock mounds, in the shadow of trees, edges of maple forests in the middle of mountainous zone. Small groups can be found sporadically (up to 50 plants). Total number does not exceed 30 thousand specimens.

Limiting factors: picking of flowers, digging up of bulbs and low seed productivity. Measures of protection: not protected.



ҚУМСЎТАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ЦИНОМОРНИЕВЫЕ –
CYNOMORIACEAE

307. ЖУНГОР ҚУМСЎТАСИ, ЦИНОМОРИЙСИ

Циноморий джунгарский / *Cynomorium songaricum* Rupr.**Мақоми 2.** Ўзбекистон учун камёб тур.**Қисқача тавсифи.** Қизил-бинафша рангли текинхўр ўсимлик. Бўйи 7-20 см, йўғонлиги 1.5-3 см, учбурчак тангачалар билан қопланган, узунлиги 3-5 мм. Тўпгули жуда тигиз, тўғнағичсимон, цилиндрсимон. Гуллари зич жойлашган. Гулкўрғон бўлакларининг узунлиги 2-4 мм. Чангчисининг чангдони билан узунлиги 2.5 мм, уруғчисиники 2-3 мм. Меваси шарсимон, эни 1.25-1.5 мм. Май-июнда гуллайди ва мева тугади.**Тарқалиши.** Сурхондарё вилояти, Қорақалпоғистон: Кўхитангнинг тоғолди қисмлари ва Уstyurtда тарқалган. Ўзбекистондан ташқари, Туркменистон, Тожикистон, Эрон, Афғонистон ва Мўғулистонда ҳам ўсади.**Ўсиш шароити.** Қумли ва ола жинсли тупроқларда ўсади.**Сони.** 2009 йили Шўроб атрофида 10 туп, Келиф-Шеробод тепаликларида 12 туп борлиги аниқланган.**Қўпайиши.** Уруғидан қўпаяди.**Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари.** Аниқланмаган.**Маданийлаштирилиши.** Маълумотлар йўқ.**Муҳофаза чоралари.** Муҳофаза қилинмайди.**Манбалар.** [134, 159].

Ф.Ў. Ҳасанов

Распространение. Сурхандарьинская область: предгорья Кугитанга, Каракалпакстан: плато Уstyurt. За пределами Узбекистана: Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Иран, Афганистан, Монголия.**Места обитания.** Песчаные почвы и пестрцовцы.**Численность.** В 2009 году зарегистрировано 10 растений в окрестности кишлака Шуроб, 12 – на Келиф-Шерабадской гряде.**Размножение.** Семенное.**Причины изменения численности и ареала.** Не установлены.**Культивирование.** Нет сведений.**Меры охраны.** Не охраняется.**Источники.** [134, 159].

Ф.О. Хасанов

Rare species in Uzbekistan. It is spread at the Kughitang range, the Ustyurt Plateau (Surkhandarya region, Karakalpakstan). Inhabits sands and gypseous slopes. 10 plants were found in 2009, nearby the village Shurub, 12 – on the Kelif-Sherabad range. Measures of protection: not protected.

**Статус 2.** Редкий для Узбекистана вид.**Краткое описание.** Пурпурно-фиолетовое паразитическое растение (на корнях *Salsola dendroides*). Стебель высотой 7-20 см, толщиной 1.5-3 см, покрытый прижатыми треугольными чешуйками длиной 3-5 мм. Соцветие очень плотное, булабовидное, цилиндрическое. Цветы тесно расположенные, не выдающиеся. Листочки околоцветника длиной 2-4 мм. Тычинки с пыльниками длиной 2.5 мм. Пестик длиной 2-3 мм. Плод шаровидный 1.25-1.5 мм в диаметре. Цветет и плодоносит в мае-июне.

ҲОВЗАБОНДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО БУРАЧНИКОВЫЕ - BORAGINACEAE

308. МАЙДА МОВИЙГУЛ

Lappula parvula Nabiev et Zakirov

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг шимолида тарқалган, ареали қисқариб бораётган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10-15 см, пояси оддий ёки бироз шохланган бир йиллик ўт. Барглари учли наштасимон ёки чўзиқроқ нишли, дағал туклар билан қопланган, асосан, поясининг пастки қисмида жойлашган. Тўпгули сийрак мевали, 2-3 см узунликда, мева банди узунроқ (пасткилари 1.5 см гача боради), асосан, пастга қайрилган. Косачаси 1-2 мм узунликда. Тожбарги қўқ, 2-3 мм узунликда, эгилган қисми нозик қўнғирқосимон. Меваси пирамида шаклидаги 2.5-3 мм ли ёнгоқчалардан иборат. Ёнгоқчаларидан 1 мм қўтарилиб турувчи устунчалари бор. Апрельда гуллаб, май ойида мевалайди.

Тарқалиши. Қорақалпоғистондаги Султон Увайс тоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларида, қумлоқ тупроқларда ўсади.

Сони. Жуда камёб, кичик-кичик тўплари онда-сонда учрайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг муттасил боқилиши ўсимлик қўпайишига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [24, 201, 209, 246].

О.Қ. Ҳожиматов

Статус 2. Эндемик Северного Узбекистана с сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Однолетнее растение с простым или слабоветвистым стеблем, высотой до 10-15 см. Ланцетные или продолговато-ланцетные волосисто-щетинистые листья сосредоточены в основном в нижней части стебля. Плодущие завитки рыхлоплодные, длиной 2-3 см, плодоножки удлинённые (нижние достигают 1.5 см), отклонённые, часто дуговато вниз отогнутые. Чашечка длиной 1-2 мм. Венчик синий, длиной 2-3 мм, с узким колокольчатым отгибом. Плоды - орешки пирамидальные, длиной 2.5-3 мм, яйцевидно-продолговатые, с продолговатым диском. Столбик поднимается на 1 мм над верхушками орешков. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Каракалпакстан: горы Султан-Увайс.

Места обитания. Супесчаные почвы в предгорьях останцовых гор.

Численность. Очень редок, встречается спорадически небольшими популяциями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [24, 201, 209, 246].

О.Қ. Ҳожиматов

Endemic species of the northern Uzbekistan with the reducing area. It is spread at the Sultan-Uizdag mountains (Karakalpakstan). Inhabits sandy loam in foothills of remnant mountains. Very rare, small populations can be found sporadically. Limiting factors: intensive pasturing. Measures of protection: not protected.



309. НУРОТА МОВИЙГУЛИ

Липучка нуративская / *Lappula nurativica* Nabiev et Zakirov

Мақоми 2. Нурота тоғида учрайдиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–40 см, бир йиллик ўт. Илдизолди барглари қўп ва қалин, кенг наштарсимон, узунлиги 3–6 см, эни 3–5 мм, чизилган поясининг узунлиги 1,5 см, қулранг тукли. Мевалаётган гажак тўнгули 10–15 см узунликда, рўвасимон зич жойлашган. Мева банди тўғри ёки бироз орқага қайрилган, 2–3 мм узунликда. Мевалардаги тўмтоқ косача бўлаклари мева асосига ёпишган. Гултожи ҳаворанг. Ёнғоқчаси тез ўқиқувчан, қўзқроқ, гардишида майда тиканли бўғтмачалари бор. Устунчаси пишиб етилган ёнғоқчалар орасида бутунлай қўринмайди. Июнь–июль ойларида гуллайди ва мевалайди.



Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмида тошли-шағалли ёнбағирларда ва қояларда ўсади.

Сони. Жуда кам миқдордаги тўплари бири-биридан узоқ бўлган кичик майдонларни эгаллайди.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг муттасил боқилиши ўсимлик қўпайишига салбий таъсир кўрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Нурота давлат қўриқхонасида ўсади.

Манбалар. [24, 201, 209, 246].

Н.Ю. Бешко

Статус 2. Узкий эндемик хребта Нуратау.

Краткое описание. Однолетнее растение, высотой 30–40 см. Листья прикорневые в густой розетке, широколанцетные, длиной 3–6 см, шириной 3–5 мм, стеблевые линейные, длиной 1,5 см, сероволосистые. Плодущие завитки длиной 10–15 см, густые, метельчато расположенные. Плодоножка длиной 2–3 мм, прямая или слегка отогнутая. Доли чашечки на плодах прижаты к основанию плода, тупые, венчик голубой. Орешки быстро опадающие, продолговатые. Диск усеян мелкими шиповатыми бугорками. Столбик скрыт между свободными верхушками орешков. Цветёт и плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях: хребет Нуратау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны и скалы в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается редко, спорадически, единичными экземплярами или небольшими группами по несколько растений. Локальные популяции занимают очень малую площадь и удалены друг от друга.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [24, 201, 209, 246].

Н.Ю. Бешко

Endemic species of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau range (Jizzakh, Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony and gravelly slopes and rocks in the lower and middle belts of mountains. Single specimens or small populations occur sporadically. Limiting factors: intensive pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



310. ОҚТОҒ МОВИЙГУЛИ

Ливучка актавская / *Lappula aktaviensis* Popov et Zakirov

Мақоми 1. Қизилқумдаги қолдиқ тоғларда ўсадиган эндемик ўсимлик.

Қисқача таъсифи. Бўйи 30 см, тик ўсувчи, поясининг юқори қисми рўваксимон шохланган икки йиллик ўт. Илдизолди барглари кенг кураксимон, уруғлаш вақтида қуриб қолади. Поядаги барглари кенг чизикли, пояси каби кулранг дағал туклар билан қопланган. Мевалаётган ғажак тўпгули зич рўваксимон, 3–5 см узунликда, мева банди ва косачаси кулранг. Гули ҳаворанг, қайрилма қисми ясси. Ёнғоқчаси чўзиқ, 2,5–3 мм узунликда, усти майда тиканли бўртмалар билан қопланган. Устунчаси деярли кўринмайди. Гинофори (уруғдони) очиқ ҳолда кўриниб туради. Апрель ва май ойларида гуллаб мева беради.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Қизилқумдаги Оқтоғ ва Бўкантоғ қолдиқ тоғларида учрайди.

Ўсиш шароити. Тошли-шағалли ёнбағирлардаги қоятошлар орасида ва ола тусли асосий тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг муттасил боқилиши ўсимлик сонининг қўпайишига салбий таъсир кўрсатади.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [24, 201, 209, 246].

О.Қ. Ҳожиматов

Статус 1. Узколокальный эндемик останцовых гор Кызылкума.

Краткое описание. Двулетнее растение с прямостоячим, вверх метельчато-ветвистым стеблем, высотой до 30 см. Прикорневые листья широколопатчатые, к плодоношению засыхающие, стеблевые широколинейные, серые, как и стебель, от щетинистого опушения. Плодущие завитки метельчатые, густые, длиной 3–5 см, плодоножка и чашечка серо-пушистые. Венчик голубой с плоским отгибом. Орешки длиной 2,5–3 мм, продолговатые, усеяны мелкими шиповатыми бугорками. Столбик еле заметен, гинофор открытый. Цветёт и плодоносит в апреле–мае.

Распространение. Навоийская область: Кызылкум – останцовые горы Актау и Букантау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны, скалистые и пестроцветные выходы коренных пород.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [24, 201, 209, 246].

О.К. Хожиматов

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the low mountains Aktau and Bukantau (Navoi region). Inhabits stony slopes, gypseous outcrops of bed-rocks. The quantity is unknown. Limiting factors: intensive pasturing. Measures of protection: not protected.



311. ЙИРИК ҲАЛҚАГУЛЛИ ТАНГАБАРИ

Rindera крупноцветковая / Rindera forficata Pazil

Мақоми 2. Гирбий Тинь-Шаннинг ўта камёб эндемик тури.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60 см, поясининг юқори қисми тарвақайлаб шохланган қўп йиллик ўт. Пойдаги барглари бандсиз, 4–9 мм узунликда, четлари ва уч қисми сийрак киприксимон тукли. Тўпгули ғовак-рўваксимон, гулли шохчалари қисқа, юқори қисмидаги зич ғажак гули сертук, гулбанди 5–7 мм узунликда. Косачаси чалкаш тукли, қиррали пирпираклари тожнайчасидан калта. Гули сарғиш-ҳаворанг, 13–16 мм узунликда, найчаси сарғиш 7–10 мм узунликда, тож бўлаклари тўғри, ҷузиқ қизилқили. Устунчаси узун, сершоҳ. Ёнғоқчаси тухумсимон, ғардиши силлиқ, туксиз. Ён қирралари майда тишли, учида ланғарсимон тиканчалари бор. Май-июнь ойларида гуллайдиган мевалайди.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизмасида Сўқоқ дарёси водийсида (Мискансай); Қурама тизмасида Тўқмоқ доғони, Абжас сойининг юқори қисмида; Уғам тизмасида, Майдонтол дарёси ҳавзасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қоятош ёриқларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг муттасил боқилиши ўсимликнинг қўпайишига салбий таъсир этган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсимлик ўсаётган жойлар Уғам-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида қўриқланади.

Манбалар. [175, 211].

О.Қ. Ҳожиматов

Статус 2. Узколокальный эндемик Западного Тинь-Шани.

Краткое описание. Многолетнее, в верхней части располыренно-ветвящееся растение, высотой 60 см. Стеблевые листья сидячие, длиной 4–9 мм, по краю и на вершине рыхлореснитчатые. Соцветие рыхлометельчатое. Цветущие ветви короткие, в верхней части с густыми завитками, паутинисто-опушенные. Цветоножка длиной 5–7 мм. Чашечка паутинисто-войлочная, с ланцетными лопастями, короче трубки венчика. Венчик желтовато-голубоватый, длиной 13–16 мм с желтоватой трубкой длиной 7–10 мм, лопасти венчика прямые, продолговато-линейные. Столбик длинноветвистый. Орешки яйцевидные: диск голый, гладкий; крыло по краю мелкозубчатое с якорными шипиками на зубчиках. Цветёт и плодоносит в мае–июне.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет – долина реки Сукок (Мискансай); Кураминский хребет – перевал Токмак, верховья реки Абжасай; Угамский хребет – выше устья реки Майдангал.

Места обитания. Расщелины скал в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Часть популяций произрастает на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [175, 211].

О.Қ. Ҳожиматов

Endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range: the Sukok river valley (Miskansay); the Kurama range: the Tokmak pass, Abdzhasay, the Ugam Range; Maldantal (Tashkent region). Inhabits clefts of rocks in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: some populations protected in the Ugam-Chatkal national park.



312. БУХОРО ҒИЧМОЛАСИ

Гелиотроп бухарский / *Heliotropium bucharicum* B. Fedtsch.

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойга хос, сони қисқариб бораётган, эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–50 см, бир йиллик ўсимлик. Пояси тик, қалин оқ тукли. Барглари бандсиз ёки қисқа бандли, юмалоқ-тухумсимон, узунлиги ва эни 3–5 см атрофида, оқ момиқ тукли, асоси юмалоқ ёки юраксимон. Гажак тўнгули бир томонга қайрилган, гуллари жуфт ёки 3–4 тадан иборат, икки уили, 2–6 см узунликда, мевалаганда ина ҳам узаяди, оқ қалин туклар билан қопланган. Гулкочаси қалин тукли, узунлиги 3 мм атрофида, косача бўлаклари тўмтоқ. Гули сариқ. Устунчаси қисқа ва туксиз. Тумшукчаси конус-бигизсимон, устунчадан 2–3 марта узун. Ёиғоқчаси силлиқ, туксиз, ҷузиқ, 1–5 мм узунликда. Майиюнда гуллаб, июль–августда мевалайди.

и почти такой же ширины, белошерстистые, при основании округлые или сердцевидные. Завитки односторонние, парные или по 3–4, густые, двугнѣздые, длиной 2–6 см, при плодах удлинѣнные, белошерстистые. Чашечка войлочная, длиной около 3 мм, с тупыми линейными долями. Венчик жѣлтый. Столбик голый, короткий. Рыльце коническисиловидное, в 2–3 раза длиннее столбика. Орешки гладкие, голые, продолговатые, длиной 1–5 мм. Цветѣт в мае–июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: юго-западные отроги Гиссарского хребта.

Места обитания. Коренные породы, пестроцветы и гипсоносные почвы.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение площади гипсоносных толщ и выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [265, 310].

О.К. Хожиматов



Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари; Ҳисор тоғларининг жануби-ғарбий қисмида тарқалган.

Ўсиш шароити. Туб жинсли, ола тусли ҳамда гипсли тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Асосан туб жинсли ва ола тусли тупроқ қатламларидагина ўсиши бу ўсимлик турининг тарқалишини чеклайди.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза йўллари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [265, 310].

О.К. Хожиматов

Статус 1. Сокращающийся эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Однолетнее растение высотой 20–50 см. Стебель прямостоячий, густо-белошерстистый. Листья сидячие или короткочерешковые, округло-яйцевидные, длиной 3–5 см

Endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits bed-rocks, gypseous and gypsum-bearing soils. The quantity is unknown. Limiting factors; degradation of gypseous slopes and overgrazing. Measures of protection: not protected.



313. ЙИРИК ИЛДИЗЛИ МЕҲРИГИЁХ Оносма крупнокорневая / *Onosma macrobita* Popov

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Илдизи кўп бошчали. Серпоя, баландлиги 30–50 см. Дағал туклари оқш. Барглари қиррали, узунлиги 2–4 см, эни 5–10 мм, учи ўткирроқ, барқутсимон. Тўпгули чўзикроқ гажакли. Косачаси оқш дағал тукли, узунлиги 7–10 мм. Гултожи сариқ, узунлиги 10–12 мм, кейинроқ қизил, қора-кўкиш туста киради. Ёнғоқчаси қорамтир-кулранг, товланувчи, тумшукчали.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Қизғиш қумлоқларда, қумтошларда ўсади.

Сони. Шўроб қишлоғи атрофида 2 000 тупи борлиги аниқланган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик ўсиб турган ерларнинг ўзлаштирилиши туфайли камайиб кетган.

Мадаанийлаштирилиши. Ўсимликни ўстириш бўйича олиб борилган ишлар натижасиз тугаган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [265, 310].

О.К. Хожиматов

Статус 1. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Корень многоглавый. Стебли многочисленные, высотой 30–50 см, беловатые от щетинистого опушения. Листья ланцетно-лопатчатые, длиной 2–4 см, шириной 5–10 мм, островатые, бархатистые. Соцветие – удлиняющийся завиток. Чашечка бело-щетинистая, длиной 7–10 мм. Венчик длиной 10–12 мм, желтый (позже краснеющий и черно-синееющий). Орешки длиной 3 мм, темно-серые, блестящие, с носиком. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: юго-западные отроги Гиссарского хребта.

Места обитания. Краснопесчанники.

Численность. 2 000 растений в окрестностях кишлака Шўроб.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Разрушение естественных местообитаний.

Культивирование. Многочисленные попытки культивирова-

ния не увенчались успехом.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [265, 310].



О.К. Хожиматов

Rare endemic species of Uzbekistan. It is spread at the south-western His-sar range (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits gypseous slopes. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and overgrazing. Measures of protection: not protected.



314. БОШМОҚСИМОН НОНЕЯ

Нонея башмакчовидная / *Nonea calceolaris* Nikif. & Paziz

Мақоми 0. Ўзбекистон учун камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик ўтсимон ўсимлик, ҳурпайган қалин безчали ва узун, дағал, сийрак тукли, баландлиги 30 см. Поялари бир нечта, асосидан шохланган. Барглари бутун ёки билли-нар-биллимас тишчали, қиррали-нишли, кенг ва тор қиррали, учи ўткир, узунлиги 2,5–4,5 см, эни 5–10 мм. Мева тугувчи гажаги 10–14 см узунликда, зич жойлашган, ғовақроқ. Мевабанди 1–2 мм узунликда. Косачаси гуллаганда қўнғироқсимон шаклга киради, узунлиги 7–8 мм, гултожи найчасидан деярли 2 баробар узун ва қиррадор ўткир тишчалари бор. Гултожи сарғиш, узунлиги 7–8 мм, найчасининг узунлиги 4 мм. Мева-ёнғоқчаси 3–4 мм узунликда, текис жойлашган, тукли, ён томонлари тиришган. Март–апрель ойларида гуллаб, меvasи апрель–май ойларида етилади.

Тарқалиши. Мирзачўл ва Ҳисор тизмаси (Жоилма)да тарқалган (Сирдарё ва Қашқадарё вилоятлари).

Ўсиш шароити. Соз тупроқли чўллarda ва адирларда ўсганлиги аниқланган.

Сони. Узоқ давом этган қидирув ишлари натижасиз тугаган. Бу тур бутунлай йўқолган бўлса керак.

Қўпайиши. Уругидан қўпайган бўлиши мумкин.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ерларнинг ҳўжалик мақсадида ўзлаштирилиши, ҳўжалик фаолияти оқибатида сони кескин қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқылмаган.

Манбалар. [159, 209].

О.К. Ҳожиматов

Статус 0. Редкий эндемик Узбекистана.

Краткое описание. Однолетнее растение высотой до 30 см, густо оттопыренно-коротко-железисто-волосистое, с рассеянными длинными щетинками. Стеблей несколько, простертых, восходящих от основания. Листья цельнокрайние или неясно зубчатые; лопатчато-ланцетные, широко- или узколанцетные, острые, длиной 2,5–4,5 см, шириной 5–10 мм. Плодущие завитки длиной 10–14 см, густые и рыхловатые. Плодоножки длиной 1–2 мм. Чашечка при цветах колокольчатая, длиной 7–8 мм, почти в 2 раза длиннее трубки венчика с ланцетными длинно заостренными зубцами. Венчик желтоватый, длиной 7–8 мм, с трубкой длиной 4 мм. Плод – орешек длиной 3–4 мм, почти горизонтальный, пушистый по бокам грубо морщинистый. Цветёт в марте–апреле, плодоносит в апреле–мае.



Распространение. В Сырдарьинской и Кашкадарьинской областях: Мирзачуль и Гиссарский хребет (Джанльма).

Места обитания. Глинистые пустыни и предгорья.

Численность. В ходе многочисленных поисков не обнаружен. Вид, вероятно, исчез.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственная деятельность человека, распахивание земель.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159, 209].

О.К. Ҳожиматов

Rare endemic species of Uzbekistan. It is spread at the Syrdarya and Kashkadarya regions. Inhabits argillaceous deserts and foothills. The quantity is unknown. Limiting factors: economic human activities. Measures of protection: not protected.



МАНБАЛАР – ИСТОЧНИКИ – LITERATURE

1. Абдуллаева М. Н. Род *Eremosparton* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 51.
2. Абдуллаева М. Н. Секция *Tropidolobus* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 228–229.
3. Абдуллаева М. Н. Секция *Tamias* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. 1981. – С. 235.
4. Абдуллаева М. Н. Род *Scutellaria* L. // Определитель растений Средней Азии, т. 9, 1987. – С. 22.
5. Абдухамидов Н. А. Горичвет золотистый // Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. М.: ГУГК, 1976. – С. 150, 225.
6. Адылов Т. А. Род *Eremostachys* // Определитель растений Средней Азии. Т. 9. Ташкент: ФАН, 1987, С. 78–82.
7. Адылов Т. А. Род *Paraeremostachys* // Определитель растений Средней Азии. Т. 9. Ташкент: Фан, 1987. – С. 59–66.
8. Адылов Т. А. Род *Dracoscephalum* // Определитель растений Средней Азии. Т. 9. Ташкент: Фан, 1987. – С. 78–82.
9. Адылов Т. А., Махмедов А. М. Род *Phlomis* // Определитель растений Средней Азии. Т. 9. Ташкент: Фан, 1987. – С. 82–110.
10. Байтенов М. С. Род *Oxytropis* // Флора Казахстана. Т. 5. Алма-Ата: АН Каз ССР. 1961. – С. 330–410.
11. Белолитов И. В. Интродукция видов рода *Acantholimon* в условиях Ташкента // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 11. Ташкент: Фан, 1974. – С. 51–63.
12. Белолитов И. В. Интродукция видов рода *Lepidolobus* в условиях Ботанического сада АН УзССР // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 15. Ташкент: Фан, 1978. – С. 54–61.
13. Белолитов И. В. Современное состояние редчайшего вида флоры Средней Азии *Otostegia bucharica* В. Федтш. // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 17. Ташкент: Фан Узб. ССР, 1980. – С. 90–100.
14. Белолитов И. В. Интродукция травянистых растений природной флоры Средней Азии. Ташкент: Фан Узб. ССР, 1989. – С. 80.
15. Белолитов И. В. *Otostegia bucharica* В. Fedtsch. Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: "Chinor ENK", 1996. – С. 256.
16. Белоусова Л. С., Денисова Л. В., Никитина С. В. Редкие растения СССР. М. 1979. – С. 161, 216.
17. Бешко Н. Ю. Редкие и эндемичные виды флоры Нуратинского заповедника // Труды заповедников Узбекистана. Ташкент: Мехнат, 1997. Вып. 2. – С. 18–24.
18. Бешко Н. Ю. Новые сведения о редких видах флоры Нуратинского заповедника // Сохранение биоразнообразия на особо охраняемых территориях Узбекистана. Ташкент: Chinor ENK, 2000. – С. 17–20.
19. Благовещенская Н. С., Деревецкая Е. А. Род *Bergenia* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 242.
20. Бондаренко О. Н. Сем. *Caprifoliaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 559–577.
21. Бондаренко О. Н. Род *Acanthophyllum* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 297.
22. Бондаренко О. Н. Род *Silene* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 260, 266, 267, 269.
23. Бондаренко О. Н., Виноградова Р. М. Род *Dianthus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 301–310.
24. Бондаренко О. Н., Закиров К. З. Род *Lappula* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 229.
25. Бондаренко О. Н. Семейство *Vignoniaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 498–499.
26. Борисова А. Г. Новые бобовые флоры СССР // Бот. мат. Герб. Ин-та бот. АН СССР. Т. 10. Л., 1947. – С. 43–57.
27. Борисова А. Г. О видах рода *Bergenia* Moench. в Средней Азии // Бот. мат. Герб. бот. Ин-та АН СССР. Т. 16. М.-Л., 1954. – С. 97–103.
28. Борисова А. Г. Род *Tragacantha* // Бот. мат. Герб. Бот. Ин-та АН СССР. Т. 10. М.-Л. 1947. – С. 57–79.
29. Борисова А. Г. Род *Tragacantha* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 672–686.
30. Борисова А. Г. Род *Zygophyllum* // Флора СССР. Т. 14. М.-Л.: АН СССР, 1949. – С. 152–193.
31. Борисова А. Г. Секция *Myobroma* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: АН СССР, 1946. – С. 142–230.
32. Борисова А. Г. Секция *Laguropsis* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 839–868.

33. Борисова А. Г. Секция Polyanthos рода Astragalus // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 357–380.
34. Борисова А. Г. Секция Proselius рода Astragalus // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 594–642.
35. Бочанцев В. П. Сем. Chenopodiaceae // Флора Узбекистана. Т. 2. Ташкент: АН УзССР, 1953. – С. 280, 288, 292, 322.
36. Бочанцев В. П., Введенский А. И. Новости систематики Гербария Института ботаники АН УзССР. Вып. 14. Ташкент, 1954. – С. 11.
37. Бочанцев В. П., Введенский А. И. Род Clausia // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 121–122.
38. Бочанцев В. П. Род Spryginia Popov // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 191.
39. Бочанцева З. П. Новый вид тюльпана из Западного Тянь-Шаня // Бот. Матер. Герб. Инст. Ботаники АН УзССР. 1954, вып. XVI. – С. 8–11.
40. Бочанцева З. П. Тюльпаны. Ташкент: Фан, 1962. – С. 408.
41. Бочанцева З. П., Шарипов А. Х. Tulipa uzbekistanica Z. Botsch. et Scharipov // Новости систематики высших растений. Т. 8. Л., Наука, 1971. – С. 109–111.
42. Бутков А. Я. Новые виды семейства Ranunculaceae // Бот. мат. Герб. Бот. ин-та Уз ФАН СССР. Вып. 3. Ташкент, 1941. – С. 21.
43. Бутков А. Я. Новые виды из Средней Азии // Бот. мат. Герб ин-та бот. Уз ФАН СССР. Вып. 6. Ташкент: 1941. – С. 6–8.
44. Бутков А. Я. Значение и пути охраны реликтовой флоры юга Средней Азии // Мат. совещ. по охране объектов растительного мира республик Средней Азии и Казахстана. Ташкент: Фан, 1971. – С. 165–170.
45. Бутков А. Я. О платановых лесах на территории Узбекистана // Узб. биол. журн., 1976, №3. – С. 42.
46. Буш Н. А. Род Iskandera // Флора СССР. Т. 8. М.-Л.: АН СССР, 1939. – С. 320.
47. Васильченко И. Т. Новые виды рода Oxypetris // Бот. мат. Герб. Бот. ин-та АН СССР, Т. 20. Л., 1960. – С. 231–250.
48. Васильченко И. Т., Васильева Л. И. Охрана реликтов среднеазиатской флоры в Западном Гиссаре // Мат. совещ. по охране объектов растительного мира республик Средней Азии и Казахстана. Ташкент: Фан, 1971. – С. 154–165.
49. Введенский А. И. Род Allium L. // Определитель растений Средней Азии. Ташкент: Фан, 1971. Т. 2. – С. 81.
50. Введенский А. И. Род Tulipa // Флора СССР. Т. 4. Л.: 1935. – С. 329–364.
51. Введенский А. И. Сем. Amaryllidaceae // Флора Узбекистана. Т. 1. Ташкент: АН УзССР, 1941. – С. 495–502.
52. Введенский А. И. Род Juno. // Флора Узбекистана. Т. 1, 1941. – С. 519.
53. Введенский А. И. Сем. Iridaceae // Флора Узбекистана. Т. 1. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1941. – С. 502–522.
54. Введенский А. И. Новые бобовые из Средней Азии // Бот. мат. Герб. ин-та бот. АН УзССР. Вып. 13. Ташкент, 1952. – С. 19–25.
55. Введенский А. И. Новые виды из Средней Азии // Бот. мат. Герб. ин-та Бот. АН УзССР. Вып. 14. Ташкент, 1954. – С. 7–12.
56. Введенский А. И. Род Calispepla // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1955. – С. 412–413.
57. Введенский А. И. Новая секция рода Astragalus // Бот. мат. Герб. ин-та бот. АН УзССР. Вып. 15. Ташкент, 1959. – С. 10–12.
58. Введенский А. И. Род Allium // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971 а. – С. 39–89.
59. Введенский А. И. Род Juno // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 132–140.
60. Введенский А. И., Ковалевская С. С. Род Tulipa // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 94–109.
61. Введенский А. И., Пазий В. К. Заметки о среднеазиатских видах рода Eremostachys // Бот. мат. Герб. ин-та АН УзССР. Вып. 18. Ташкент: Фан, 1967. – С. 8–29.
62. Введенский А. И., Пазий В. К. Род Eremostachys // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1967. – С. 319–345.
63. Введенский А. И., Пучкова Е. Г. Сем. Polyodiaceae // Определитель растений Средней Азии. Т. 1. Ташкент: Фан, 1968. – С. 14.
64. Виноградова Р. И. Род Lepidium // Определитель растений Средней Азии. Т. 4. Ташкент: Фан, 1971. – С. 197.
65. Виноградова Р. М. Секция Augeophora рода Astragalus // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 212–213.

66. Виноградова Р. М. Секция *Leptorhiza* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 274.
67. Виноградова Р. М. Секция *Xiphidium* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 185–188.
68. Голоскоков В. П. Сем. *Santalaceae* // Флора Казахстана. Т. 4. Алма-Ата: АН КазССР, 1960. – С. 83–88.
69. Гончаров Н. Ф. Новые виды рода *Astragalus* // Бот. мат. Герб. ин-та бот. АН СССР. Т. 7. Л. 1938. – С. 145.
70. Гончаров Н. Ф. Новые астрагалы и остролодки // Бот. мат. Герб. ин-та бот. АН СССР. Т. 9. Вып. 1. Л., 1941. – С. 85–105.
71. Гончаров Н. Ф. Новые и критические астрагалы // Бот. мат. Герб. ин-та бот. АН СССР. Т. 9. Вып. 4. Л., 1946. – С. 113–151.
72. Гончаров Н. Ф. Секция *Astenolobium* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 382–383.
73. Гончаров Н. Ф. Секция *Halicacabus* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 415–423.
74. Гончаров Н. Ф. Секция *Stipitella* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 1. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 21–22.
75. Гончаров Н. Ф. Род *Astragalus* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1955а. – С. 488–671.
76. Гончаров Н. Ф. Род *Oxytropis* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1955б. – С. 686–715.
77. Гончаров Н. Ф., Борисова А. Г. Секция *Pendulina* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: АН СССР, 1946. – С. 136–231.
78. Гончаров Н. Ф., Борисова А. Г. Секция *Tropidolobus* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: АН СССР, 1946. – С. 566–569.
79. Горшкова С. Г. Род *Sternbergia* // Флора СССР. Т. 4. М.-Л.: АН СССР, 1935. – С. 485–489.
80. Горшкова С. Г. Род *Orostegia* // Флора СССР. Т. 21. М.-Л.: АН СССР, 1954. – С. 182–187.
81. Горшкова С. Г. Род *Pentstemon* // Флора СССР. Т. 25. М.-Л.: АН СССР, 1959. – С. 483.
82. Грубов В. И. Сем. *Ebenaceae* // Флора СССР. Т. 18. М.-Л.: АН СССР, 1957. – С. 475–483.
83. Грубов В. И. Сем. *Rhamnaceae* // Деревья и кустарники СССР. Т. 4. М.-Л.: АН СССР, 1958. – С. 526–607.
84. Джалалов А. О произрастании семян горницета золотистого в естественных условиях и в культуре // Тез. докл. 8-й профессорско-преподавательской конференции. Андижан, 1966. – С. 179.
85. Джалалов А. Горницет золотистый (*Adonis chrysocyathus* Hook. f. et Thorns.) – перспективное лекарственное растение // Исследование естественных ресурсов Ферганской долины. Труды Андижанского гос. лед. ин-та. Ташкент, 1966. – С. 21–23.
86. Джалалов А. Горницет золотистый (*Adonis chrysocyathus*) и его биология // Автореф. канд. дисс. ... Ташкент, 1968. – С. 39.
87. Джалалов А. Об охране горницета золотистого (*Adonis chrysocyathus*) // Мат. совещ. по охране объектов растительного мира республик Средней Азии и Казахстана. Ташкент: Фан, 1971. – С. 288–289.
88. Джангуразов Ф. Х. Новые местонахождения Дионисии гиссарской (*Dionysia hissarica* Lipsky) в бассейне р. Сангардак (Западный Гиссар) // Изв. Акад. Наук Таджикской ССР. Душанбе, 1965. 1 (18). – С. 43–45.
89. Дробов В. П. Род *Cercis* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: во АН УзССР, 1955. – С. 390.
90. Дробов В. П. Род *Sorbaria* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 263–264.
91. Дробов В. П. Сем. *Vitaceae* // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УзССР, 1959а. – С. 157–158.
92. Дробов В. П. Сем. *Celastraceae* // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УзССР, 1959б. – С. 132–134.
93. Дробов В. П. Сем. *Ebenaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1961. – С. 85–87.
94. Закиров К. З. Новые виды рода *Phlomis* // Бот. мат. Герб. ин-та бот. и зоол. АН УзССР. Т. 9. Ташкент, 1947. – С. 3.
95. Закиров К. З. *Acatolimon nuratavicum* // Флора СССР. Т. 18. М.-Л.: АН СССР, 1952. – С. 334, 536.
96. Закиров К. З. Сем. *Boraginaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 218.
97. Закиров К. З. Флора и растительность бассейна р. Зеравшан. Т. 1. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 448.
98. Залевская Е. М. Сравнительное морфологическое изучение проростков видов родов *Anemone* L., *Pulsatilla* // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 6. Ташкент: Фан, 1970. – С. 164–169.
99. Залевская Е. М. К биологии прорастания семян некоторых интродуцированных ветрениц и прострелов // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 4. Ташкент: Фан, 1970. – С. 113–120.

100. Запрыгаева В. И. Дикорастущие плодовые Таджикистана М.-Л: Наука, 1964. – С. 695.
101. Иванова Л. И. Род *Spirostegia* // Флора СССР. Т. 22. М.-Л: АН СССР, 1955. – С. 512–514.
102. Иващенко А. А. Тюльпаны и другие луковичные растения Казахстана. Алматы, 2005. 192 с.
103. Икрамов М. И. Зайцегуб опьяняющий, его распространение и запасы в Узбекистане // Ресурсы дикорастущих растений СССР. М., 1968. – С. 123.
104. Икрамов М. И. Род *Lagochilus* Средней Азии // Ташкент: Фан, 1976. – С. 184.
105. Ильин М. М. Род *Jurinea* // Флора СССР Т. 27. М.-Л: АН СССР, 1962. – С. 609–614, 631–635, 641–642, 702–703.
106. Камелин Р. В. Флорогенетический анализ естественной флоры горной Средней Азии. Л.: Наука, 1973. – С. 356.
107. Камелин Р. В. К познанию флоры Нуратинских гор // Ботан. журн., 1973. Т. 58. № 5. – С. 625–637.
108. Камелин Р. В. Новый вид рода *Vicia* Cass. и другие новинки флоры Нуратинских гор // Нов. сист. высш. раст. 1976. Т. 13. – С. 244–245.
109. Камелин Р. В. *Astragalus*. Род *Astragalus* L. // Определитель растений Средней Азии, т.6. – С.158.
110. Камелин Р. В. Род *Vicia* Cass. – Викоа // Определитель растений Средней Азии. Т. X. Ташкент: Фан, 1993. – С. 461–463.
111. Камелин Р. В., Махмедов А. М. О систематическом положении среднеазиатских видов *Salvia* из секции *Physosiphace* // Бот. журн. 1980. Т. 65. №4. – С. 580–582.
112. Камелин Р. В., Цукерваник Т. И. *Lagochilus vvedenskyi* R.Kam. et Zuckerw. // Новости систематики. Вып. 20. Л.: Наука, 1983. – С. 167.
113. Курпичников М. Э. Род *Helichrysum* // Флора СССР. Т. 25. М.-Л.: АН СССР, 1959. – С. 417–418.
114. Ключков Е. М., Пименов М. Г. *Vunium* L. – Буниум. // Определитель растений Средней Азии. Т. VII. Ташкент: Фан, 1983. – С. 228–335.
115. Кнорринг О. Э. Род *Eremostachys* // Флора СССР. Т. 21. М.-Л.: АН СССР, 1954а. – С. 1–56.
116. Кнорринг О. Э. Род *Lagochilus* // Флора СССР. Т. 21. М.-Л.: АН СССР, 1954. – С. 160–181.
117. Кнорринг О. Э. Материалы по систематике рода *Lepidolopha* // Бот. мат. Герб. Бот. ин-та АН СССР. Т. 10. Л., 1959. – С. 380–384.
118. Кнорринг О. Э. Род *Lepidolopha* // Флора СССР. Т. 26. М.-Л.: АН СССР, 1961. – С. 288–291.
119. Ковалевская С. С. *Dionysia* Fenzl – Дионисия. Определитель растений Средней Азии. Ташкент: Фан, 1986. Т.VIII. – С. 19–20.
120. Ковалевская С. С. Заметки о некоторых среднеазиатских видах *Anthemidea* // Бот. мат. Герб. Ин-та Бот. АН УзССР, Вып. 16. Ташкент, 1961. – С. 32–38.
121. Ковалевская С. С. Сем. *Primulaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 31–50.
122. Ковалевская С. С. Сем. *Solanaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 416–445.
123. Ковалевская С. С. Род *Trichanthesis* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 194.
124. Ковалевская С. С. Род *Scorzonera* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 444–445.
125. Ковалевская С. С. Род *Tanacetopsis* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 146.
126. Ковалевская С. С. Род *Koelpinia* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 419.
127. Ковалевская С. С. Род *Lepidolopha* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 195–197.
128. Ковалевская С. С. Род *Xylanthemum* // Флора Узбекистана. Т.6. 1961. – С.136.
129. Ковалевская С. С. Род *Anemone* // Определитель растений Средней Азии Т. 3. Ташкент: Фан, 1972. – С. 189–193.
130. Ковалевская С. С. Род *Adonis* // Определитель растений Средней Азии. Т. 3. Ташкент: Фан, 1972. – С. 228–231.
131. Ковалевская С. С. Род *Crambe* // Определитель растений Средней Азии. Т. 4. Ташкент: Фан, 1974. – С. 183–186.
132. Ковалевская С. С. Секция *Astenolobium* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 139.
133. Ковалевская С. С. Секция *Astragalus* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 121–123.
134. Ковалевская С. С. Супотогиевые // Определитель растений Средней Азии. Т. 7. Ташкент: Фан, 1983. – С. 167–168.
135. Ковалевская С. С. Секция *Myobroma* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т.6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 142–164.

136. Ковалевская С. С. Секция *Pendulina* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 164–167.
137. Ковалевская С. С. Род *Hedysarum* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 286–311.
138. Ковалевская С. С. Род *Ugamia* // Определитель растений Средней Азии. Т. 10. Ташкент: Фан, 1993. – С. 596–596.
139. Ковалевская С. С. Род *Rhus* L. // Определитель растений Средней Азии, 1983. Т. 7. – С. 18.
140. Коровин Е. П. Новые виды семейства зонтичных флоры Узбекистана // Бот. мат. Герб. ин-та бот. и зоол. АН УЗССР, Вып. 8. Ташкент, 1947. – С. 3–24.
141. Коровин Е. П. Иллюстрированная монография рода *Ferula*. Ташкент: АН УЗССР, 1947. – С. 33, 43, 64.
142. Коровин Е. П. Новые виды семейства зонтичных флоры Узбекистана // Бот. мат. Герб. ин-та бот. и зоол. АН УЗССР, Вып. 12. Ташкент, 1948. – С. 13–32.
143. Коровин Е. П. Род *Ferula* // Флора СССР. Т. 17. М.-Л.: АН СССР, 1951. – С. 62–142.
144. Коровин Е. П. Addenda XVII // Флора СССР. Т. 18. М.-Л.: АН СССР, 1952. – С. 735.
145. Коровин Е. П. *Bunium* L. – Буннум, зира. // Флора Узбекистана. Т. III. Ташкент: АН УЗССР, 1959. – С. 340–348.
146. Коровин Е. П. *Ferula* L. – Ферула. Флора Узбекистана. Т. III. Ташкент: АН УЗССР. – С. 399–439, 426, 490.
147. Коровин Е. П. Род *Oenanthe* // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УЗССР, 1959. – С. 378.
148. Коровин Е. П. Род *Seseli* // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УЗССР, 1959. – С. 372.
149. Коровин Е. П., Попов М. Г. *Euphorbia sclerocyathium* // Гербарий флоры Средней Азии. Т. 11–13. № 304. Ташкент, 1927. – С. 41.
150. Короткова Е. Е. Новые виды рода *Hedysarum* // Бот. мат. Герб. ин-та бот. и зоол. АН УЗССР. Ташкент, 1947. – С. 6–14.
151. Короткова Е. Е. Новые виды рода *Cicer* // Бот. мат. Герб. ин-та бот. и зоол. АН УЗССР. Вып. 10. Ташкент, 1948. – С. 17–19.
152. Короткова Е. Е. Род *Hedysarum* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УЗССР, 1955. – С. 222–736.
153. Короткова Е. Е. Род *Onobrychis* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УЗССР, 1955. – С. 737–744.
154. Короткова Е. Е. Род *Cicer* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УЗССР, 1955. – С. 750–756.
155. Короткова Е. Е., Хамидходжаева С.А. Унгерия Виктора // Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. М.: ГУПС 1976. – С. 154, 317.
156. Красная книга Узбекской ССР. Ч. 2. Растения. Ташкент: Фан, 1984. – С. 150.
157. Красная Книга Республики Узбекистан: Редкие и исчезающие виды растений и животных: (в 2-х томах): Т.1. Растения. Ташкент: Chinor ENK, 1998.
158. Красная Книга Республики Узбекистан: Редкие и исчезающие виды растений и животных: (в 2-х томах): Т.1. Растения и грибы. Ташкент: "Chinor ENK", 2006.
159. Красная Книга Республики Узбекистан: Редкие и исчезающие виды растений и животных: (в 2-х томах): Т.1. Растения и грибы. Ташкент: "Chinor ENK", 2009.
160. Красовская Л. С., Левичев И. Г. Флора Чаткальского заповедника. Ташкент: Фан, 1986. – С. 168–169.
161. Крашенинников И. М. Новые сложноцветные // Бот. мат. Герб. Бот. ин-та им. Комарова АН СССР. Т. 9. Вып. 4–12. М.-Л., 1946. – С. 152–184.
162. Крашенинников И. М., Липшиц С. Ю. *Scorzonera bungei* N. Krasch. et Lipsch. // Бюл. Моск. общ. исп. прир. Отд. биол. Вып. 43. № 1. М.: 1934. – С. 144.
163. Кудряшев С. Н. Материалы к изучению шалфеев Средней Азии. Ташкент: 1937. – С. 35.
164. Кудряшев С. Н. Род *Rugus* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УЗССР, 1955. – С. 271–275.
165. Кудряшев С. Н. Сем. *Sapraridaceae* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УЗССР, 1955. – С. 58–64.
166. Культиасов М. В. Материалы к познанию Туркестанских видов рода *Cousinia* // Тр. Средне-аз. Гос. унив. Сер. 8. Вып. VI. Ташкент, 1929. – С. 7, 22, 26, 27.
167. Лазыков Г. А. Кенжабаева Н. О новых и редких видах флоры Киргизии. // Новости систематики высших растений, 2002. Т. 34. – С. 252–254.
168. Левичев И. Г. Красовская Л. Е. Пскемский лук в южной части своего ареала // Бюлл. МОИП. отд. биол. 86. 1982, №6. – С. 105–111.
169. Левичев И. Г. *Calispepla aegacanthoides* Vved. Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, ENK "Chinor", 1996. – С. 67.

170. Левичев И. Г. *Iridodictyum winklerii* (Regel) Rodionenko. Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: "Chinor ENK", 1996. – С. 81.
171. Ли А. Д. Секция *Halicacabus* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 171.
172. Ли А. Д. Секция *Alopecuroides* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 120.
173. Ли А. Д. Род *Rochelia* // Определитель растений Средней Азии. Т. 8. Ташкент: Фан, 1986. – С. 150.
174. Ли А. Д. Род *Oposma* L. // Определитель растений Средней Азии, 1986. Т. 8. – С. 110.
175. Ли А. Д. Род *Rindera* Pall. // Определитель растений Средней Азии. Ташкент: Фан, 1986. Т. VIII. – С. 151–155.
176. Ли А. Д. Род *Pedicularis* // Определитель растений Средней Азии. т. 9, 1987. – С. 266.
177. Линчевский И. А. *Acantholimon* Boiss. – Акантолимон // Флора Узбекистана. Т. 5. – Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 63.
178. Линчевский И. А. *Acantholimon* Boiss. – Акантолимон // Определитель растений Средней Азии. Т. 10. Ташкент: Фан, 1993. – С. 19.
179. Линчевский И. А. *Cephalorhizum* Popov et Korošin – Корнеглав // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 74.
180. Линчевский И. А. *Cephalorhizum* Popov et Korošin – Корнеглав // Определитель растений Средней Азии. Т. 10. Ташкент: Фан, 1993. – С. 32.
181. Линчевский И. А. Род *Cicer* // Флора СССР. Т. 13. М.-Л.: АН СССР, 1948. – С. 386–406.
182. Линчевский И. А. Сем. *Plumbaginaceae* // Флора СССР. Т. 18. М.-Л.: АН СССР, 1952. – С. 226–474.
183. Линчевский И. А. Сем. *Plumbaginaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 52–63.
184. Линчевский И. А. Род *Cicer* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 323–331.
185. Липский В. И. Материалы для флоры Средней Азии // Труды Императорского С.-Пб. Ботанического сада, 1901. Т. XVIII. – С. 83–85.
186. Липшиц С. Ю. Род *Scorzonera* // Флора СССР. Т. 29. М.-Л.: АН СССР, 1964. – С. 107–108.
187. Лозина-Лозинская А. С. Род *Fritillaria* // Флора СССР. Т. 4. Л.: АН СССР, 1935. – С. 302–320.
188. Лозина-Лозинская А. С. Род *Ribes* // Деревья и кустарники СССР. Т. 3. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1954. – С. 177–215.
189. Малеев В. П. Род *Rugus* // Флора СССР. Т. 9. М.-Л.: АН СССР, 1939. – С. 33–357.
190. Мальцев Н. И. Дионисия гиссарская – *Dionysia hissarica* Lipsky. Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: Chinor ENK, 2009. – С. 168–169.
191. Махмедов А. М. Новый вид шалфея (*Salvia*) с Западного Тянь-Шаня // Новости систематики высших растений. Т. 17. М.-Л.: Наука, 1980. – С. 215–218.
192. Махмедов А. М. Распространение видов рода *Salvia* в Средней Азии и Южном Казахстане // Узб. биол. журн. 1982. №2. – С. 41–43.
193. Махмедов А. М. Шалфей Средней Азии и Казахстана. Ташкент: Фан, 1984. – С. 50–56.
194. Махмедов А. М. Ботанико-географический анализ рода *Phlomis* L. флоры Средней Азии // Узб. биол. журн. 1986, №4. – С. 40–42.
195. Махмедов А. М. Роды *Phlomis* и *Salvia* // Определитель растений Средней Азии. Т. 9. Ташкент: Фан, 1987. – С. 107–113, 139–151.
196. Мурзаев Р. М. Мягкоплодный рассеченнолистный и возможности введения его в культуру. Ташкент, 1985. – С. 45.
197. Мухамеджанова Ф. И., Тожибаев К. Ш. Новые сведения о двух редких и эндемичных растениях Чаткальского заповедника // Труды Чаткальского Государственного Биосферного заповедника. Вып. V. Ташкент, 2004. – С. 138–142.
198. Набиев М. М. Новое алкалононосное растение Узбекистана // Юбилейный выпуск Трудов ТашГУ Ташкент, 1961. – С. 24–27.
199. Набиев М. М. Сем. *Cucurbitaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 600–618.
200. Набиев М. М., Закиров К. З. *Lappula puratavica* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 631–218.
201. Набиев М. М., Закиров К. З. Сем. *Boraginaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 632, 222.
202. Набиев М. М., Левичев И. Г., Белоусова Л. С. Дионисия гиссарская – *Dionysia hissarica* Lipsky. // Красная книга СССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. М.: Лесная промышленность, 1984. – С. 334.
203. Набиев М. М. Род *Helichrysum* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 80.
204. Набиев М. М. Род *Calligonum* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 191–199.
205. Набиев М. М., Казакбаев Р. Ю. // Определитель деревьев и кустарников Узбекистана. Ташкент: Фан, 1975. – С. 116.

206. Набиев М. М. Секция *Oxyglottis* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т.6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 101–104.
207. Набиев М. М. *Astragalus terrae rubra* Butkov // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, "Chinor ENK", 2006. – С.62.
208. Набиев М. М. *Hedysarum magnificum* Kudr. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, "Chinor ENK", 2006. – С.87.
209. Набиев М. М. Сем. Boraginaceae // Определитель растений Средней Азии. Т. 8. Ташкент: Фан, 1986. – С. 130–135.
210. Набиев М. М. Семейство Bignoniaceae // Определитель растений Средней Азии. т.9, Ташкент: Фан УЗССР, 1987. – С. 270.
211. Набиев М. М. *Rindera fornicata* Pazij // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: "Chinor ENK", 1996. – С. 94.
212. Насимова Т. Euphorbiaceae // Определитель растений Средней Азии. т.7. Ташкент: Фан УЗССР, 1983. – С. 48.
213. Невский С. А. Род *Delphinium* // Флора СССР. Т. 7. М.-Л.: АН СССР, 1937. – С. 99–183.
214. Нигматуллаев А., Тайжанов К. К биологии некоторых среднеазиатских видов *Aconitum* L. // Биологические особенности перспективных лекарственных растений Узбекистана // Ташкент: Фан, 1981. – С. 4–28.
215. Нигматуллаев А., Тайжанов К. К биологии прорастания семян некоторых среднеазиатских представителей Ranunculaceae // Узб. биол. журн. 1983. №2. – С. 35–38.
216. Пазий В. К. Новые виды сем. Euphorbiaceae // Бот. мат. Герб. ин-та ботаники и зоологии АН УЗССР. Вып. 11. Ташкент: АН УЗССР, 1948. – С. 20–28.
217. Пазий В. К. Сем. Papaveraceae // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УЗССР, 1955. – С. 33–58.
218. Пазий В. К. Сем. Euphorbiaceae // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УЗССР, 1959. – С. 82–123.
219. Пазий В. К. Род *Stipa* // Определитель растений Средней Азии. Т. 1. Ташкент: Фан, 1968. – С. 74.
220. Пазий В. К. Сем. Amaryllidaceae // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 119–122.
221. Пазий В. К. Род *Colchicum* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 13–14.
222. Пазий В. К. Род *Petilium* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 92.
223. Пазий В. К. Род *Dipsadi* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1977. – С. 110.
224. Пазий В. К. Сем. Papaveraceae // Определитель растений Средней Азии. Т. 4. Ташкент: Фан, 1974. – С. 6–30.
225. Пахомова М. Г. Род *Ficus* // Определитель Растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 151.
226. Пахомова М. Г. Род *Raeonia* // Определитель растений Средней Азии. Т. 3. Ташкент: Фан, 1972. – С. 142.
227. Пахомова М. Г. Род *Delphinium* // Определитель растений Средней Азии. Т. 3. Ташкент: Фан, 1972. – С. 156–181.
228. Пахомова М. Г. Род *Pseudoclausia* // Определитель растений Средней Азии. Т. 4. Ташкент: Фан, 1974. – С. 103–108.
229. Пахомова М. Г. Секция *Erionotus* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 123–129.
230. Пименов М. Г. К систематике рода *Seseli* L. Конспект видов флоры СССР // Новости систематики высших растений. 15. Л.: Наука, 1978. – С. 193.
231. Пименов М. Г. *Fergania* - новый род семейства зонтичных (Apiaceae) // Новости систематики высших растений. Т. 19, Л.: Наука, 1982. – С. 119.
232. Пименов М. Г. Род *Lipskyia* // Определитель растений Средней Азии. 1983, Т.7. – С. 192.
233. Пименов М. Г. *Astomaea Reichenb.* - Астомея // Определитель растений Средней Азии. Т. VII. Ташкент: Фан, 1983. – С. 194.
234. Пименов М. Г. *Sphaenolobium Pimenov* - Клинолопастник // Определитель растений Средней Азии. Т. VII. Ташкент: Фан, 1983. – С. 264–265.
235. Пименов М. Г. *Dimorphosciadium Pimenov* - Диморфосцидий // Определитель растений Средней Азии. Т. VII. Ташкент: Фан, 1983. – С. 267.
236. Пименов М. Г. *Lomatocarpa Pimenov* - Окаймленноплодник // Определитель растений Средней Азии. Т. VII. Ташкент: Фан, 1983. С. 268.
237. Пименов М. Г. *Ferula* L. - Ферула, шаир // Определитель растений Средней Азии. Т. VII. Ташкент: Фан, 1983. – С. 276–313.
238. Победимова Е. Г. Род *Salvia* // Флора СССР. Т. 21. М.-Л.: АН СССР, 1954. – С. 284–278.
239. Победимова Е. Г. Род *Restella* // Флора СССР. Т. 15. М.-Л.: АН СССР, 1949. – С. 515.

240. Попов М. Г. Дикie плодовые Средней Азии // Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции. Т. 22. Вып. 3. Л., 1929. – С. 241–483.
241. Попов М. Г., Андросов Н. В. Растительность заповедника Гуралаш и Зааминской лесной дачи. Ташкент, 1937. – С. 39.
242. Попов М. Г. Род *Fumariola* // Флора СССР. Т. 7. М.-Л.: АН СССР, 1937. – С. 716–717.
243. Попов М. Г. Новые виды бобовых из Средней Азии // Мат. Герб. ин-та бот. АН СССР, Л., 1937. – С. 15.
244. Попов М. Г. Сем. Сложноцветных // Материалы к флоре Зеравшанской долины. Тр. Узб. Гос. Унив. Н.С. 27. Биолог. Вып. 14. Ташкент, 1941. – С. 88–89.
245. Попов М. Г. Новые виды рода *Astragal* // Бот. мат. Герб. бот. ин-та АН СССР, Т. 10. М.-Л., 1947. – С. 3–29.
246. Попов М. Г., Закиров К. З. *Lappula aktaviensis* // Флора СССР. Т. 19. М.-Л.: АН СССР, 1953. – С. 712.
247. Пошкурлат А. П. О видовой самостоятельности *Adonis leiosepalis* // Бот. мат. Герб. ин-та бот. АН УзССР, Вып. 19. Ташкент: Фан, 1974. – С. 50–55.
248. Пояркова А. И. Новый вид жимолости для Средней Азии // Бот. мат. Герб. бот. ин-та АН СССР, Т. 9. Вып. 4–12. М.-Л., 1946. – С. 210–212.
249. Пратов У. П. Сем. *Chenopodiaceae* // Определитель растений Средней Азии. Т. 3. Ташкент: Фан, 1972. – С. 92, 94, 133.
250. Пратов У. П. Второй вид рода *Nanophyton* (*Chenopodiaceae*) // Бот. журн. 1975. Т. 60. № 8. – С. 1164.
251. Пратов У. П. О систематике и филогении рода *Nanophyton* (*Chenopodiaceae*) // Материалы совещания по филогении центросеменных. М.: МГУ, 1977. – С. 44–46.
252. Пратов У. П. Секция *Leptophysa* и *Stipitella* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 86–89.
253. Пратов У. П. Род *Climacoptera* // Систематика, география, филогения и вопросы охраны. Ташкент: Фан, 1986. – С. 26.
254. Пратов У. П. Род *Pseudosedum* (Boiss.) Berger. – Ложноочиток. Определитель растений Средней Азии. Т. IV. Ташкент, 1974. – С. 226–228.
255. Пратов У. П. и др. Тюльпаны Западного Тянь-Шаня. Ташкент: "Chinlog ENK", 2006. – С. 47–48.
256. Пратов У. П., Шерматов Г. М. Дикie яблоки и груши Узбекистана. Ташкент: Фан, 1972. – С. 16–19.
257. Проханов Я. И. Систематический сбор молочаев Средней Азии. М.-Л.: Госхимтехиздат, 1933. – С. 241.
258. Рожановская М. И. Островския величественная // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 4. Ташкент: Фан, 1965. – С. 137–143.
259. Рожевиц Р. Ю. Триба *Agrostidae* из сем. *Gramineae* // Флора СССР. Т. 2. Л.: АН СССР, 1934. – С. 63–234.
260. Романова А. С. и др. Хиноны *Salvia bucharica*, *S. dracosephaloides*, *S. korolkowii* // ХПС. 1980. № 4. – С. 564.
261. Рябова Т. И. Род *Eremurus* // Дикорастущие растения. Т. 2. Л., 1977. – С. 51–83.
262. Саркисова С. А. Сем. *Sapparidaceae* // Определитель растений Средней Азии. Т. 4. Ташкент: Фан, 1974. – С. 30–34.
263. Саркисова С. А. Род *Iskandera* // Определитель растений Средней Азии. Т. 4. Ташкент: Фан, 1974. – С. 151.
264. Саркисова С. А. Род *Ewersmannia* // Определитель растений Средней Азии, т. 6, 1981. – С. 358.
265. Саркисова С. А. Род *Heliotropium* // Определитель растений Средней Азии. Т. 8. Ташкент: Фан, 1986. – С. 95.
266. Сарibaева Ш. У. *Astragalus centralis* Sheld.-редкий эндемик Юго-Западного Кызылкума // 10-я Пушкинская школа-конференция молодых ученых, посвященная 50-летию Пушкинского центра РАН, 17–21 апреля 2006 года. Сборник тезисов. Пушкино, 2006. – С. 310.
267. Сарibaева Ш. У. Оценка состояния популяций *Astragalus centralis* Sheld. // Вестник Каракалпакского отделения АН РУз. Нукус, 2008. № 3. – С. 34–35.
268. Семистрочева П. Л. Сем. *Santalaceae* // Иллюстрированный определитель растений Казахстана. Т. 1. Алма-Ата: Наука, 1969. – С. 235.
269. Смольянинова Л. А. Род *Dionysia* // Флора СССР. Т. 18. М.-Л.: АН СССР, 1952. – С. 208–217.
270. Сосков Ю. Д. Род *Calligonum* // Флора Таджикистана. Т. 3. Л.: Изд-во АН СССР, 1968. – С. 225, 230, 234.
271. Сосновский Д. И. Сем. *Vitaceae* // Флора СССР. Т. 14. М.-Л.: АН СССР, АН УзССР, 1949. – С. 674–704.
272. Сумневич Г. П. Род *Eremosparton* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 452.
273. Сумневич Г. П. Род *Calophaca* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент, 1955. – С. 468–469.
274. Сумневич Г. П. Сем. *Rupicaceae* // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УзССР, 1959. – С. 239–240.

275. Тажетдинова Д. М. Краснокишечные виды *Sapparis gosanowiana* B.Fedtsch. и *Synopogon songaricum* Rupr. во флоре плато Устюрт / Узбекский биологический журнал. №5, Ташкент, 2013. – С. 30–31.
276. Тайжанов К., Короткова Е. Е. Ядовитые алколононосные растения Алая // Растительные ресурсы. 1969. Т. 5. Вып. 1. – С. 23–31.
277. Тайжанов К. Алколононосная флора горной Средней Азии. Автореф. дисс. ... докт. биол. наук. Ташкент, 1994. – 50 с.
278. Терехов В. И. Эндемичные и редкие растения флоры Чимкентской области // Охрана растительного мира Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1979. – С. 106–109.
279. Титова О. А. Изучение морфологии и биологии видов рода *Eremurus* Bieb. в условиях Ташкента // Автореф. канд. дисс. ... Ташкент, 1970. – С. 20.
280. Титова О. А. Влияние температурных условий на эремурусы в период летнего покоя и зимы // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 8, Ташкент: Фан, 1971. – С. 116–129.
281. Титова О. А. Спонтанные гибриды видов рода *Eremurus* // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 9. Ташкент: Фан, 1977. – С. 139–145.
282. Титова О. А. Результаты воздействия весеннего заморозка на некоторые однодольные растения природной флоры Средней Азии, интродуцированные в условиях Ташкента // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 10. Ташкент: Фан, 1973. – С. 116–118.
283. Титова О. А. К морфологии семян видов рода *Juniper* // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 16. Ташкент: Фан, 1979 а. – С. 98–101.
284. Титова О. А. К семенному размножению видов рода *Juniper* // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 16. Ташкент: Фан, 1979. – С. 98–101.
285. Титова О. А. *Eremurus alberti* Regel. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: "Chinor ENK", 1996. – С. 218.
286. Титова О. А. *Eremurus lactiflorus* O. Fedtsch. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: "Chinor ENK", 1996. – С. 218.
287. Тожибаев К. Ш. Дополнение к флоре Чаткальского Биосферного заповедника / Труды Чаткальского Государственного Биосферного заповедника. Вып. V. Ташкент, 2004. – С. 143–146.
288. Тожибаев К. Ш. *Tulipa vvedenskyi* Z. Botsch. из классическом местонахождении / Матер. межд. конф. "Развитие ботанической науки в Центральной Азии и ее интеграция в производство. Ташкент, 2004. – С. 66–67.
289. Тожибаев К. Ш., Бешко Н. Ю. Кадастр редких и эндемичных растений Джизакского и Наманганского вилоятов Республики Узбекистан // Биоразнообразие Узбекистана – мониторинг и использование. – Ташкент, 2007. – С. 200–208.
290. Тожибаев К. Ш., Тургинов О. Т. Новые и редкие виды флоры Узбекистана из Байсунтау (Гиссарский хребет) // Бот. журн. 2012. Т. 97. № 7. – С. 966–971.
291. Тожибаев К. Ш. Тюльпаны (*Tulipa* L.) в растительном покрове Западного Тянь-Шаня. Сборник Биоразнообразие Узбекистана – мониторинг и использование. Ташкент, 2007. – С. 194–200.
292. Тожибаев К. Ш. Лилейные (*Liliaceae*) Юго-Западного Тянь-Шаня (в пределах Узбекистана). // Узб. биол. журн., 2008. №6. – С. 26–30.
293. Тожибаев К. Ш., Мухамеджанова Ф. И. Новые сведения о некоторых редких видах Угам-Чаткальского Национального Парка // Вестник. "Гинбо", №1, Ташкент "Истиклол", 2005. – С.19–21.
294. Туляганова М. Род *Calispepla* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 19.
295. Туляганова М. Род *Erigeron* // Определитель растений Средней Азии. Т. 10. Ташкент: Фан, 1993. – С. 494–512.
296. Туляганова М. Секция *Macrothrix* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 180–184.
297. Туляганова М. Род *Cercis* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 12.
298. Туляганова М. Новый вид рода *Leonurus* из Средней Азии // Бот. журн. 1987. т. 72. №6. – С. 213–214.
299. Туляганова М. Род *Leonurus* // Опр. раст. Средней Азии т. 9, Ташкент: Фан, 1987. – С.119.
300. Туляганова М. Род *Phlomis* // Определитель растений Средней Азии. Т. IX. Ташкент: Фан, 1987. – С. 137.
301. Федченко Б. А. Заметки о географическом распространении рода *Eremurus* // Изв. Петерб. Бот. Сада, Т. 7, вып. 2, 1907, С. 65–68.
302. Федченко Б. А. Новый вид *Thesium* из Ташкентского региона // Бот. мат. Герб. Глав. бот. сада РСФСР. Т. 4, 1923. – С. 113–114.
303. Федоров А. А. Сем. *Campanulaceae* // Флора СССР. Т. 24. М.-Л.: АН СССР. 1957. – С. 126–449.

304. Филимонова З. Н. Новый вид из рода *Oxytropis* // Бот. мат. Герб. ин-та бот. АН УзССР, Т. 20. Ташкент: Фан, 1982. – С. 43.
305. Филимонова З. Н. Род *Oxytropis* // Определитель растений Средней Азии. Т. 7. Ташкент: Фан, 1983. – С. 323–367.
306. Фисюн В. В. Род *Jurinea* // Флора Казахстана. Т. 9. Алма-Ата: АН КазССР, 1966. – С. 299–316.
307. Хамидходжаев С. А., Короткова Е. Е. Естественные запасы унгернии Виктора // ДАН УзССР, 1966, № 7. – С. 39–40.
308. Хасанов Ф. О., Мальцев И. И. Новый вид рода *Ferula* L. из Гиссарского хребта. ДАН УзССР, 1990. – С. 48–49.
309. Хасанов Ф. О., Мальцев И. И. Новый вид рода *Silene* L. из Кугитанга. Узб. биол. журн., 1991, № 3. – С. 66–67.
310. Хасанов Ф. О. Эндемичные растения юго-западных отрогов Гиссарского хребта // Узб. биол. журн., 1991, № 2. – С. 41–45.
311. Хасанов Ф. О., Мальцев И. И. Новый род *Kamelinia* (Ariaceae) из Средней Азии. // Узб. Биол. журн. 1992, № 2. – С. 49–53.
312. Хасанов Ф. О., Сулейманов Н. А. Новые виды растений из северного Памиро-Алая. ДАН РУз.
313. Хасанов Ф., Эргашев Э., Кадыров Г. Новый вид рода *Astragalus* L. из Кызылкума. Узб. Биол. журн.
314. Хохряков А. П. Эремурусы и их культура. М.: 1965. – С. 127.
315. Цвелев Н. Н. Род *Trichanthesis* // Флора СССР. Т. 26. М.-Л.: АН СССР, 1961. – С. 282–283.
316. Цвелев Н. Н. Злаки СССР. Л.: Наука, 1976. – С. 594.
317. Цукерваник Т. Н., Грачев Г. Ф. Исследование *Salvia korolkowii* // Тр. ин-та химии АН УзССР, Вып. 1. Ташкент: 1948. – С. 41–43.
318. Цукерваник Т. Н. Секция *Cytisodes* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981 а. – С. 216–219, 240–249.
319. Цукерваник Т. Н. Секция *Eriopodus* // Определитель растений Средней Азии, 1981, т. 6. – С. 219.
320. Цукерваник Т. Н. Род *Lagochilus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 9. Ташкент: Фан, 1987. – С. 130.
321. Чернева О. В. Памироалаяские кузинии секции *Homalochaetae* // Бот. мат. Герб., ин-та бот. АН УзССР, Вып. 15. Ташкент: АН УзССР, 1959. – С. 33–52.
322. Чернева О. В. Новые виды *Cynareae* (Compositae) // Бот. мат. Герб., ин-та бот. АН УзССР, Вып. 16. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 51–63.
323. Чернева О. В. Сем. *Rubiaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент, 1961. – С. 530–559.
324. Чернева О. В. Род *Cousinia* // Флора СССР. Т. 27. М.-Л., 1962. – С. 108–357.
325. Чернева О. В. Опыт систематики рода *Cousinia* флоры СССР // Бот. мат. ин-та бот. АН УзССР, Вып. 17. Ташкент, 1962. – С. 77–108.
326. Чернева О. В. Род *Apigia* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 334.
327. Чернева О. В. Род *Cousinia* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 246, 331, 510.
328. Чернева О. В. Род *Olgaea* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 380–381.
329. Чернева О. В. Род *Oligochaeta* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 412.
330. Чернева О. В. Род *Serratula* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 388.
331. Чернева О. В. Род *Jurinea* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 359–367.
332. Чернева О. В. Род *Echinops* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 213–223.
333. Чернева О. В. Род *Echinops* // Флора СССР. Т. 27. М.-Л.: АН СССР, 1967. – С. 12.
334. Чернева О. В. Сем. *Iridaceae* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 122–141.
335. Черняковская Е. Г. Род *Gladiolus* // Флора СССР. Т. 4. М.-Л.: АН СССР, 1935. – С. 578–581.
336. Черняковская Е. Г. Род *Crambe* // Флора СССР. Т. 8 М.-Л.: АН СССР, 1939. – С. 474–491.
337. Черняковская Е. Г. Сем. *Orchidaceae* // Флора Узбекистана. Т. 1. Ташкент: АН УзССР, 1941. – С. 522–532.
338. Шарипов А. Х. *Tulipa vvedenskyi* Z. Botsch. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: "Chinor ENK", 1996. – С. 141.
339. Шарипов А. Х. *Tulipa micheltiana* Hoog. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, "Chinor ENK", 1996. – С. 142.
340. Шарипов А. Х. *Tulipa ferganica* Vved. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, "Chinor ENK", 1996. – С. 143.
341. Шарипов А. Х. *Tulipa korolkowii* Regel. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, "Chinor ENK", 1996. – С. 145.
342. Шерматов Г. М. Секция *Bucharica* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 220–222.
343. Шерматов Г. М. Секция *Macrocytis* *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 249–251.

344. Шерматов Г. М. Секция *Proselius* // Определитель растений Средней Азии. Ташкент: Фан, 1981. Т. VI. - С. 211.
345. Шерматов Г. М. *Astragalus abolinii* Popov. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: "Chinor ENK". 1996. - С. 29.
346. Шерматов Г. М. *Astragalus baranovii* Popov. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: "Chinor ENK". 1996. - С. 31.
347. Шерматов Г. М. *Acanthophyllum albidum* Schischk. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: "Chinor ENK". 1996. - С. 209.
348. Шишкин В. К. Род *Oenanthe* // Флора СССР. Т. 16, М.-Л.: АН СССР, 1950. - С. 533, 357.
349. Шишкин В. К. Род *Zeravschania* // Флора СССР. Т. 16, М.-Л.: АН СССР, 1950. - С. 412.
350. Шомуродов Х. Ф., Сарыбаева Ш. У. *Astragalus centralis* Sheld. ning morfoqenezisi xususida // Ўзбекистонда чулланишнинг экологик муаммолари: халқаро илмий конференция материаллари. Тошкент, 2008. - Б. 146-149.
351. Шомуродов Х. Ф., Сарыбаева Ш., Ахмедов А., Абдураимов О. Распространение и современное состояние редких видов растений Устюрта. Материалы международной конференции "Биоразнообразие, сохранение и рациональное использование генофонда растительного и животного мира". Ташкент, 2014. - С.150-155.
352. Штейнберг Е. И. Род *Aconitum* // Флора СССР. Т. 7, М.-Л.: АН СССР, 1937. - С. 183-236.
353. Шульгина В. В. Сем. Vitaceae // Деревья и кустарники СССР. Т. 4, М.-Л., 1958. - С. 607-645.
354. Юзепчук С. В. Род *Anemone* // Флора СССР. Т. 7, М.-Л.: АН СССР, 1937. - С. 236-280.
355. Юзепчук С. В. Шестьдесят новых шлемников // Бот. мат. Герб. Бот. ин-та АН СССР. Т. 14, М.-Л., 1951. - С. 356-435.
356. Backlund M. & Thulin. Revision of genus *Plocama* // Taxon 56, 2007, 2:323.
357. Beshko N. Y., Tojibaev K. Sh. & Batashov A. R. Tulips of the Nuratau Mountains and South-Eastern Kyzylkum [Uzbekistan] // Stapfia: reports, 2013.- Vol. 99.- Pp. 198-204.
358. Fedtschenko O. Trois especes nouvelles du Genre *Eremurus* Extrait du Bulletin de l'herbier Boissier, 2-me Serie. T. 4, 8, 1904.
359. Fritsch, R. M. & Abbasi, M. A Taxonomic Review of *Allium* subg. *Melanocrommyum* in Iran. Gatersleben, 2013. 240 pp.
360. Gregory M., Fritsch R., Friesen N., Khassanov F. O. & D. Mc Neal. Nomenclator Alliorum: *Allium* names and synonyms-a world guide.- Royal Botanical Gardens. Kew, 1998. -83 p.
361. Jamzad Z. Primulaceae. Flora of Iran, 1999. - P. 19-58.
362. Khassanov F. O. A revision of the genus *Allium* L. in the flora of Uzbekistan.- In: Hanelt P., Hammer K. & Knapf H. (Eds.): The genus *Allium* -taxonomical problems and genetic resources. Gatersleben, 1992. - P.153-159.
363. Khassanov F. O. & R. M. Fritsch. New taxa in *Allium* L. subg. *Melanocrommyum* (Webb & Berth.) Rouy from Central Asia. Linzer biol. Beitr. 1994, 26/1, - pp. 965-990.
364. Khassanov F. O. Conspectus of the wild growing *Allium* species of Middle Asia. - In: Ozturk M., Secmen O. and G. Gork (Eds.) Plant Life in South West Asia. Ege Univ. Press, Izmir, 1997. - pp.141-159.
365. Khassanov F. O., Shomuradov H. & Kadyrov G. Taxonomic revision of *Allium* L. sect *Allium* s. l. in Central Asia // Stapfia: reports, 2011. - Vol. 95. - pp. 171-173.
366. Khassanov F. O., Rakhimova N. Taxonomic revision of the genus *Iris* L. (Iridaceae Juss.) for the flora of Central Asia. // Stapfia: reports, 2012. - Vol. 97. - pp. 121-126.
367. Khassanov F. O. et al. A new species from genus *Plocama* L.(Rubiaceae Juss.) from Middle Asia. // Stapfia: reports, 2014. - Vol. 101. - pp. 23-26.
368. Liden M. The genus *Dionysia* (Primulaceae), a synopsis and five new species. Willdenowia 37: 2007. - pp.37-61.
369. Tojibaev K. Sh. A new *Tulipa* species from Fergan valley. Linz. biol. beitr., 2009. 49/2.
370. Tojibaev K. Sh., Beshko N. Y. Reassessment of diversity and analysis of distribution in *Tulipa* (Liliaceae) in Uzbekistan // Nordic Journal of Botany. - 2014.
371. Tojibaev K. Sh., Turginov O. & Karimov F. A new species and new records of *Allium* (Amaryllidaceae) for Uzbekistan (Central Asia) // Phytotaxa 2014. 177 (5): 291-297.

Ўсимликларнинг латинча номлари Латинские названия растений

Amaryllidaceae

- Allium praemixtum* Vved.
Allium aflatunense B. Fedtsch.
Allium pskemense B. Fedtsch.
Allium alaicum Vved.
Allium botschantzevii Kamelin
Allium bakhousianum Regel
Allium majus Vved.
Allium giganteum Regel
Allium isakulii R.M. Fritsch et F.O. Khass.
Allium rhodanthum Vved.
Allium ravenii F.O. Khass., Shomuradov et Kadyrov
Allium decoratum Turginov et Tojibaev
Allium eremoprasum Vved.
Allium viridiflorum Pobed.
Ungernia victoris Vved. ex Artjuschenko
Sternbergia lutea (L.) Spreng.
Sternbergia fischeriana (Herb.) M. Roem.

Anacardiaceae

- Rhus coriaria* L.

Apiaceae (Umbelliferae)

- Dorema microcarpum* Korovin
Sphaerosciadium denaense (Schischk.) Pimenov et Kljuykov
Aulacospermum popovii (Korov.) Kljuykov, Pimenov et V.N. Tikhom.
Kamelinia tianschanica F.O. Khass. et I.I. Maltzev
Ferula helenae Rakhm. et Melibaev
Ferula sumbul (Kauffm.) Hook. f.
Ferula tuberifera Korovin
Ferula kyzylkumica Korovin
Ferula pratovii F.O. Khass. et I.I. Maltzev
Ferula fedtschenkoana Koso-Pol.
Ferula korshinskyi Korovin
Ferula vicaria Korovin
Ferula helena Rakhm. et Melib.
Mogoltavia sewerzowii (Regel) Korovin
Oenanthe fedtschenkoana Koso-Pol.
Oenanthe heterococca Korovin
Komarovia anisosperma Korovin
Cephalopodium hissaricum Pimenov
Zeravschania regeliana Korovin

- Fergania polyantha* (Korovin) Pimenov
Seseli turbinatum Korovin
Paulita ovczinnikovii (Korovin) Sojak
Autumnalia inopinata Pimenov
Astomatopsis galiocarpa Korovin
Lipskya insignis (Koso-Pol.) Nevski
Elwendia angreni (Korovin) Pimenov et Kljuykov (*Bunium angreni* Korovin)
Elwendia vaginata (Korovin) Pimenov et Kljuykov (*Bunium vaginatum* Korovin)
Dimorphosciadium gayoides (Regel & Schmalh.) Pimenov
Lomatocarpa korovinii Pimenov
Sphaenolobium tenuisectum (Korovin) Pimenov

Asphodelaceae

- Eremurus alberti* Regel
Eremurus iae Vved.
Eremurus baissunensis O. Fedtsch.
Eremurus korovinii B. Fedtsch.
Eremurus pubescens Vved.
Eremurus robustus Regel
Eremurus nuratavicus A.P. Khokhr.
Eremurus lactiflorus O. Fedtsch.
Eremurus luteus Baker
Eremurus suworowii Regel
Eremurus chloranthus Popov
Eremurus aitchisonii Baker

Aspleniaceae

- Phyllitis scolopendrum* (L.) Newman

Asteraceae (Compositae)

- Anura pallidivirens* (Kult.) Tscherneva
Cousinia allolepis Tscherneva et Vved.
Cousinia adenophora Juz.
Cousinia butkovii Tscherneva et Vved.
Cousinia vvedenskyi Tscherneva
Cousinia platystegia Tscherneva
Cousinia dshisakensis Kult.
Cousinia umbilicata Juz.
Cousinia glaphyrocephala Juz. et Tscherneva
Cousinia candicans Juz.
Cousinia pterolepida Kult.
Cousinia glabriseta Kult.

Cousinia pseudolanata Popov ex Tscherneva
Cousinia stricta Tscherneva
Cousinia dolichophylla Kult.
Cousinia hoplophylla Tscherneva
Cousinia haesitabunda Juz.
Cousinia campyloraphis Tscherneva
Cousinia rhodantha Kult.
Cousinia spryginii Kult.
Cousinia praestans Tscherneva et Vved.
Xylanthemum rupestre (Popov ex Nevski)

Tzvelev.

Echinops babatagensis Tscherneva
Echinops brevipenicillatus Tscherneva
Lepidolopha nuratavica Krasch.
Lepidolopha fedtschenkoana Knorring
Oligochaeta vvedenskyi (Popov) Tscherneva
Olgaia pectinata Iljin.
Serratula lancifolia Zakirov
Scorzonera bungei Krasch. et Lipsch.
Tanacetopsis botschantzevii (Kovalevsk.)

Kovalevsk.

Trichanthesis butkovii Kovalevsk.
Ugamia angrenica (Krasch.) Tzvelev.
Jurinea gracilis Iljin.
Jurinea asperifolia Iljin.
Jurinea zakirovii Iljin.
Jurinea mariae Pavlov.
Jurinea sangardensis Iljin.
Jurinea psammophila Iljin.
Erigeron trimorphopsis Botsch.
Vicoa krashennikovii Kamelin
Koelpinia leiocarpa Popov.
Helichrysum nuratavicum Krasch.

Bignoniaceae

Incarvillea olgae Regel.

Boraginaceae

Lappula parvula Nabiev et Zakirov.
Lappula nuratavica Nabiev et Zakirov.
Lappula aktaviensis Popov et Zakirov
Rindera fornicata Pazij
Heliotropium bucharicum B. Fedtsch.
Onosma macrorrhiza Popov.
Nonea calceolaris Nikif. & Pazij

Brassicaceae (Cruciferae)

Iskandera hissarica N. Busch
Parrya saxifraga Botsch. et Vved.

Parrya kuramensis Botsch.
Pseudoclausia sarawschanica (Regel et Schmalh.) Botsch.
Pseudoclausia olgae (Regel et Schmalh.) Botsch.
Pseudoclausia tschimganica (Popov ex Botsch. et Vved.) A.V.Vassil.
Lepidium subcordatum Botsch. et Vved.
Lepidium olgae (R.M. Vinogr.) Al-Shehbaz et Mumm.
Crambe gordjaginskii Sprygin et Popov
Spryginia winklerii (Regel) Popov

Campanulaceae

Ostrowskia magnifica Regel

Capparaceae

Capparis rosanowiana B. Fedtsch.
Cleome gordjaginskii Popov

Caprifoliaceae

Lonicera paradoxa Pojark.

Caryophyllaceae

Allochrysa gypsophiloides (Regel) Schischk.
Silene michelsonii Preobr.
Silene tomentella Schischk.
Silene popovii Schischk.
Silene oreina Schischk.
Silene nataliae F.O. Khass.
Silene paranadena Bondarenko et Vved.
Acanthophyllum albidum Schischk.
Acanthophyllum cyrtostegium Vved.
Dianthus uzbekistanicus Lincz.

Chenopodiaceae

Climacoptera oxyphylla U.P. Pratov
Climacoptera malyginii (Korovin ex Botsch.) Botsch.
Climacoptera pjataevae U.P. Pratov
Climacoptera amblyostegia (Botsch.) Botsch.
Climacoptera merkulowiczii (Zakirov) Botsch.
Climacoptera ptiloptera U.P. Pratov
Halimocnemis lasiantha Iljin
Nanophyton botschantzevii U.P. Pratov
Salsola drobovii Botsch.
Salsola titovii Botsch.
Salsola chiwensis Popov

Anthochlamis tianschanica Iljin
Gamanthus ferganicus Iljin

Colchicaceae (Melanthiaceae)

Colchicum kesselringii Regel

Crassulaceae

Pseudosedum campanuliflorum Boriss.

Cucurbitaceae

Bryonia melanocarpa Nabiev

Cynomoriaceae

Cynomorium songaricum Rupr.

Ebenaceae

Diospyros lotus L.

Euphorbiaceae

Andrachne vvedenskyi Pazi
Euphorbia densiuscula Popov
Euphorbia kudrjashevii (Pazij) Prokh.
Euphorbia densiusculiformis (Pazij) Botsch.
Euphorbia triodonta Prokh.
Euphorbia sclerocyathium Korovin et Popov

Fabaceae (Leguminosae)

Cercis griffithii Boiss.
Astragalus abolinii Popov
Astragalus baranovii Popov
Astragalus centralis E.Sheld.
Astragalus borissianus Gontsch.
Astragalus butkovii Popov
Astragalus bucharicus Regel
Astragalus willisii Popov
Astragalus nucleosus Popov
Astragalus auratus Gontsch.
Astragalus dianthoides Boriss.
Astragalus knorringianus Boriss.
Astragalus komarovii Lipsky.
Astragalus massagetovii B. Fedtsch.
Astragalus michaelis Boriss.
Astragalus nuratensis Popov
Astragalus plumatus Boriss.
Astragalus pseudanthyllioides Gontsch.
Astragalus pskemensis Popov
Astragalus leptophysus Vved.
Astragalus pseudoeremophysa Popov

Astragalus holargyreus Bunge
Astragalus lasiocalyx Gontsch.
Astragalus tupalangi Gontsch.
Astragalus rhacodes Bunge
Astragalus subschachimardanus Popov
Astragalus rubrivenosus Gontsch.
Astragalus terrae-rubrae Butkov
Astragalus rubellus Gontsch.
Astragalus plumbeus (Nevski) Gontsch.
Astragalus adylovii F.O. Khass., Ergashev et Kadyrov

Astragalus alexeji Gontsch.

Astragalus belolipovii Kamelin ex F.O. Khass. et N. Sulejm.

Astragalus austroferganicus Kamelin et R.M. Vinogr.

Astragalus rubri-galli Popov
Onobrychis tavernierifolia Stocks ex Boiss.
Calispepla aegacanthoides Vved.
Calophaca reticulata Sumnev.
Cicer grande (Popov) Korotkova
Cicer incanum Korotkova
Oxytropis vvedenskyi Filim.
Oxytropis tyttantha Gontsch.
Oxytropis maidantalensis B. Fedtsch.
Oxytropis pseudorosea Filim.
Oxytropis fedtschenkoana Vassilcz.
Oxytropis pseudoleptophysa Boriss.
Hedysarum angrenicum Korotkova
Hedysarum bucharicum B. Fedtsch.
Hedysarum drobovii Korotkova
Hedysarum amankutanicum B. Fedtsch.
Hedysarum magnificum Kudr.
Chesneya tribuloides Nevski.
Eversmannia botschantzevii Sarkisova
Eremosparton flaccidum Litv.

Fumariaceae

Fumariola turkestanica Korsh.

Grossulariaceae (Saxifragaceae)

Ribes malvifolium Pojark.

Hyacinthaceae (Liliaceae)

Dipcadi turkestanicum Vved.

Iridaceae

Gladiolus italicus Mill.

Iris winkleri Regel.
Iris magnifica (Vved.) Vved.
Iris orchioidea Carrière
Iris hippolyti (Vved.) Kamelin
Iris svetlanae (Vved.) T.Hall et Seisums
Iris victoris F.O.Khass., Khuzhan. et Rakhi-
 mova

Lamiaceae (Labiatae)

Lagochilus olgae Kamelin
Lagochilus proskorjakovii Ikramov
Lagochilus vvedenskyi Kamelin et Zuckerw.
Lagochilus inebrians Bunge
Dracocephalum formosum Gontsch.
Dracocephalum komarovii Lipsky
Dracocephalum spinulosum Popov
Scutellaria holosericea Gontsch. ex Juz.
Scutellaria villosissima Gontsch. et Juz.
Scutellaria guttata Nevski ex Juz.
Scutellaria fedtschenkoi Bornm.
Scutellaria colpodea Nevski
Salvia insignis Kudr.
Salvia korolkowii Regel et Schmalh.
Salvia margaritae Botsch.
Salvia tianschanica Makhm.
Salvia submutica Botsch. et Vved.
Salvia lilacinocaerulea Nevski
Phlomischema parviflorum (Benth.) Vved.
Otostegia bucharica B. Fedtsch.
Paraeremostachys transoxana (Bunge) Ady-
 lov, Kamelin et Makhm.
Paraeremostachys anisochila (Pazij et Vved.)
 Adylov, Kamelin et Makhm.
Paraeremostachys aralensis (Bunge) Adylov,
 Kamelin et Makhm.
Phlomis baburii (Adylov) Adylov
Phlomis gypsacea (Popov) Adylov, Kame-
 lin et Makhm.
Phlomis leiocalyx (Pazij et Vved.) Adylov,
 Kamelin et Makhm.
Phlomis tschimganica (Vved.) Adylov, Ka-
 melin et Makhm.
Eremostachys eriolarinx Pazij et Vved.
Phlomis nubilans Zakirov.
Leonurus kudrjashevii Kamelin et Tulyag.

Liliaceae

Gagea ludmilae Levichev
Fritillaria eduardii Regel

Tulipa vvedenskyi Botschantz.
Tulipa micheliana T.M. Hoog
Tulipa ferganica Vved.
Tulipa lehmaniana Merckl.
Tulipa korolkowii Regel
Tulipa affinis Botschantz.
Tulipa fosteriana Irving
Tulipa orithyoides Vved.
Tulipa dasystemon (Regel) Regel
Tulipa lanata Regel
Tulipa kaufmanniana Regel
Tulipa tubergeniana T.M. Hoog
Tulipa ingens T.M. Hoog
Tulipa dubia Vved.
Tulipa carinata Vved.
Tulipa uzbekistanica Botschantz. et Sharipov
Tulipa greigi Regel
Tulipa scharipovii Tojibaev
Tulipa intermedia Tojibaev et J.J. de Groot

Limoniaceae (Plumbaginaceae)

Acantholimon annae Lincz.
Acantholimon ekatherinae (B. Fedtsch.) Czer-
 niak.
Acantholimon margaritae Korovin et Lincz.
Acantholimon nuratavicum Zakirov
Acantholimon subavenaceum Lincz.
Cephalorhizum oopodum Popov et Korovin

Moraceae

Ficus carica L.

Orchidaceae

Eulophia turkestanica (Litv.) Schlecht.

Paeonaceae

Paeonia hybrida Pall.

Peganaceae (Zygophyllaceae)

Malacocarpus crithmifolius (Retz.) C.A.Mey.

Platanaceae

Platanus orientalis L.

Poaceae (Graminea)

Stipa aktauensis Roshev.
Stipa karataviensis Roshev.
Stipa gnezdilloi Pazij.

Polygonaceae

Calligonum molle Litv.
Calligonum matteianum Drobow
Calligonum elegans Drobow
Calligonum calcareum Pavlov
Calligonum paletzkianum Litv.
Calligonum zakirovii (Khalk.) F.O. Khass.

Primulaceae

Dionysia hissarica Lipsky

Punicaceae

Punica granatum L.

Ranunculaceae

Delphinium knorringianum B. Fedtsch.
Aconitum talassicum Popov
Anemone baissunensis Juz.
Anemone bucharica Regel
Adonanthe leiopseala (Butkov) Chrtak et
Slaviková

Rhamnaceae

Ziziphus jujuba Mill.

Rosaceae

Pyrus asia-mediae (Popov) Maleev

Rubiaceae

Rubia laevissima Tschernova,
Plocama botschantzevii (Lincz.) M. Backlund
et Thulin
Plocama alshehbazii F.O. Khass., Khamraeva,
Khuzhan. et Achilova

Rutaceae

Haplophyllum bucharicum Litv.

Santalaceae

Thesium minkwitzianum B. Fedtsch.

Saxifragaceae

Bergenia ugamica V.N. Pavlov
Bergenia hissarica Boriss.

Scrophulariaceae

Spirostegia bucharica (B. Fedtsch.) Ivanina,
Pedicularis grandis Popov ex Vved.

Solanaceae

Physochlaina alaica Korotkova ex Kovalevsk.

Thymelaeaceae

Wikstroemia alberti (Regel) Domke

Vitaceae

Vitis vinifera L.

Zygophyllaceae

Zygophyllum bucharicum B Fedtsch.

"ҚИЗИЛ КИТОБ" ГА КИРИТИЛГАН ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ЎЗБЕКЧА, РУСЧА ВА ЛОТИНЧА НОМЛАРИ

Т/р	ЎСИМЛИКЛАР	РАСТЕНИЯ	PLANTAE	БЕТ
Айиқтовондошлар оиласи – Семейство Лютиковые – Ranunculaceae				
1	Кнорринг исфараги	Живокость Кнорринга	<i>Delphinium knorringianum</i> B. Fedtsch.	8
2	Оқ парпи	Аконит таласский	<i>Aconitum talassicum</i> Popov	9
3	Бойсун пуфанаги	Ветреница байсунская	<i>Anemone baissunensis</i> Juz.	10
4	Бухоро пуфанаги	Ветреница бухарская	<i>Anemone bucharica</i> Regel	11
5	Туксиз сугурўт	Горицвет голочашечный	<i>Adonanthe leiosepala</i> (Butkov) Chrtak et Slaviková	12
Анордошлар оиласи – Семейство Гранатовые – Punicaceae				
6	Ёввойи анор	Гранат обыкновенный	<i>Punica granatum</i> L.	13
Бигкониёдошлар оиласи – Семейство Бигкониевые – Bignoniaceae				
7	Ольга инкарвиллеяси	Инкарвиллея Ольги	<i>Incarvillea olgae</i> Regel	14
Бурчқоқдошлар оиласи – Семейство Мотыльковые (Бобовые) – Fabaceae (Leguminosae)				
8	Бинафшагулли аргуvon	Багрянник Гриффита	<i>Cercis griffithii</i> Boiss.	15
9	Аболин астрагали	Астрагал Аболина	<i>Astragalus abolinii</i> Popov	16
10	Баранов астрагали	Астрагал Баранова	<i>Astragalus baranovii</i> Popov	17
11	Бинафшаранг астрагал	Астрагал центральный	<i>Astragalus centralis</i> E. Sheld.	18
12	Борис астрагали	Астрагал Бориса	<i>Astragalus borissianus</i> Gontsch.	19
13	Бутков астрагали	Астрагал Буткова	<i>Astragalus butkovii</i> Popov	20
14	Бухоро астрагали	Астрагал бухарский	<i>Astragalus bucharicus</i> Regel	21
15	Виллис астрагали	Астрагал Виллиса	<i>Astragalus willisii</i> Popov	22
16	Ёнғоқсимон астрагал	Астрагал ореховый	<i>Astragalus nucleosus</i> Popov	23
17	Зарҳал астрагал	Астрагал позолоченный	<i>Astragalus auratus</i> Gontsch.	24
18	Икки рангли астрагал	Астрагал двухцветкововидный	<i>Astragalus dianthoides</i> Boriss.	25
19	Кнорринг астрагали	Астрагал Кнорринга	<i>Astragalus knorringianus</i> Boriss.	26
20	Комаров астрагали	Астрагал Комарова	<i>Astragalus komarovii</i> Lipsky	27
21	Массагетов астрагали	Астрагал Массагетова	<i>Astragalus massagetovii</i> B. Fedtsch.	28
22	Михаил астрагали	Астрагал Михаила	<i>Astragalus michaelis</i> Boriss.	29
23	Нурота астрагали	Астрагал нуратинский	<i>Astragalus nuratensis</i> Popov	30
24	Патсимон астрагал	Астрагал перистый	<i>Astragalus plumatus</i> Boriss.	31
25	Пахмоқтукли астрагал	Астрагал ложноязвенниковый	<i>Astragalus pseudanthylloides</i> Gontsch.	32

26	Писком астрагали	Астрагал пскемский	<i>Astragalus pskemensis</i> Popov	33
27	Пуфак астрагал	Астрагал тонкопузырчатый	<i>Astragalus leptophysus</i> Vved.	34
28	Сохта чўл астрагали	Астрагал ложнозеремофиза	<i>Astragalus pseudoeremophysa</i> Popov	35
29	Сур астрагал	Астрагал сплошь серебристый	<i>Astragalus holargyreus</i> Bunge	36
30	Тук косачали астрагал	Астрагал волосисточашечный	<i>Astragalus lasiocalyx</i> Gontsch.	37
31	Тупаланг астрагали	Астрагал тупаланский	<i>Astragalus tupalangi</i> Gontsch.	38
32	Юлингган астрагал	Астрагал оборванный	<i>Astragalus rhacodes</i> Bunge	39
33	Юмалоқ тўпгулли астрагал	Астрагал почти шахимарданский	<i>Astragalus subschachimardanus</i> Popov	40
34	Қизилтомир астрагал	Астрагал красножилковый	<i>Astragalus rubrivenosus</i> Gontsch.	41
35	Қизилтупроқ астрагали	Астрагал красноземный	<i>Astragalus terrae-rubrae</i> Butkov	42
36	Қизғиш астрагал	Астрагал красноватый	<i>Astragalus rubellus</i> Gontsch.	44
37	Қўргошин астрагал	Астрагал свинцовый	<i>Astragalus plumbeus</i> (Nevski) Gontsch.	45
38	Одилов астрагали	Астрагал Адылова	<i>Astragalus adylovii</i> F.O. Khass., Ergashev et Kadyrov	46
39	Алексей астрагали	Астрагал Алексея	<i>Astragalus alexeji</i> Gontsch.	47
40	Белопилов астрагали	Астрагал Белопилова	<i>Astragalus belolipovii</i> Kamelin ex F.O. Khass. et N. Sulejm.	48
41	Жанубий Фаргона астрагали	Астрагал южноферганский	<i>Astragalus austroferganicus</i> Kamelin et R. M. Vinogr.	49
42	Қизил хўроз астрагали	Астрагал кызыл-хуразский	<i>Astragalus rubri-galli</i> Popov	50
43	Шуълали зирақўт	Эспарцет таверниерелистный	<i>Onobrychis tavernierifolia</i> Stocks ex Boiss.	51
44	Бурчоксимон калиспепла	Калиспепла эгакантовая	<i>Calispepla aegacanthoides</i> Vved.	52
45	Қорапоя мойқорағон	Майкараган сетчатый	<i>Calophaca reticulata</i> Sumnev.	53
46	Йирик нўхат	Нут большой	<i>Cicer grande</i> (Popov) Korotkova	54
47	Қудройи нўхат	Нут седой	<i>Cicer incanum</i> Korotkova	55
48	Введенский окситрописи	Остролодочник Введенского	<i>Oxytropis vvedenskyi</i> Filim.	56
49	Майда гулли окситропис	Остролодочник мелкоцветный	<i>Oxytropis tyttantha</i> Gontsch.	57
50	Майдонтол окситрописи	Остролодочник майдантальский	<i>Oxytropis maidantalensis</i> B. Fedtsch.	58
51	Ним пушти ранг окситропис	Остролодочник ложнорозовый	<i>Oxytropis pseudorosea</i> Filim.	59
52	Федченко окситрописи	Остролодочник Федченко	<i>Oxytropis fedtschenkoana</i> Vassilcz.	60
53	Юпқа пардали окситропис	Остролодочник ложнотонкопузырчатый	<i>Oxytropis pseudoleptophysa</i> Boriss.	61
54	Ангрен тангаўти	Копеечник ангрениский	<i>Hedysarum angrenicum</i> Korotkova	62

55	Бухоро тангаўти	Копеечник бухарский	Hedysarum bucharicum B. Fedtsch.	63
56	Дробов тангаўти	Копеечник Дробова	Hedysarum drobovii Korotkova	64
57	Омонқўтон тангаўти	Копеечник аманкутанский	Hedysarum amankutanicum B. Fedtsch.	65
58	Тизма тангаўт	Копеечник великолепный	Hedysarum magnificum Kudr.	66
59	Лангарсимон чезнея	Чезнея якорцевидная	Chesneya tribuloides Nevski	68
60	Бочанцев эверсманнияси	Эверсманния Бочанцева	Eversmannia botschantzevii Sarkisova	69
61	Осипувчан (эгилувчан) кулонқуйруқ	Эremosпартон обвислый	Eremosparton flaccidum Litv.	70
Бугдойдошлар оиласи – Семейство Мятликовые (Злаковые) – Poaceae (Graminea)				
62	Оқтоғ чалови	Ковыль актавский	Stipa aktauensis Roshev.	71
63	Қоратоғ чалови	Ковыль каратавский	Stipa karataviensis Roshev.	72
64	Гнездило чалови	Ковыль Гнездило	Stipa gnezdilloi Pazij	73
Гиацинтдошлар оиласи – Семейство Гиацинтовые (Лилейные) – Hyacinthaceae (Liliaceae)				
65	Туркистон дипкадийси	Дипкади туркестанский	Dipcadi turkestanicum Vved.	74
Гулсафсардошлар оиласи – Семейство Ирисовые – Iridaceae				
66	Италия гладиолуси	Шпажник посевной	Gladiolus italicus Mill.	75
67	Винклер гулсафсари	Ирис Винклера	Iris winkleri Regel	77
68	Антиқа гулсафсар	Ирис великолепный	Iris magnifica (Vved.) Vved.	78
69	Орхидеянамо гулсафсар	Ирис орхидный	Iris orchoides Carrière	79
70	Ипполит гулсафсари	Ирис Ипполита	Iris hippolyti (Vved.) Kamelin	80
71	Светлана гулсафсари	Ирис Светланы	Iris svetlanae (Vved.) T.Hall et Seisums	81
72	Виктор гулсафсари	Ирис Виктора	Iris victoris F.O.Khass., Khuzhan. et Rakhimova	82
Зирадошлар (Соябоғулдошлар) оиласи – Семейство Сельдерейные (Зонтичные) – Apiaceae (Umbelliferae)				
73	Майда мевали дорема	Дорема мелкоплодная	Dorema microcarpum Korovin	83
74	Денов жуфтуруги	Шарозонтичник денауский	Sphaerosciadium denaense (Schischk.) Pimenov et Kijuykov	84
75	Попов жўякмеваси	Бороздоплодник Попова	Aulacospermum popovii (Korov.) Kijuykov, Pimenov et V.N. Tikhom	85
76	Тянь-Шань камелинияси	Камелиния тяньшанская	Kamelinia tianschanica F.O.Khass. et I. I. Malzev	86
77	Сумбул коврак	Ферула мускатная	Ferula sumbul (Kauffm.) Hook. f.	87
78	Туганакли коврак	Ферула клубненоносная	Ferula tuberifera Korovin	88
79	Қизилқум ковраги	Ферула кызылкумская	Ferula kyzylkumica Korovin	89
80	Пратов ковраги	Ферула Пратова	Ferula pratovii F.O. Khass. et I. I. Malzev	90

81	Федченко ковраги	Ферула федченковская	<i>Ferula fedtschenkoana</i> Koso-Pol.	91
82	Коржинский ковраги	Ферула Коржинского	<i>Ferula korshinskyi</i> Korovin	92
83	Ўринбосар коарак	Ферула замещающая	<i>Ferula vicaria</i> Korovin	93
84	Елена ковраги	Ферула Елены	<i>Ferula helenae</i> Rakhm. et Melibaev	94
85	Тожик ковраги	Ферула таджиков	<i>Ferula tadshikorum</i> Pimenov	95
86	Федченко пилдиروقмеваси	Омежник федченковский	<i>Oenanthe fedtschenkoana</i> Koso-Pol.	97
87	Чизиқояли пилдиروقмева	Омежник разноплодный	<i>Oenanthe heterococca</i> Korovin	98
88	Шаширсимон пуфакбўғим	Комаровия неровносемянная	<i>Komarovia anisosperma</i> Korovin	99
89	Ҳисор сарпоysi	Головоног гиссарский	<i>Cephalopodium hissaricum</i> Pimenov	100
90	Регел қирқбоши	Зеравшания Регеля	<i>Zeravschania regeliana</i> Korovin	101
91	Сариқ қирқгул	Фергания многоцветковая	<i>Fergania polyantha</i> (Korovin) Pimenov	102
92	Пилдиروق қўшшоҳ	Жабрица кубарчатая	<i>Seseli turbinatum</i> Korovin	103
93	Овчинников паулияси	Паулия Овчинникова	<i>Paulita ovczinnikovii</i> (Korovin) Sojak	104
94	Ғаройиб кузак	Осенница неожиданная	<i>Autumnalia inopinata</i> Pimenov	105
95	Чакамигмевасимон астоматопсис	Астоматопсис подмареннико-плодный	<i>Astomatopsis galloearpa</i> Korovin	106
96	Ангрен зираси	Эльвендия ангренская (буниум ангренский)	<i>Elwendia angreni</i> (Korovin) Pimenov et Kljuykov (Bunium angreni Korovin)	107
97	Новбаргли зира	Эльвендия влагалищная (буниум влагалищный)	<i>Elwendia vaginata</i> (Korovin) Pimenov et Kljuykov (Bunium vaginatum Korovin)	108
98	Ғайсимон диморфосциадий	Диморфосциадий гайевидный	<i>Dimorphosciadium gayoides</i> (Regel & Schmalh.) Pimenov.	109
99	Коровин ломатокарпаси	Окаймленноплодик Коровина	<i>Lomatocarpa korovinii</i> Pimenov.	110
100	Ингичка баргли поналанжа	Клинолопастик тонкорассеченный	<i>Sphaenolobium tenuisectum</i> (Korovin) Pimenov.	111
Исирикдошлар оиласи – Семейство Могильниковые (Парнолистниковые) – <i>Regelaceae</i> (<i>Zygophyllaceae</i>)				
101	Қўнгир қумузум	Мякоплодик критмолистный	<i>Malacocarpus crithmifolius</i> (Retz.) C.A. Mey.	112
Итузумдошлар оиласи – Семейство Пасленовые – <i>Solanaceae</i>				
102	Олой хиёли	Пузырница алайская	<i>Physochlaina alaiica</i> Korotkova ex Kovalevsk	113
Қарамдошлар оиласи – Семейство Капустные (Крестоцветные) – <i>Brassicaceae</i> (<i>Cruciferae</i>)				
103	Ҳисор исқандараси	Искандера гиссарская	<i>Iskandera hissarica</i> N. Busch.	114
104	Тошбузар паррияси	Паррия камнеломка	<i>Parrya saxifraga</i> Botsch. et Vved.	115
105	Қурама паррияси	Паррия кураминская	<i>Parrya kuramensis</i> Botsch.	116
106	Зарафшон сохта клаусияси	Пожноклаусия зеравшанская	<i>Pseudoclausia zerawschanica</i> (Regel et Schmalh.) Botsch.	117

107	Чимён сохта клаусияси	Пожноклаусия чимганская	<i>Pseudoclausia tschimganica</i> (Popov ex Botsch. et Vved.) A.V.Vassil.	118
108	Юраксимон торол	Клоповник почтисердцевидный	<i>Lepidium subcordatum</i> Botsch. et Vved.	119
109	Ольга лепидиуми	Клоповник Ольги	<i>Lepidium olgae</i> (R.M. Vinogr.) Al-Shehbaz et Mumm.	120
110	Гордягин қатрони	Катран Гордягина	<i>Crambe gordjagini</i> Sprygin et Popov.	121
111	Винклер спригинияси	Спрыгиния Винклера	<i>Spryginia winklerii</i> (Regel) Popov.	122
Кармақрошлар оиласи – Семейство Кармиковые – Limoniaceae (Plumbaginaceae)				
112	Анна кирпиўти	Акантолимон Анны	<i>Acantholimon annae</i> Lincz.	123
113	Екатерина кирпиўти	Акантолимон Екатерины	<i>Acantholimon ekatherinae</i> (B. Fedtsch.) Czerniak.	124
114	Маргарита кирпиўти	Акантолимон Маргариты	<i>Acantholimon margaritae</i> Korovin et Lincz.	125
115	Нурота кирпиўти	Акантолимон нуратинский	<i>Acantholimon nuratavicum</i> Zakirov	126
116	Деярли сулисимон кирпиўт	Акантолимон почтиовсовый	<i>Acantholimon subavenaceum</i> Lincz	127
117	Тухумоёқ илдизбош, цефалоризум	Корнеглав яйценогий	<i>Cephalorhizum oopodum</i> Popov et Korovin	128
Калкисугурғидошлар – Семейство Тимелевые – Thymelaeaceae				
118	Альберт қисрони	Викстремия Альберта (рестелла Альберта)	<i>Wikstroemia alberti</i> (Regel) Domke	129
Ковуңдошлар оиласи – Семейство Каперцевые – Capparaceae				
119	Розанов ковули	Каперцы Розанова	<i>Capparis rosanowiana</i> B. Fedtsch.	130
120	Гордягин клеомаси	Клеоме Гордягина	<i>Cleome gordjagini</i> Popov	131
Лоладошлар оиласи – Семейство Лилейные – Liliaceae				
121	Людмила бойчечаги	Гусиный лук Людмилы	<i>Gagea ludmilae</i> Levichev	132
122	Холмон исирғагули	Рябчик Эдуарда	<i>Fritillaria eduardii</i> Regel	133
123	Введенский поласи	Тюльпан Введенского	<i>Tulipa vvedenskyi</i> Botschantz.	134
124	Михел поласи, дилбанд пола	Тюльпан Михели	<i>Tulipa micheliana</i> T. M. Hoog	135
125	Фаргона поласи, Жавғаза пола	Тюльпан ферганский	<i>Tulipa ferganica</i> Vved.	136
126	Леманн поласи, Жовқосин пола	Тюльпан Леманна	<i>Tulipa lehmaniana</i> Merckl.	137
127	Корольков поласи	Тюльпан Королькова	<i>Tulipa korolkowii</i> Regel	139
128	Қардош пола, Нурота поласи	Тюльпан родственный	<i>Tulipa affinis</i> Botschantz.	141
129	Фостер поласи	Тюльпан Фостера	<i>Tulipa fosteriana</i> Irving	142
130	Оқ пола, орития поласи	Тюльпан оритиевидный	<i>Tulipa orithyioides</i> Vved.	143

131	Сарғиш лола, чангчи или тукли лола	Тюльпан волосистотычиночный	<i>Tulipa dasystemon</i> (Regel) Regel	144
132	Тукли лола, Сурхон лоласи	Тюльпан шерстистый	<i>Tulipa lanata</i> Regel	145
133	Кауфман лоласи, Таргил лола	Тюльпан Кауфмана	<i>Tulipa kaufmanniana</i> Regel	146
134	Туберген лоласи	Тюльпан Тубергена	<i>Tulipa tubergeniana</i> T. M. Hoog	147
135	Улуғвор лола	Тюльпан великий	<i>Tulipa ingens</i> T. M. Hoog	148
136	Шубҳали лола, Чипор лола	Тюльпан сомнительный	<i>Tulipa dubia</i> Vved.	149
137	Чўлбайир лоласи	Тюльпан килеватый	<i>Tulipa carinata</i> Vved.	150
138	Ўзбекистон лоласи	Тюльпан узбекистанский	<i>Tulipa uzbekistanica</i> Botschantz. et Sharipov	151
139	Қизил лола (Грейг лоласи)	Тюльпан Грейга	<i>Tulipa greigi</i> Regel	152
140	Шарипов лоласи, гулбарра	Тюльпан Шарипова	<i>Tulipa scharipovii</i> Tojibaev	153
141	Оралиқ лола	Тюльпан промежуточный	<i>Tulipa intermedia</i> Tojibaev et J.J. de Groot	154
Наврўзгүлдошлар oilаси – Семейство Первоцветные – Primulaceae				
142	Ҳисор дионисияси	Дионисия гиссарская	<i>Dionysia hissarica</i> Lipsky	156
Пастадошлар oilаси – Семейство Сумаховые – Alacardiaceae				
143	Ошловчи тотим (Сирка дарахти)	Сумах дубильный	<i>Rhus coriaria</i> L.	157
Раъногүлдошлар oilаси – Семейство Розовые – Rosaceae				
144	Ўрта Осиё ноки	Груша среднеазиатская	<i>Pyrus asia-mediae</i> (Popov) Maleev	158
Рўёндошлар oilаси – Семейство Мареновые – Rubiaceae				
145	Силлиқ рўян	Марена гладкая	<i>Rubia laevissima</i> Tscherneva	159
146	Бочанцев плокамаси	Плокама Бочанцева	<i>Plocama botschantzevii</i> (Lincz.) M. Backlund et Thulin	160
147	Ал-Шахбоз плокамаси	Плокама Аль-Шехбаза	<i>Plocama alshehbazii</i> F.O. Khass., Khamraeva, Khuzhan. et Achilova	161
Савринжондошлар oilаси – Семейство Безвременниковые (Мелантовые) – Colchicaceae (Melenanthaceae)				
148	Кесселринг савринжони	Безвременник Кесселринга	<i>Colchicum kesselringii</i> Regel	162
Салтабдошлар oilаси – Семейство Орхидные – Orchidaceae				
149	Туркистон зулофияси	Зулофия туркестанская	<i>Eulophia turkestanica</i> (Litv.) Schlecht	163
Саллагулдошлар oilаси – Семейство Пионовые (Лютиковые) – Paeonaceae (Ranunculaceae)				
150	Ёввойи саллагул	Пион степной	<i>Paeonia hybrida</i> Pall.	164
Санталдошлар oilаси – Семейство Санталовые – Santalaceae				
151	Минквиц тезиуми	Ленец Минквица	<i>Thesium minkwitzianum</i> B. Fedtsch.	165

Семизакдошлар oilаси – Семейство Толстяковые – Crassulaceae				
152	Қўнғироқгулли сохтасемизак	Ложноочиток колокольничкоцветный	<i>Pseudosedum campanuliflorum</i> Boriss.	166
Симиркуйруқдошлар oilаси – Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae				
153	Бухоро спиростегияси	Спиростегия бухарская	<i>Spirostegia bucharica</i> (B. Fedtsch.) Ivanina	167
154	Йирик шеропчин	Мытник большой	<i>Pedicularis grandis</i> Popov ex Vved.	168
Сутламдошлар oilаси – Семейство Молочайные – Euphorbiaceae				
155	Введенский андрахнаси	Андрохна Введенского	<i>Andrachne vvedenskyi</i> Pazij	169
156	Айришоҳ сутлама	Молочай густоватый	<i>Euphorbia densiuscula</i> Popov	170
157	Кудряшев сутламаси	Молочай Кудряшева	<i>Euphorbia kudrjaschevii</i> (Pazij) Prokh.	171
158	Тигиз сутлама	Молочай ложногустоватый	<i>Euphorbia densiusculiformis</i> (Pazij) Botsch.	172
159	Учтишли сутлама	Молочай трёхзубчатый	<i>Euphorbia triodonta</i> Prokh.	173
160	Қадахсимон сутлама	Молочай твёрдобокальчатый	<i>Euphorbia sclerocyathium</i> Korovin et Popov	174
Талоқдордошлар oilаси – Семейство Настоящие папоротники – Aspleniaceae				
161	Қоя горۇти	Листовик сколопендровый	<i>Phyllitis scolopendrum</i> (L.) Newman	175
Торондошлар oilаси – Семейство Гречишные – Polygonaceae				
162	Майин тукли қандим	Кандым мягкий	<i>Calligonum molle</i> Litv.	176
163	Маттей қандими	Кандым Маттея	<i>Calligonum matteianum</i> Drobow	177
164	Нозик қандим	Кандым изящный	<i>Calligonum elegans</i> Drobow	178
165	Оҳактош қандими	Кандым известковый	<i>Calligonum calcareum</i> Pavlov	179
166	Палецкий қандими	Кандым Палецкого	<i>Calligonum paletzkianum</i> Litv.	180
167	Зокиров қандими	Кандым Закирова	<i>Calligonum zakirovii</i> (Khalk.) F.O. Khass.	181
Тошбақатоқдошлар oilаси – Семейство Рутовые – Rutaceae				
168	Бухоро тошбақатоли	Цельнолистник бухарский	<i>Haplophyllum bucharicum</i> Litv.	182
Тошғардошлар oilаси – Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae				
169	Угом бадани	Бадан угамский	<i>Bergenia ugamica</i> V.N. Pavlov	183
170	Ҳисор бадани	Бадан гиссарский	<i>Bergenia hissarica</i> Boriss.	184
Тутдошлар oilаси – Семейство Тутовые – Moraceae				
171	Ёввойи анжир	Инжир дикий	<i>Ficus carica</i> L.	185

Туятовондошлар оиласи – Семейство Парнолистниковые – Zygophyllaceae				
172	Бухоро туятовони	Парнолистник бухарский	Zygophyllum bucharicum B Fedtsch.	186
Ўзумдошлар оиласи – Семейство Виноградные – Vitaceae				
173	Ёввойи ток (узум)	Виноград винный (дикий)	Vitis vinifera L.	187
Хурмодошлар оиласи – Семейство Эбеновые – Ebenaceae				
174	Сафсан хурмо	Хурма кавказская	Diospyros lotus L.	188
Чилонжийдадошлар оиласи – Семейство Круциновые – Rhamnaceae				
175	Ёввойи чилонжийда	Унаби обыкновенная	Ziziphus jujuba Mill.	189
Чиннигулдошлар оиласи – Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae				
176	Качимсимон етмак (бех)	Аллохруза качимовидная	Allochrusa gypsophiloides (Regel) Schischk.	190
177	Михельсон зўрчаси	Смолевка Михельсона	Silene michelsonii Preobr.	191
178	Момиқ зўрча	Смолевка пушистая	Silene tomentella Schischk.	192
179	Попов зўрчаси	Смолевка Попова	Silene popovii Schischk.	193
180	Тог зўрчаси	Смолевка горная	Silene oreina Schischk.	194
181	Наталья зўрчаси	Смолевка Наталии	Silene nataliae F.O.Khass.	195
182	Безчали зўрча	Смолевка почтижелезистая	Silene paranadena Bondarenko et Vved.	196
183	Бигизсимон оқтикан	Колючелистник беловатый	Acanthophyllum albidum Schischk.	197
184	Нинасимон оқтикан	Колючелистник горбатоприцветниковый	Acanthophyllum cyrtostegium Vved.	198
185	Ўзбекистон чиннигули	Гвоздика узбекистанская	Dianthus uzbekistanicus Lincz.	199
Чинордошлар оиласи – Семейство Платановые – Platanaceae				
186	Шарқ чинори	Платан восточный	Platanus orientalis L.	200
Чучуммадошлар оиласи – Семейство Амариллисовые – Amaryllidaceae				
187	Аралаш пиёз	Лук смешанный	Allium praemixtum Vved.	201

188	Афлотун пиёзи	Лук афлатунский	<i>Allium aflatunense</i> B. Fedtsch.	202
189	Писком пиёзи	Лук пскемский	<i>Allium pskemense</i> B. Fedtsch.	203
190	Опой пиёзи	Лук алайский	<i>Allium alaicum</i> Vved.	204
191	Бочанцев пиёзи	Лук Бочанцева	<i>Allium botschantzevii</i> Kamelin	205
192	Бакхауз пиёзи	Лук Бакхауза	<i>Allium bakhousianum</i> Regel	206
193	Катта пиёз	Лук большой	<i>Allium majus</i> Vved.	207
194	Йирик пиёз	Лук гигантский	<i>Allium giganteum</i> Regel	208
195	Исокул пиёзи	Лук Исакула	<i>Allium isakulii</i> R. M. Fritsch et F. O. Khass.	209
196	Пушти гулли пиёз	Лук розовоцветный	<i>Allium rhodanthum</i> Vved.	210
197	Равен пиёзи	Лук Равена	<i>Allium ravenii</i> F. O. Khass., Shomurov et Kadyrov	211
198	Манзарали пиёз	Лук декоративный	<i>Allium decoratum</i> Turginov et Tojibaev	212
199	Сахро пиёзи, чўл пиёзи	Лук пустынный	<i>Allium eremoprasum</i> Vved.	213
200	Яшил гулли пиёз	Лук зеленоватый	<i>Allium viridiflorum</i> Pobed.	214
201	Виктор омонқораси	Унгерния Виктора	<i>Ungernia victoris</i> Vved. ex Artjuschenko	215
202	Сариқ штернбергия	Штернбергия жёлтая	<i>Sternbergia lutea</i> (L.) Spreng.	216
203	Фишер штернбергияси	Штернбергия Фишера	<i>Sternbergia fischeriana</i> (Herb.) M. Roem.	217
Шиландошлар оиласи – Семейство Жимнопастные – <i>Caprifoliaceae</i>				
204	Ғалати учқат	Жимолость странная	<i>Lonicera paradoxa</i> Pojark.	218
Ширандошлар оиласи – Семейство Асфodelевые – <i>Asphodelaceae</i>				
205	Альберт ширачи	Ширач Альберта	<i>Eremurus alberti</i> Regel	219
206	Бештомир ширач	Ширач Ии	<i>Eremurus iae</i> Vved.	220
207	Бойсун ширачи	Ширач байсунский	<i>Eremurus baissunensis</i> O. Fedtsch.	221
208	Коровин ширачи	Ширач Коровина	<i>Eremurus korovinii</i> B. Fedtsch.	222

209	Момиқ ширач	Ширач пушистый	<i>Eremurus pubescens</i> Vved.	223
210	Нор ширач (хулка бола)	Ширач мощный	<i>Eremurus robustus</i> Regel	224
211	Нурота ширачи	Ширач нуратинский	<i>Eremurus nuratavicus</i> A.P. Khokhr.	225
212	Оқулли ширач	Ширач молочнокветковый	<i>Eremurus lactiflorus</i> O. Fedtsch.	226
213	Сариқ ширач	Ширач жёлтый	<i>Eremurus luteus</i> Baker	228
214	Суворов ширачи	Ширач Суворова	<i>Eremurus suworowii</i> Regel	229
215	Яшилгулли ширач	Ширач зеленоцветный	<i>Eremurus chloranthus</i> Popov	230
216	Эчисон ширачи	Ширач Эчисона	<i>Eremurus aitchisonii</i> Baker	231
Шотарадошлар оиласи – Семейство Димянковые – Fumariaceae				
217	Туркистон шотарачаси	Дымяночка туркестанская	<i>Fumariola turkestanica</i> Korsh.	232
Шўрадошлар оиласи – Семейство Маревые – Chenopodiaceae				
218	Ўткирбарг балиққўз	Климакоптера остролистная	<i>Climacoptera oxyphylla</i> U.P. Pratov	233
219	Малигин балиққўзи	Климакоптера Малигина	<i>Climacoptera malyginii</i> (Korovin ex Botsch.) Botsch.	234
220	Пятаева балиққўзи	Климакоптера Пятаевой	<i>Climacoptera pjataevae</i> U.P. Prato	235
221	Тўмтоқ гулёнбаргчали балиққўз	Климакоптера тупопрцветничковая	<i>Climacoptera amblyostegia</i> (Botsch.) Botsch.	236
222	Меркулович балиққўзи	Климакоптера Меркуловича	<i>Climacoptera merkulowiczii</i> (Zakirov) Botsch.	237
223	Қаноти тукли балиққўз	Климакоптера птилоптера	<i>Climacoptera ptiloptera</i> U.P. Prato	238
224	Сертук бузоқбош	Галимокнемис войлочнокветковый	<i>Halimocnemis lasiantha</i> Iljin	239
225	Бочанцев тошбиюргуни	Нанофитон Бочанцева	<i>Nanophyton botschantzevii</i> U.P. Prato	240
226	Дробов шўраги	Солянка Дробова	<i>Salsola drobovii</i> Botsch.	241
227	Титов шўраги	Солянка Титова	<i>Salsola titovii</i> Botsch.	242
228	Хива шўраги	Солянка хивинская	<i>Salsola chiwensis</i> Popov	243
229	Тянь-Шань антохламиси	Антохламис тяньшанский	<i>Anthochlamis tianschanica</i> Iljin	244

230	Фарғона донашури	Спайноцветник Ферганский	<i>Gamanthus ferganicus</i> Iljin	245
Ялғаздошлар (Лабгулдошлар) оқласи – Семейство Яснотковые (Губоцветные) – <i>Lamiaceae</i> (Labiatae)				
231	Ольга бозулбанги	Зайцегуб Ольги	<i>Lagochilus olgae</i> Kamelin	246
232	Проскоряков бозулбанги	Зайцегуб Проскорякова	<i>Lagochilus proskorjakovii</i> Ikramov	247
233	Введенский бозулбанги	Зайцегуб Введенского	<i>Lagochilus vvedenskii</i> Kamelin et Zuckerw.	248
234	Сархуш бозулбанг	Зайцегуб опьяняющий	<i>Lagochilus inebrians</i> Bunge	249
235	Ажойиб бўзбош	Змееголовник прекрасный	<i>Dracocephalum formosum</i> Gontsch.	250
236	Комаров бўзбоши	Змееголовник Комарова	<i>Dracocephalum komarovii</i> Lipsky	251
237	Тиканли бўзбош	Змееголовник колючий	<i>Dracocephalum spinulosum</i> Popov	252
238	Ипаксимон кўкамарон	Шлемник шелковистейший	<i>Scutellaria holosericea</i> Gontsch. ex Juz.	253
239	Момиқ кўкамарон	Шлемник мохнатейший	<i>Scutellaria villosissima</i> Gontsch. et Juz.	254
240	Томчи кўкамарон	Шлемник капельный	<i>Scutellaria guttata</i> Nevski ex Juz.	255
241	Федченко кўкамарони	Шлемник Федченко	<i>Scutellaria fedtschenkoi</i> Bomm.	256
242	Қайрилган кўкамарон	Шлемник изогнутый	<i>Scutellaria colpodea</i> Nevski	257
243	Зебо мармарак	Шалфей замечательный	<i>Salvia insignis</i> Kudr.	258
244	Корольков мармараги	Шалфей Королькова	<i>Salvia korolkowii</i> Regel et Schmalh.	259
245	Маргарита мармараги	Шалфей Маргариты	<i>Salvia margaritae</i> Botsch.	260
246	Тянь-Шань мармараги	Шалфей тяньшанский	<i>Salvia tianschanica</i> Makhm.	261
247	Тумтоқ мармарак	Шалфей туповатый	<i>Salvia submutica</i> Botsch. et Vved.	262
248	Ҳаворанг мармарак	Шалфей лиловоголубой	<i>Salvia lilacinocaerulea</i> Nevski	263
249	Майда гулли тошбости	Золниковник мелкоцветный	<i>Phlomidioschema parviflorum</i> (Benth.) Vved.	264
250	Бухоро отостегияси	Отостегия бухарская	<i>Otostegia bucharica</i> B. Fedtsch.	265
251	Амударё оқтўшаси	Фломоидес заамударьинский	<i>Phlomisoides transoxana</i> (Bunge) Salmaki	266

252	Учпояли оқтўша	Фломоидес неравногубый	Phlomoides anisochila (Pazij et Vved.) Salmaki	267
253	Орол фломоидеси	Фломоидес аральский	Phlomoides aralensis (Bunge) Salmaki	268
254	Бобур фломоидеси	Фломоидес Бабура	Phlomoides baburi (Adylov) Adylov	269
255	Гипсли фломоидес	Фломоидес гипсовый	Phlomoides gypsacea (Popov) Adylov, Kamelin et Makhm.	270
256	Силлиқ косачали фломоидес	Фломоидес гладкошашечный	Phlomoides leiocalyx (Pazij et Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.	271
257	Чимён фломоидеси	Фломоидес чимганский	Phlomoides tschimganica (Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.	272
258	Бутизтуқли эремостахис	Пустынноколосник опушенноглоточный	Eremostachys eriolarynx Pazij et Vved.	273
259	Куримсиз кўзиқулоқ	Зопник мрачный	Phlomis nubilans Zakirov	274
260	Кудряшев арслонқуйруги	Пустырник Кудряшева	Leonurus kudrjaschevii Kamelin et Tulyag.	275
Қовоқдошлар оиласи – Семейство Тыквенные – Cucurbitaceae				
261	Қора сирттан	Переступень черноплодный	Bryonia melanocarpa Nabiev	276
Қорақатдошлар (Тошардошлар) оиласи – Семейство Крыжовниковые (Жимноповые) – Grossulariaceae (Saxifragaceae)				
262	Гулхайрибарг қорақат	Смородина мальволистная	Ribes malvifolium Pojark.	277
Қоңиўтдошлар (Мураккабгүлдөшлар) оиласи – Семейство Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae (Compositae)				
263	Яшил анура	Анура бледнозелёная	Anura pallidivirens (Kult.) Tscherneva	278
264	Аллолепис қаррак	Кузиния инакочешуйная	Cousinia allolepis Tscherneva et Vved.	279
265	Безчатуқли қаррак	Кузиния железистая	Cousinia adenophora Juz.	280
266	Бутков қарраги	Кузиния Буткова	Cousinia butkovii Tscherneva et Vved.	281
267	Введенский қарраги	Кузиния Введенского	Cousinia vvedenskyi Tscherneva	282
268	Ёпирма қаррак	Кузиния широкооберточная	Cousinia platystegia Tscherneva	283
269	Жиззах қарраги	Кузиния джизакская	Cousinia dshisakensis Kult.	284
270	Киндикчали қаррак	Кузиния пупочковая	Cousinia umbilicata Juz.	285
271	Нозикбош қаррак	Кузиния изящноголовая	Cousinia glaphyrocephala Juz. et Tscherneva	286

272	Оқиш қаррак	Кузиния белесоватая	Cousinia candicans Juz	287
273	Паттангачали қаррак	Кузиния перисточешуйчатая	Cousinia pterolepida Kult.	288
274	Силлиқтукли қаррак	Кузиния гладкощети́нковая	Cousinia glabriseta Kult.	289
275	Соҳтатукли қаррак	Кузиния ложношерстная	Cousinia pseudolanata Popov ex Tscherneva	290
276	Тик қаррак	Кузиния торчащая	Cousinia stricta Tscherneva	291
277	Узунбарг қаррак	Кузиния длиннолистная	Cousinia dolichophylla Kult.	292
278	Хурпайган қаррак	Кузиния вооруженнолистная	Cousinia haplophylla Tscherneva	293
279	Шубҳали қаррак	Кузиния сомнительная	Cousinia haesitabunda Juz	294
280	Эгритикан қаррак	Кузиния согнутоколючковая	Cousinia campyloraphis Tscherneva	295
281	Қизилгулли қаррак	Кузиния красноцветная	Cousinia rhodantha Kult.	296
282	Спрыгин қарраги	Кузиния Спрыгина	Cousinia spryginii Kult.	297
283	Ғужтук қаррак	Кузиния превосходная	Cousinia praestans Tscherneva et Vved.	298
284	Қоя қсилантемуми	Қсилантемум скальный	Xylanthemum rupestre (Popov ex Nevski) Tzvelev	299
285	Боботоғ кўкбоши	Мордовник бабатагский	Echinops babatagensis Tscherneva	300
286	Қисқамўй кўкбош	Мордовник короткокисточковый	Echinops brevipenicillatus Tscherneva	301
287	Нурота лепидолофаси	Лепидолофа нуратинская	Lepidolopha nuratavica Krasch.	302
288	Федченко лепидолофаси	Лепидолофа Федченко	Lepidolopha fedtschenkoana Knorring	303
289	Введенский олигохетаси	Олигохета Введенского	Oligochaeta vvedenskyi (Popov) Tscherneva	304
290	Тароқсимон ольгея	Ольгея гребенчатая	Olgaea pectinata Iljin	305
291	Наштарсимон серратула	Серпуха ланцетолистная	Serratula lancifolia Zakirov	306
292	Бунге тақасоқоли	Козелец Бунге	Scorzonera bungei Krasch. et Lipsch.	307
293	Бочанцев танацетопсиси	Танацетопсис Бочанцева	Tanacetopsis botschantzevii (Kovalevsk.) Kovalevsk.	308
294	Бутков трихантемиси	Трихантемис Буткова	Trichanthemis butkovii Kovalevsk.	309

295	Ангрен угамияси	Угамия ангрэнская	<i>Ugamia angrenica</i> (Krasch.) Tzvelev	310
296	Бежирим юринея	Наголоватка стройная	<i>Jurinea gracilis</i> Iljin	311
297	Дагалбарг юринея	Наголоватка шероховатоллистная	<i>Jurinea asperifolia</i> Iljin	312
298	Зокиров юринеяси	Наголоватка Закирова	<i>Jurinea zakirovii</i> Iljin	313
299	Мария юринеяси	Наголоватка Марии	<i>Jurinea mariae</i> Pavlov	314
300	Сангардак юринеяси	Наголоватка сангардакская	<i>Jurinea sangardensis</i> Iljin	315
301	Қумчил юринея	Наголоватка песколюбивая	<i>Jurinea psammophila</i> Iljin	316
302	Майдагултожбарги эригеран	Мелколелестник триморфообразный	<i>Erigeron trimorphopsis</i> Botsch.	317
303	Крашенинников викоази	Викоа Крашенинникова	<i>Vicoa krashennikovii</i> Kamelin	318
304	Туксиз қарғатирноқ	Коелпиния голоплодная	<i>Koelpinia leiocarpa</i> Popov	319
305	Нурота ўлмасўти	Бессмертник нуратавский	<i>Helichrysum nuratavicum</i> Krasch.	320
Қўнғирқўлдошлар силаси – Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae				
306	Улуғвор кўзагул	Островская величественная	<i>Ostrowskia magnifica</i> Regel	321
Қумсўтадошлар силаси – Семейство Цинномориевые – Cynomoriaceae				
307	Жунгор қумсўтаси, цинноморийси	Цинноморий джунгарский	<i>Cynomorium songaricum</i> Rupr.	322
Ғошзабоқдошлар силаси – Семейство Бурачниковые – Boraginaceae				
308	Майда мовийгул	Липучка мелкая	<i>Lappula parvula</i> Nabiev et Zakirov	323
309	Нурота мовийгули	Липучка нуратинская	<i>Lappula nuratvica</i> Nabiev et Zakirov	324
310	Оқтоғ мовийгули	Липучка ақтавская	<i>Lappula aktaviensis</i> Popov et Zakirov	325
311	Йирик ҳалқагулли тангабарг	Риндера крупнозвониковая	<i>Rindera fimbriata</i> Pazij	326
312	Бухоро ғичмопаси	Гелиотроп бухарский	<i>Heliotropium bucharicum</i> B. Fedtsch.	327
313	Йирик илдизли меҳриғиёҳ	Оносма крупнокорневая	<i>Onosma macrorrhiza</i> Popov	328
314	Бошмоқсимон ноней	Ноней башмачковидная	<i>Nonea calceolaris</i> Nikif. & Pazij	329

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ҚИЗИЛ КИТОБИ

2 жилдли

I жилд

ЎСИМЛИКЛАР

Илмий-оммабон нашр

Муҳаррирлар Нодира Абдуллаева, Негина Кисель
Дизайнер Ўткир Тожибоев
Компьютерда саҳифаловчи: Темуржон Бўрибоев
Техник муҳаррир Ҳумоюнхон Анвархонов
Мусахҳиҳ Гулсара Менгзияева

Нашриёт лицензияси № АІ 269, 15. 07. 2015 й.
100185, Тошкент шаҳри, Бунёдкор кўчаси, 7а-уй.

Босишга рухсат этилди 07.05.2019. Нашр бичими 60x84_{/16},
Cambria гарнитураси. Офсет босма усули.
Босма табағи 20.9 Шартли босма табақ 22.5
Адади 5000 нусха.
Буюртма № Баҳоси келишилган нархда.

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASINING ҚИЗИЛ КИТОБИ

2 жилдан

1 жилдан

ЎСИМЛИКЛАР

Илмий-амалбон нашр

Мухаррирлар Нодира Абдуллаева, Регина Кисель
Дизайнер Уткир Тосқабоев
Компьютерда саҳифаловчи Темуровон Бўрибоси
Техник муҳаррир Хумоюнхон Анварович
Мусоҳҳиҳ Гулсара Ментгалиева

Нашриёт лицензияси № АИ 269, 15.07.2015 й.
100185, Тосқабоев шаҳри, Бунёдкор кўчаси, 7а-уй.

Босилган рухсат этилди 02.12.2019 й. Нашр бичими 60x84
Самбита гарнитураси. Офсет босма усули.
Босма табиғи 45. Адади 5000 нуска.
Бўртма 420/С. Баҳоси келишилган паросда.

«TERRA PRINT KLASSTER» МЧЖ босмадонисидо
офсет усулида чоп этилди.

